

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XXI. Jahrg.

Februar 1895.

No. 4.

Synonymischer Katalog der europäischen Sammelbienen.

Von Prof. Dr. v. Dalla-Torre und H. Friese, Innsbruck (Tirol).

(Fortsetzung zu Seite 50.)

IV. Unterfam. **Panurginae.**

7. **Panurginus** Nyl.

Epimethea Mor.

<i>alticola</i> Mor. — Cauc.	<i>montanus</i> Gir. — Alp.
<i>halictoides</i> (Duf.) Gir.—Hisp.	<i>pictipes</i> Mor. ¹⁾ — Cauc.
<i>hispanicus</i> Gir. — Hisp.	<i>punctiventris</i> Mor. —
<i>labiatus</i> Ev. — Siles. Austr.	Cauc.
Hung. Ross.	<i>variegatus</i> Mor. ¹⁾ — Cauc.

8. **Dufourea** Lep.

<i>alpina</i> Mor. — Alp.	<i>minuta</i> Sm. — Angl. Hung.
<i>coeruleocephala</i> Mor. —	<i>putoniana</i> Dours — Helv.
Ross. merid.	Vogesen.
<i>dejeanii</i> Lep. — Gall.	<i>vulgaris</i> Schenck — Eur.
<i>halictula</i> Nyl. — Eur. bor.	centr.
centr.	<i>minuta</i> Schenck

9. **Halictoides** Nyl.

? <i>calcāratu</i> s Mor. — ?	<i>inermis</i> Nyl. — Germ. Hung.
<i>dentiventris</i> Nyl. — Eur.	Suec.
bor. centr.	<i>paradoxus</i> Mor. — Alp.
<i>bispinosa</i> Ev.	

10. **Rhophites** Spin.

Rhophitoides Schenck

<i>canus</i> Ev. — Eur. centr.	<i>quinquespinosus</i> Spin. —
<i>bifoveolatus</i> Sichel	Eur. centr.
<i>caucasicus</i> Mor. — Cauc.	? <i>trispinosus</i> Schummel —
	Siles.

¹⁾ *Epimethea* Mor.

11. *Camptopoeum* Spin.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <i>frisei</i> Mocs. — Hung. | <i>venustum</i> Er. — Hisp. |
| <i>frontale</i> F. — Hung. Ross. | <i>interruptum</i> Spin. |

12. *Panurgus* Pz.

Eriops Klug

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>annulatus</i> Sichel — Hisp. | <i>canescens</i> Ltr. — Hisp. Ital. |
| <i>banksianus</i> K. — Eur. bor. | <i>cavannae</i> Gribod. — Calabr. |
| centr. | <i>cephalotes</i> Ltr. — Gall. me- |
| <i>ursinus</i> Ltr. | rid. Pyren. Alger. |
| <i>ater</i> Pz. | <i>clypeatus</i> Ev. — Volg. Ural. |
| <i>calcaratus</i> Scop. — Eur. | <i>dentipes</i> Lep. — Eur. centr. |
| bor. centr. | <i>perezii</i> Saund. — Lu. |
| <i>ursinus</i> Gmel. K. | <i>proximus</i> Saund. — Lu. |
| <i>ater</i> F. | <i>sculpturatus</i> Mor. — Ross. |
| <i>lobatus</i> Pz. | merid. |
| <i>linnaeellus</i> K. | <i>siculus</i> Mor. — Sicil. |
| var. <i>nigricornis</i> D.T. (Tirol) | <i>unicolor</i> Spin. — Ital. |

13. *Dasypoda* Ltr.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>albipila</i> Spin. — Aegypt. | <i>subinterrupta</i> Brullé |
| <i>arctos</i> Er. — Hisp. | <i>villipes</i> Lep. |
| <i>argentata</i> Pz. — Eur. centr. | <i>baetica</i> Spin. |
| merid. | <i>rufipes</i> (Sichel i. l.) Dours, |
| <i>plumipes</i> Pz. (♀) | Mor. |
| <i>graeca</i> Lep. (♂) | <i>graeca</i> Rudow |
| <i>villipes</i> Ev. | <i>eutoni</i> Saund. |
| <i>palleola</i> Baer | <i>nebrodensis</i> Stef. |
| <i>thoracica</i> Baer | <i>frieseana</i> Schletter. — Turc. |
| <i>melanopleura</i> Baer | <i>longigena</i> Schletter. — As. |
| <i>nigrans</i> Baer | min. |
| <i>decora</i> Baer | ? <i>leucoura</i> Rudow — Germ. |
| <i>tscherkoviana</i> Baer | (Perleberg) |
| <i>italica</i> Rad. | ? <i>melanopleura</i> Baer — |
| <i>rhododactyla</i> D. T. | Ross. |
| <i>mixta</i> Rad. | <i>panzeri</i> Spin. — Eur. merid. |
| <i>wankowiczii</i> Rad. | Gall. |
| var. <i>braccata</i> Ev. | <i>spissipes</i> Lep. |
| <i>discincta</i> Rossi — Eur. | <i>pyriformis</i> Rad. (♂) |
| merid. | <i>succincta</i> Schlett. |
| ? <i>hirsuta</i> F. | <i>plumipes</i> Pz. — Eur. tot. |
| <i>visnaga</i> Rossi | ? <i>farfarisqua</i> Scop. |

? *hirta* F.
swammerdamella K.
hirtipes Ill.
graeca Lep. (♂)
cingulata Er.
villosa Lep.
nemoralis Baer
palleola Baer
aurata Rudow
spectabilis Rudow
cingulata Saund.

pyriformis Rad. (♀)
cingulata Stef.
canescens Stef.
 var. *minor* F. Mor. — Ross.
 Gall.
minor Pérez i. l.
pyrotrichia Först. — As.
 min.
thomsonii Schletter. — Suec.
 Mecklb. Hung. Balk.
braccata Thoms.

V. Unterfam. **Melittinae.**14. **Melitta** K.*Cilissa* Leach*Pseudocilissa* Rad.

budensis Mocs. — Hung.
dimidiata Mor. — Cauc.
 var. *hungarica* Mocs. (Hung.)
haemorrhoidalis F. — Eur.
 bor. centr.
dichroa Gmel.
chrysura K.
 var. *nigra* Friese (Wallis)
leporina Pz. — Eur. bor. centr.
tricineta K.

afzeiella Ev.
aegyptiaca Rad.
melanura Nyl. — Eur. bor.
 centr.
quadricincta Ev.
microstigma Ev. — Volg.
 Ural.
robusta Rad. — Cauc.
ruthenica Rad. — Minsk
wankowiczii Rad. — Minsk

15. **Systropha** Ill.

curvicornis Scop. — Eur.
 centr.
spiralis Oliv.
labrosa Ev. (*Andrena*)
hirsuta Spin. — Aegypt.

planidens Gir. — Hisp. Gall.
 merid. Wien, Hung.
rufiventris Mor. — Cauc.
 Casp.

16. **Macropis** Pz.*Scrapter* Lep.

albopilosa Lucas¹⁾ — Alger.
annulipes Lucas¹⁾ — Alger.
frivaldszkyi Mocs. — Hung.
 (Fiume)

labiata F. — Eur. centr.
lagopus Ltr.
 var. *fulvipes* F.

¹⁾ *Scrapter* Lep.

VI. Unterfam. **Xylocopinae.**17. ***Ceratina*** Ltr.

<i>callosa</i> F. — Eur. merid.	<i>decolorans</i> Brullé
Alp. Hung.	<i>cyanea</i> K. — Eur. merid. centr.
<i>coerulea</i> Duf. Perr.	<i>callosa</i> Ill.
<i>mauritanica</i> Lep.	<i>coerulea</i> Westw. Sm.
<i>aenea</i> Schenck	<i>dentiventris</i> Gerst. — Eur.
<i>chalcites</i> Ill. — Eur. merid.	merid. Alp.
<i>aenea</i> Brullé	<i>gravidula</i> Gerst. — Alp.
<i>egregia</i> Gerst.	(Meran)
<i>chalybea</i> Chevr. — Helv.	<i>hungarica</i> Mocs. — Hung.
(Nyon)	merid.
<i>chrysomalla</i> Gerst. — Rhod.	<i>loewii</i> Gerst. — Graec.
<i>coerulea</i> Chevr. — Helv. (Nyon)	<i>nigroaenea</i> Gerst. — Graec.
<i>chevrieri</i> Tourn.	Krim.
<i>cucurbitina</i> Rossi — Eur.	<i>parvula</i> Sm. — Eur. merid.
merid. Alp.	<i>pygmaea</i> Lichtenst.
<i>albilabris</i> F.	<i>savignyi</i> Rad. — Aegypt.
	<i>tarsata</i> Mor. — Creta.

18. ***Xylocopa*** Ltr.

<i>amedei</i> Lep. — Alger. (Turc.)	<i>canuta</i> Rondani.
<i>cantabrica</i> Lep. — Hisp.	<i>olivieri</i> Lep. — Graec. (Turc.)
<i>sinuatifrons</i> Spin.	<i>hellenica</i> Spin.
<i>cirtana</i> Lucas — Alger.	<i>fuscata</i> Sm.
<i>commixta</i> D. T. u. Fr. —	<i>fasciata</i> Ev.
Alger.	<i>fuscata</i> Rad.
<i>grisescens</i> Sm. nec. Lep. 1841	<i>valga</i> Gerst. — Eur. merid.
<i>cupreipennis</i> Sm. — Alger.	Alp. Hung.
<i>cyanescens</i> Brullé — Eur.	<i>ramulorum</i> Rondani.
merid.	<i>violacea</i> L. — Eur. merid.
<i>taurica</i> Er.	Hung. Alp. Germ. centr.
<i>minuta</i> Lep.	<i>femorata</i> F.

VII. Unterfam. **Megillinae.**19. ***Eucera*** Scop.*Macrocera* Ltr.¹⁾*Tetralonia* Spin.

* <i>acutangula</i> Mor. — Cauc.	<i>albopunctulata</i> Dours —
<i>affinis</i> Spin. — Aegypt.	Turc.

¹⁾ Die Arten dieses Subgenus sind durch einen vorgesetzten Stern gekennzeichnet.

africana Lep. — Eur. merid.
albicans Baer
**albida* Lep. — Hisp.
algira Lep. — Hisp. Alg.
**alternans* Brullé — Eur. merid.
analís Baer — Ross.
**armeniaca* Mor. — Hung. Cauc.
glaucopis Mocs.
**atrata* Klug — Aegypt.
atriceps Mor. — Cauc.
atricornis F. Lep. Pérez — Alger.
cingulata Baer nec. Lep. 1841
basizona Spin. — Aegypt.
bibalteata Dours — Eur. merid.
**biroi* Mocs. — Hung.
**brachycera* Gribod. — Alger.
brevicornis F. — Ital.
**caelebs* Dours — Alger.
canescens Dours — Alger.
caspica Mor. — Eur. merid. Hung.
friwaldskyi Mocs.
amplitarsis Mocs.
perezi Mocs.
tarsata Mocs. (*Tetralonia*)
caucasica Mor. — Cauc.
chrysopyga Pérez — Eur. merid. Hung. (Wien)
favosa Mocs.
cinerea Lep. — Eur. merid. Hung.
cana Baer
crinita Baer
cantatrix Baer
cineraria Ev.
pollinosa Sm.
concinna Gribod.
consimilis Dours

cinerascens Walk. — Aegypt.
?cingulata Baer — Ross.?
clypeata Er. — Eur. merid. Hung.
punctilabris Lep.
**coangustata* Dours — Hisp. Alger.
coarctata Ev. — Eur.
collaris Dours — Alger.
**commixta* D. T. u. Fr. — Eur. merid.
nigrifacies Dours nec. Lep. 1841
confusa Gribod. — Calabr.
?continua Baer — Ross.
curvitaris Mocs. — Hung. Triest.
dalmatica Lep. — Dalmat.
?dasypoda Baer — Ross.
deceptrix Sm. — Ital.
**dentata* Klug — Eur. centr. merid.
nigricornis Lep. ♂
canescens Duf. Dours
difficilis Duf. — Eur. centr. merid.
linguaria Lep. ♀
subrufa Lep. ♂
subfasciata Lep. ♂
difficilis Pérez.
dimidiata Brullé — Graec.
discoidalis Mor. — Cauc.
distincta Lep. — Gall.
distinguenda Mor. — Cauc.
dizona Dours — Alger.
doursana D.T.u.Fr. — Alger.
brevicornis Dours nec. Fabr. 1789
dubia Sichel — Eur. merid. Hung.
echii Mocs.
flabellifera Mocs.
**dufourii* Pérez — Gall.
ephippia Dours — Archip.

- eucnemidea* Dours — Alger.
albigena Stefan.
excisa Mocs. — Hung.
fasciatella Lep. — Gall.
ferruginea Lep. — Alger.
pyrrhula Er.
fischeri Baer — Ross.
**fossulata* Mor. — Cauc.
Hung. Gall?
adusta Mocs.
pollinosa Lep. ?
**fuliginosa* Mor. — Cauc.
**fulvescens* Gir. — Ital.
**? glauca* F. — ?
**graja* Ev. — Eur. merid.
Hung.
ruficornis Lep.
grisea F. — Eur. merid.
oraniensis Lep.
bicolor Luc.
**grohmanni* Spin. — Sicil.
hispana Lep. — Eur. merid.
Hung.
pulveracea Dours
pannonica Mocs.
hispana Pérez
var. *tomentosa* Dours
spectabilis Mocs.
interrupta Baer — Eur.
centr. merid.
semistrigosa Dours
confusa Kriechb.
lepeletieri D. T. u. Fr. — ?
alternans Lep. ♂
longicornis L. — Eur. tot.
linguaria F.
furax Rossi
tuberculata F.
strigosa Pz.
vulgaris Spin.
var. *bicincta* Lep.
var. *vidua* Lep.
**lucasii* Gribod. — Gall.
longicornis Lep. ♂ (?)
- *lyncea* Mocs. — Hung.
**malvae* Rossi — Eur.
centr. merid.
antennata F.
**mastrucata* Mor. — Cauc.
**mediocris* Ev. — Cauc.
melanocephala Mor. —
Cauc.
melanostoma Mor. — Turc.
meridionalis D. T. u. Fr.
— Aegypt.
bifasciata Rad. nec Smith
1854
**nana* Mor. — Hung. Gall.
Cauc.
griseola Pérez
nigra Lep. — Alger.
nigrifacies Lep. — Gall.
merid.
var. *cornuta* Stefan. (Sicil.)
nigrifrons Sm. — Dalmat.
nigrilabris Lep. — Eur.
merid.
var. *numida* Lep.
grisea Ev.?
nigrolabiata Baer — Ross.
nigrothoracica Dours —
Alger.
nitidiventris Mocs. — Hung.
Dalmat. Sicil.
notata Lep. — Alger.
obesa Dours
**obscura* Brullé — Graec.
parvicornis Mocs. —
Hung.
pedata Dours — Graec.
pollinaris K. — Angl. ?
druriella K.
pollinaria Lep.
puncticollis Mor. — Cauc.
punica Gribod. — Alger.
**radoszkovzkyi* Mor. —
Ross. merid.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>?robusta</i> Baer — Ross. | <i>atricornis</i> Spin. nec Fab. |
| * <i>ruficollis</i> Brullé — Eur. | 1793 |
| <i>merid.</i> Hung. | <i>squamosa</i> Lep. — ? |
| <i>grandis</i> Fonsc. | * <i>strigata</i> Lep. — Hisp. |
| <i>var. rufa</i> Lep. | Gall. |
| * <i>ruficornis</i> F. — Eur. | <i>inaequidistans</i> Dours |
| <i>merid.</i> Austr. Hung. | * <i>subaurata</i> Dours — Hisp. |
| <i>alticincta</i> Lep. | Gall. |
| <i>var. jullianii</i> Pérez | * <i>subundulata</i> Lep. — Hisp. |
| <i>rufipes</i> Sm. — Eur. | <i>subvillosa</i> Lep. — Alger. |
| * <i>salicariae</i> Lep. — Eur. | <i>taurica</i> Mor. — Krim, Cauc. |
| <i>centr. merid.</i> | * <i>tenella</i> Mocs. — Hung. |
| <i>lythri</i> Schenck | <i>tenuimarginata</i> Dours — |
| <i>basalis</i> Mor. | Alger. |
| * <i>scabiosae</i> Mocs. — Hung. | <i>terminalis</i> Sm. — Gall. |
| (Fiume) | <i>merid.</i> |
| <i>sedulae</i> Mocs. — Hung. | * <i>tricincta</i> Er. — Eur. centr. |
| <i>seminuda</i> Brullé — Graec. | <i>merid.</i> |
| Hung. | <i>var. grisea</i> Ev. |
| <i>paradoxa</i> Mocs. | <i>tristis</i> Mor. — Cauc. |
| <i>cognata</i> Mocs. | <i>trivittata</i> Brullé — Graec. |
| <i>senex</i> Sm. — Alg. | Hisp. |
| <i>similis</i> Lep. — Gall. Dal- | <i>trizona</i> Dours — Alger. |
| mat. Sicil. | <i>unicincta</i> Lep. — Alger. |
| <i>spatulata</i> Gribod. — Al- | * <i>velutina</i> Mor. — Cauc. |
| ger. | Ross. merid. |
| * <i>spectabilis</i> Mor. — Cauc. | * <i>vicina</i> Mor. — Cauc. |
| * <i>spinolae</i> D. T. u. Fr. — | ? <i>vittigera</i> Baer — Ross. |
| Aegypt. | <i>vulpes</i> Brullé — Graec. |

20. *Meliturga* Ltr.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>caucasica</i> Mor. — Cauc. | <i>fervens</i> Lep. — Alger. |
| <i>caudata</i> Pérez — Gall. Hisp. | <i>oraniensis</i> Lep. — Alger. |
| <i>clavicornis</i> Ltr. | <i>praestans</i> Gir. — Austr. |
| <i>nasalis</i> Ev. | (Wien) |

21. *Megilla* F.

Anthophora F. Ltr.

Habropoda Sm.

Saropoda Ltr.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>acervorum</i> L. — | <i>plumipes</i> Pall. |
| <i>pilipes</i> F. | <i>hirsuta</i> F. |

palmipes Rossi
hispanica Pz.
retusa K.
aegyptiaca D. T. u. Fr.
— Aegypt.
senilis Walk nec Evers-
mann 1846
aestivalis Pz. — Eur. centr.
zonata Brullé
intermedia Lep.
affinis Brullé — Eur. me-
rid.
albigena Lep. — Eur. me-
rid. Alp. Hung.
var. *albida* Dours (Tanger)
albisepta Klug — Eur.
merid.
albomaculata Rad. — Cauc.
asiatica Mor. — Cauc.
astragali Mor. — Cauc.
atriceps Pérez — Alger.
nigrocinctula Dours
atricilla Ev. — Ross.
hypopolia Dours
atro-alba Lep. — Eur. me-
rid.
balassogloi Rad. — Cauc.
balneorum Lep. — Eur.
merid. Alp.
obesa Gir.
biciliata Lep. — Eur. me-
rid.
bikamata Pz. — ?
bimaculata Pz.¹⁾ — Eur.
centr. merid.
rotundata Pz.
albifrons Ev.
cognata Sm.
var. *squalida* Lep.
binotata Lep. — Gall. Ross.
borealis Mor. — Eur. bor.
centr.

byssina Klug¹⁾ — Aegypt.
calcarata Lep. — Alger.
caliginosa Klug. — Eur.
merid.
atroferruginea Dours
? *nigrofulva* Lep. ?
candens Pérez — Gall.
candida Pérez nec Sm.
1879
carbonaria Mor. — Cauc.
chrysocnemis Mor. — Cauc.
crassipes Lep. — Gall.
mixta Lep.
crinipes Sm. — Ital. Hung.
croceipes Mor. — Cauc.
denticrus Mor. — Germ.
(Kreuznach) Helv.
deserticola Mor. — Ross.
merid.
dispar Lep. — Eur. merid.
Hung.
dubia Ev. — Eur. merid.
dufourii Lep. — Eur. merid.
dives Dours
eburnea Rad. — Cauc.
ephippium Lep. — Alger.
erschowii Mor. — Cauc.
eversmannii D. T. u. Fr.
Volg. Ural.
quadricincta Ev. nec Fabr.
1798
femorata Oliv. — Eur.
centr.
cinerea Ev.
ferruginea Lep. — Hisp.
Alger.
fixsenii Mor. — Cauc.
fulvipes Ev. — Volg. Ural.
fulvodimidiata Dours —
Gall. merid.
fuscata Pz. — Eur. bor.
centr.

¹⁾ *Saropoda* Ltr.

- dumetorum* Pz.
 var. *norwegica* Nyl.
gallica D. T. u. Fr. — Gall.
 merid.
dubia Sm. nec Eversmann
 1852
smithii Dours nec Cresson
 1869
gemella Mor. — Cauc.
gracilipes Mor. — Ross.
 merid.
grisea F. — Ital.
harmalae Mor. — Cauc.
hispanica F. — Hisp. Al-
 ger.
 var. *candidata* Gribod.
 var. *rypara* Gribod.
 ?*incisa* Fourcr. — (? Paris)
kessleri Mor. — Cauc.
laevigata Spin. — Ligur.
latizona Spin. — Aegypt.
larvata Gir. — Ital.
lepida Ev. — Ross. merid.
lepidotea Dours — Dalmat.
leucophaea Pérez — Gall.
 Hisp.
libyphaenica Gribod. —
 Alger.
liturata Lep. — Alger.
radoszkowskyi Mor. ♀
loewii Mor. — Cauc.
lutulenta Rad.
longipes Mor. — ?
lucknowiensis Rad. — Luck-
 now
magnilabris Mor. — Hung.
 Dalmat.
mediozonata Laboulb. —
 Gall.
mlokozewitzii Rad. — Cauc.
moderna Mor. — Cauc.
monacha Er. — Ross merid.
hispanica Ev.
ruthenica Mor.
mucida Gribod. — Eur.
 merid. Alp.
nasuta Lep. — Alger.
nigriceps Mor. — Cauc.
nigricornis Mor. — Ross.
 merid.
nigrilabris Spin. — Aegypt.
nigripes Mor. — Cauc.
nigrocincta Lep. — Eur.
 merid.
 var. *canescens* Brullé
 var. *laticincta* Dours (Gall.)
 var. *flavescens* Gribod. (Ital.)
nigrocinctula Dours —
 Eur. merid.
nigrofulva Lep. — Alger.
nigromaculata Lucas —
 Hisp. Alger. Cauc.
nigrovittata Dours — Cor-
 sica
niveata F. — Alger.
 ? *notata* F. — Dan.
onosmarum Mor. — Cauc.
orientalis Mor. — Cauc.
 Dalmat.
oxygona Dours — Hisp.
parietina F. — Eur.
 var. *villosa* H. S.
plagiata Ill.
 var. *fulvocinerea* Dours
pedata Ev. — Ross. merid.
pennata Lep. — Eur me-
 rid.
perplexa Rad. — Ross.
 merid.
personata Ill. — Eur. centr.
 merid.
fulvitarsis Brullé
 var. *euris* Dours
podagra Lep. — Gall. Ross.
segnis Ev.
cinerea Ev. ♂
procera Costa — Sardin.
pruinosa Sm. — Sicil.

- pubescens* F. — Eur. merid.
 Alp. Hung.
flabellifera Lep.
punctilabris Lep. — Eur.
 merid.
quadricolor Er. — Eur.
 merid.
manni Mocs.
quadrifasciata Vill. —
 Eur. centr. merid.
nidulans F.
 var. *garrula* Rossi
 var. *albescens* Dours
 var. *bombylans* Mocs.
ochroleuca Pérez
quadristrigata Dours —
 Alger.
raddei Mor. — Cauc.
repleta Dours — Ross. merid.
retusa L. — Eur. tot.
haworthana K. ♂
hirsuta Ev.
pilipes Nyl.
acervorum Nyl.
hirta Kirchn.
 ♀ var. *meridionalis* Pérez
robusta Klug — Cauc.
rogenhoferi Mor. — Archip.
romandii Lep. — Eur.
 merid.
atricilla Dours
rubricrus Dours — Graec.
rufa Lep. — Dalmat.
ruficornis Mor. — Cauc.
rufiventris F. — Gall.
 Germ. (?)
rutilans Dours — Cypr.
 ? *salviae* Pz. — ?
salviae Mor. — Cauc. Hung.
 Dalmat.
pipiens Mocs.
- savignyi* Lep. — Aegypt.
scopipes Spin. — Eur. me-
 rid.
ventilabris Lep.
segnis Dours — Eur. me-
 rid.
segusina Gribod. — Ital.
semicinerea Dours — Dal-
 mat.
senescens Lep. — Eur.
 merid.
 var. *canescens* Dours
 var. *coidea* Dours
senilis Ev. — Volg. Ural.
vetula Ev.
eversmanni Rad.
sichelii Rad. — Eur. merid.
dimidiozonata Dours
sicula Sm. — Sicil.
siewersii Mor. — Cauc.
socia Klug — Eur. merid.
squalida Lep. — Paris
subterranea Klug-Dalmat.
tarsata Spin.¹⁾ — Eur.
 merid. (Bozen)
ezonata Sm.
passerinii Sichel
thomsonii Saund. — Lu.
tomentosa Mocs. — Hung.
 Ross.
fulvipes Dours
uniciliata Sichel — Sicil.
velocissima Mor. — Cauc.
 ? *ventralis* Pz. — ?
vernalis Mor. — Cauc.
vulpina Pz. — Eur.
quadrinaculata Pz.
subglobosa K.
mixta Schenck
zonatula Sm.¹⁾ Eur merid.
 Hung.

¹⁾ *Habropoda* Sm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl
[Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Synonymischer Katalog der europäischen
Sammelbienen. 53-62](#)