

punctatis, 4. *obscuro*, 5. *medio sulcato*, *fuliginoso*, *testaceo-hirto*. — Long. 10—11½ mm.

? = *mauritanicus* Luc. ♂.

Algeria (2 ♂).

4. *Eriades trilobatus* Friese n. sp.

♂. — *Niger*, *sparsim griseo-hirtus*, *capite thoraceque dense punctatis*, *clypeo convexo*, *clypeo labroque longissime niveo-barbatis*, *abdomine nudo*, *segmentorum marginibus piceis*, 1. *haud tumido*, *anali* (6.) *haud cucullato acuminatoque*, *marginibus elevatis*, *lateribus angulatis*, *fere lobiformibus*, *ventralibus inermibus*. — Long. 6 mm.

Algeria (5 ♂).

5. *Eriades moricei* Friese n. sp.

Niger, *niveo-setosus* (*Trypetes*); *capite thoraceque grosse punctatis*, *clypeo convexo*, *elongato*, *marginem anteriore 4—6-dentato*; *alis hyalinis*, ♀ *scopa nivea*, ♂ *segmento 7. plano*, *quadrato inermique*, *segmentis ventralibus inermibus*. — Long. 6—6½ mm.

Aegyptus (3 ♂, 1 ♀), majo 1895 (F. D. Morice).

On the Synonymy of the Genus *Deltochilum*.

John W. Shipp.

The genus *Deltochilum* was described by Eschscholtz (Entomogr. I. 1822. p. 37) for his species named *dentipes* (id. p. 38. t. 1. f. 4) which was probably the only species of the genus with which he was acquainted as he mentioned no other.

In 1826, Vigors (Zool. Journ. II. 1826. p. 512. t. 19. f. 1) described the same species as *Annamesis Macleayi*.

Lep. et Serville (Encycl. Meth. X. pp. 352—53) in 1825 described the genus *Hyboma* taking for his type *icarus* Oliv.

Kolbe (Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191 et seq.) divides the genus *Deltochilum* into a number of subgenera — some of which are however quite entitled to generic rank — as follows. *Paedhyboma*, *Calhyboma*, *Deltochilum*, *Euhyboma*, *Aganhyboma*, *Meghyboma* and *Telhyboma*.

Kolbe however places *icarus* Ol. as the type of the restricted genus *Deltochilum* and proposes a new genus *Meg-*

hyboma for *dentipes* Esch. In both of these conclusions he is wrong, as *icarus* Oliv. is the type of *Hyboma* Serv. and *dentipes* is the type of *Deltochilum* Esch. As *Hyboma* is already preoccupied (Hübner. Verz. Bek. Schm. 1816—22 p. 200). I propose the name *Hybomidium* for the group of which *icarus* Oliv. is the type.

The corrected Synonymy would read as follows:

***Paedhyboma* Kolbe.**

Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191.

Type. *aberrans* Har. Berl. Ent. Zeit. 1868. p. 8. (Columbia).

***Calthyboma* Kolbe.**

Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191.

Type. *burmeisteri* Har. Col. Hefte. 1. 1867 p. 76. (Quito).

hipponum Buq., *rubripenne* Gory and *pustulosus* Kolbe are referable to this genus.

***Hybomidium* Nom. Nov.**

= *Hyboma* Serv. Encycl. Meth. 1825. pp. 352—53 (nec Hübn. 1816—22).

= *Deltochilum* Kolbe Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191 (nec Esch. 1822).

Type. *icarus* Oliv. Ent. 1. 3. p. 155. t. 16. f. 151a (Surinam).

The following species may be referred to this genus:
— *gibbosum* Fab., *amazonicum* Bates, *furcatum* Cast., *mor-
billosum* Burm., *bidentatum* Dej., *granulatum* Bates, *sex-
tuberculatum* Bates, *arachnoides* Bates, *irroratum* Cast., *pa-
rile* Bates, *laevigatum* Kolbe, *rohdei* Kolbe, *subcupreum* Kolbe,
granulosum Kolbe.

***Euhyboma* Kolbe.**

Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191.

Type. *brasiliense* Cast. Hist. Nat. II. p. 73 (Brazil).

***Aganhyboma* Kolbe.**

Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191.

Type. *trisinatum* Har. MT. Münch. Ent. Ver. IV. p. 150. 1881 (Brazil).

The following species are referred to this genus: *cupri-
colle* Har., *atrocoeruleum* Kolbe, *signiferum* Kolbe.

Deltochilum Esch.

Entomogr. I. 1822. p. 37.

= *Annamesis* Vigors Zool. Journ. II. 1826. p. 512.

= *Meghyboma* Kolbe S. E. Z. 1893. p. 191.

Type. *dentipes* Esch. Entomogr. I. 1822. p. 38. t. 1.
f. 4 (Brazil).

= *macleani* Vigors Zool. Journ. II. 1826. p. 512. t. 19.

f. 1 (St. Catherina).

= *bufo* Dej. Cat. = *rugosum* Sturm. Cat.

Scabriusculum Bates and *Enceladas* Kolbe are referred
to this genus.

Telhyboma Kolbe.

Stett. Ent. Zeit. 1893. p. 191.

Type. *orbiculare* Lansb. Col. Hefte. XII. 1874. p. 6 (Bahia).

Ueber die Lebensweise von *Allantus marginellus* F.

von F. Thureau-Berlin.

Die Larven von *Allantus marginellus* F. fand und zog ich bereits im Anfange der 80er Jahre, ohne ein weiteres Interesse dafür zu zeigen, so dass ich mich nicht einmal um den Namen der Wespe kümmerte, weil das grosse Feld der Lepidopteren mit ihren Verwandlungsstadien mich hinlänglich beschäftigte. Im Jahre 1893 sammelte ich die hübschen Afterraupen wieder in grösserer Zahl ein, aus welchen sich im nächsten Jahre die Wespen sehr gut entwickelten, und hatte ich nun auch die beste Gelegenheit, am hiesigen Königl. Museum für Naturkunde den Namen des Thieres und gleichzeitig zu erfahren, dass über dessen Lebensweise noch nichts bekannt sei. Trotzdem bleibt es merkwürdig, dass bei der Häufigkeit dieser Art noch kein Hymenopteren-Liebhaber die Larven gefunden haben soll, um darüber zu publiciren. In der Litteratur findet sich allerdings an zwei Orten (A. Dours, Cat. synon. des hymén. de France, 1874, pag. 20 und Cameron, Monogr. Brit. Phytoph. Hymen. I. 1882, pag. 145) die kurze Bemerkung: „La larve vit sur les ombellifères“, ohne jede Beschreibung der Larve. Nach all meinen bisher gemachten Beobachtungen aber glaube ich, dass diese Angabe sicher auf einem Irrthum beruhen dürfte, da ich die Wespe wohl öfters auf den Blüthen von Umbelliferen, worauf sie mit Vorliebe saugt, aber niemals die Larven an derartigen Pflanzen gefunden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Shipp John. W.

Artikel/Article: [On the Synonymy of the Genus Deltochilum. 194-196](#)