

# Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben  
von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

---

XXIV. Jahrg.

Juni 1898.

No. 12.

---

## Zwei neue Cicindeliden aus Assam (Khasi Staaten)

beschrieben von  
Dr. med. W. Horn-Berlin.

Die 2 hier beschriebenen Arten stammen aus einer englischen Ausbeute, welche im vorigen Jahre von den Hrn. Kricheldorf (hierselbst) erworben worden war. Ich verdanke die beiden Unica der ausserordentlichen Liebenswürdigkeit des Hrn. Ober-Postdirektionssekretärs Hennig, der sie von jenem bekommen hatte. Der *Therates* ist höchst bemerkenswert durch seine starke Verbreiterung und Abplattung der Fühlerendglieder; die andere Art steht so isolirt, dass ich ihr überhaupt noch kein bestimmtes Genus anweisen kann. Vielleicht gehört sie zu den *Heptodontidae* sp.; doch fehlt mir, um dies entscheiden zu können, bis jetzt das ♂. Im Habitus erinnert sie etwas an gewisse madagassische *Megalomma* sp. (*M. viridicyaneum* etc.). Auch mit der Gattung *Euryoda* hat sie vieles gemeinsam — vor allem fehlende Behaarung des lateralen Hinterhüften-Randes, sowie Vaterland. Besonders das ganz abweichende Hals-schild, das beinahe wie bei gewissen *Tricondyla* sp. (z. B. *Tr. cyanea* Dej., *brunnea* Dokht. etc.) gebaut ist, macht die Stellung im System recht schwierig. Am wenigsten unwahrscheinlich erscheint es mir nach allem noch, dass die Art entweder mit *Heptodonta tricondyloides* Gestro oder *Euryoda lucidicollis* Chd. verwandt sei.

### *Heptodonta* (aut *Euryoda?*) *Hennigi.*

Labro longiore quam in *H. tricondyloide* Gestro, brunneo, disco laete coeruleo; antennis valde longioribus (tribus partibus corporis longitudinis aequalibus); fronte paullo latiore, in medio planata (partibus orbitalibus similiter declivibus), impressionibus 3 ornata (centrali majore sat evidenti, 2 alteris perparvis anterioribus), tota superficie levissime sculpta (inter

oculos subtiliter longitudinaliter striolata: summa parte marginali levigata excepta); prothorace eadem fere longitudine sed antice posticeque profundissime constricto, parte intermedia globoso-ovata, margine antico recto, parte apicali transversim striolata, media et basali levissime sculptis, angulis basalibus vix in hac percipiendis, linea media distincta, sutura episterno-pronotali subtilissima, sutura prosterno-episternali solummodo postice visibili; elytris fere ut in *Euryoda lucidicollis* Chd. sed a medio ad apicem rarius sculptis; signatura alba: puncto perparvo humerali, marginali medio breviore, ante-apicali minore (duobus his ultimis a margine ipso paullo magis remotis). Palpis nigricantibus: maxillaribus tenuibus, labialibus vix incrassatis (articulo paenultimo brunnescente, basalibus flavis); pedibus valde longioribus, gracillimi, nigricantibus, femorum parte basali et media rufa, trochanteribus testaceis, tarsis vix sulcatis (anticis multo, posticis paullo longioribus quam tibiis). Capite thoraceque supra obscure viridi-aeneis, subtus cum partibus orbitalibus cyanescentibus, pectore toto abdomineque viridi-cyaneis, elytris viridi-aeneis obscuris modice nitentibus. Corpore toto supra subtusque nudo, trochanteribus posticis solummodo in disco punctis 2 piliferis ornatis. — 1 ♀,  $15\frac{1}{2}$  mm (sine labro).

### *Therates Hennigi.*

*Ther. Chennelli* Bat. affinis, differt magnitudine multo majore; labri marginibus basique infuscatis; fronte inter oculos latiore et planiore, antice abruptius deflexa; thorace vix breviore latioreque; elytris postice multo grossius (sed paullo subtilius valdeque rarius quam basi) sculptis, totis flavo-testaceis, maculis 2 marginem attingentibus et fere usque ad suturam ductis purpureo-aeneis exceptis (altera transversa in medio paullulum constricta et vix ante discum sita; altera inter hanc et apicem majore, irregulari, fere rotundata); antennarum articulis 4 exterioribus valde compresso-dilatatis. Capite, pronoto, pectore toto cyaneis; abdome (margine angusto flavo excepto) nigrescente; coxis, trochanteribus, palpis, primo antennarum articulo ( $2^{\circ}$ — $6^{\circ}$  testaceo-brunnescentibus,  $8^{\circ}$ — $11^{\circ}$  nigricantibus), pedibus testaceo-flavis (tarsorum antecorū articulis  $1^{\circ}$ — $3^{\circ}$  apice,  $4^{\circ}$  et  $5^{\circ}$  totis piceis; femoribus anticis et intermediis supra nigro lineatis; tibiarum 4 antecorū apice infuscato; pedum posticorum femoribus anguste distaliter, tibiis sat late proximaliter cum ultimo tarsorum articulo obscuratis). — 1 ♂, 11 mm (sine labro).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Zwei neue Cicindeliden aus Assam \(Khasi Staaten\) 177-178](#)