

Ueber einige Varietäten.

Von Dir. Beuthin in Hamburg.

a. Neuheiten.

1. *Cicindela soluta*, var. *nigra* m.

Unterscheidet sich von der Grundform durch die Farbe, statt grünlich kupferbronce ist sie schwarz; weisse Makeln wie bei var. *xanthopus* Fischer, also Apicalmakel geschlossen (var. *atratura* Motsch. in litt.?). Scheint sehr selten, ich besitze nur 1 ♂, das am linken Ufer des Dnjepr, unweit Jekaterinoslaw, gefangen wurde.

2. *Carabus cancellatus*, Rasse *emarginatus*, var. *Sequensi* m.

Neben var. *trentinus* Kraatz gehörig und ihm sehr ähnlich, aber kleiner und schmaler, namentlich das Halsschild an der Basis schmaler, Sculptur der Flügeldecken wie bei *trentinus*.

Von Herrn Anton Sequens Anfang März 1897 im Eichenhaine Janikovac bei Gospiç in Croatien ca. 20 Exemplare gefangen, davon 10 in meiner Sammlung.

b. Berichtigung.

1. In seiner verdienstvollen Arbeit „Bestimmungstabellen der europ. Coleopteren.“ 34. Heft. Carabidae, schreibt Herr Reitter Pag. 194 über *Goniocarabus cancellatus* var. *aveyronensis* m.

„In der That finde ich von Tertiärintervallen kaum die Spur vorhanden etc.“ — hier hätte Herr R. schreiben müssen „bei meinen Exemplaren“ — denn, hätte Herr R. bei seinem Hiersein mir die Ehre seines Besuches erzeigt, so würde er sich überzeugt haben, dass in der Beuthin'schen Sammlung Exemplare sind, bei denen die Tertiärintervalle so stark entwickelt sind, wie die Secundärrippen.

2. *Carabus cancellatus*, *pseudocarinatus* m. kommt nicht in Galizien vor, wie Herr Reitter angiebt.

3. Bei *Archicarabus monticola* Dej. fehlen var. *Jordani* m; und var. *asperus* m. (Beschreibung siehe: „Societas entomologica Band 7. (1892) No. 17.“)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [Ueber einige Varietäten. 316](#)