

punktierte 1. Hinterleibssegment, dessen Punkte teilweise zu Runzeln zusammenfliessen, aus.

Ein neuer augenloser *Tapinopterus* (Coleopt.)
aus der Herzegowina.

Von Victor Apfelbeck, Custos am k. k. Landesmuseum in Sarajevo.

Tapinopterus setipennis (Subgen. *Speluncarius*).

Elongatus, depressiusculus, nitidus, pallide ferrugineus, fere transparens. Caput magnum, elongato-ovatum, prothorace parum angustius, postice modice constrictum, temporibus tumidulis, oculis nullis. Antennae elongatae, corporis dimidium superantes. Prothorax elongato-subcordatus, elytris parum angustior, latitudine fere longior, basin versus parum angustatus, lateribus perparum curvatis, pone medium longe et levissime sinuatis, basi late arcuatim emarginatus, angulis anticis productis, sat acutis, posticis rectis, disco depresso postice utrinque longitudinaliter impresso, lateribus anguste marginatis, seta marginalis in quarta parte anteriore sita. Elytra elongata, lateribus fere parallela, antice leviter intus curvatis, margine laterali et basali angulisque humeralibus fortiter reflexis, margine basali sinuatim impresso, dorso depresso, striis profundis, obsolete punctulatis, stria scutellaris abbreviata nulla, interstitiis subtilissime alutaceis, internis antice planis, interstitio tertio et quarto punctis setigeris 4—6 instructo, punctorum setis longis, setis lateralibus tenuibus, inaequalibus, duabus longissimis. Processus prosternalis apice haud marginatus. Episterna metathoracis latitudine haud longiora. Segmentum ventrale tertium medio utrinque seta unica, quartum et quintum setis duabus instructa. Tarsorum articulus quintus subtus haud setosus.

Lg. 11 mm.

♂ Segmento ventrali sexto haud carinato, medio leviter ruguloso, ante marginem posticum utrinque seta unica instructo.

Von *Speluncarius anophthalmus* Reitter durch bedeutendere Grösse, sehr seichte basale Längs-Eindrücke des Halsschildes, buchtig eingedrückten Basalrand und stark aufgebogene, fast rechtwinklige Basalecken der Flügeldecken, namentlich aber durch das Vorhandensein von je 4 bis 6 borstentragenden Punkten im dritten und fünften Zwischenraume der Flügeldecken verschieden. Ausserdem ist das letzte Ventralsegment des ♂ nicht gekielt.

Wurde von mir in einer kleinen Höhle bei Bilek (Herzegowina) in einem Exemplare (♂) entdeckt.

Einige neue Chalastogastra-Arten und eine neue Gattung.

Von Fr. W. Konow, p.-Teschendorf.

1. Gen. *Derecyrta* Smith.

1. *D. patagiata* n. sp. ♀ *Atra*, pronoto, mesonoti majore parte anteriore, tegulis, mesopleurorum parte superiore rubris; pectoris medio et ventris basi magis minusve rufis; alis flavescenti-hyalinis, nitentibus, et superiorum et inferiorum area intercostali saturate rufa, basi atra; costa et stigmatate rufis; ceteris venis magis minusve obscure rufescentibus, basi nigris. — *Elongata, nitida, subcylindrica; abdomine apicem versus subclaviformi; ore, pectore, ventre, abdominis lateribus, pedibus subaureo-pubescentibus; pube pronoti et mesonoti tenuissima, vix conspicua; capite crasso, pone oculos dilatato; mandibulis latis, antice crasse rugoso-punctatis; clypeo densius punctulato, medio impresso, apice truncato; antennis setiformibus, 25—26-articulatis, abdomine multo brevioribus, thoracem una cum capite longitudine multo superantibus; articulo primo tertium, secundo quintum longitudine aequantibus, tertio 4^o vix sesqui longiore; facie fere regulariter striata; fronte supraantennali medio anguste sulcatim impressa, inter antennis subgibboso-elevata; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; sincipite polito, nitente; pronoto antice fere perpendiculariter declivi, supra medio brevissimo, utrobique tuberculo humerali instructo; pronoti lateribus deflexis interdum nigro-lituratis; mesonoti lobo medio rugis crassis transversis obtecto; lobis lateralibus laevibus; parte antescutellari rugosa, medio nigra, utrobique rufata; fovea media profunda, utrobique serie punctorum crassiorum repleta et longitudinaliter carina acuta dimidiata; scutello subruguloso, apice parvo tuberculo conico instructo, appendice laevi; postscutello levissime ruguloso; mesopleuris laevibus, nitentibus, vix punctulatis; abdominis dorso laevi, nitente, apice minus rotundato; segmento ultimo dorsali longius producto; vagina exserta, crassiuscula, apicem versus attenuata.*

Long. 20—22 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

Von *D. Andrei* Knw., welcher die neue Art nahe verwandt ist, ausser durch die Färbung des Körpers und der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Apfelbeck Viktor

Artikel/Article: [Ein neuer augenloser Tapinoptertis \(Coleopt.\) aus der Herzegowina. 147-148](#)