

Wurde von mir in einer kleinen Höhle bei Bilek (Herzegowina) in einem Exemplare (♂) entdeckt.

Einige neue Chalastogastra-Arten und eine neue Gattung.

Von Fr. W. Konow, p.-Teschendorf.

1. Gen. *Derecyrta* Smith.

1. *D. patagiata* n. sp. ♀ *Atra*, pronoto, mesonoti majore parte anteriore, tegulis, mesopleurorum parte superiore rubris; pectoris medio et ventris basi magis minusve rufis; alis flavescenti-hyalinis, nitentibus, et superiorum et inferiorum area intercostali saturate rufa, basi atra; costa et stigmatate rufis; ceteris venis magis minusve obscure rufescentibus, basi nigris. — *Elongata, nitida, subcylindrica; abdomine apicem versus subclaviformi; ore, pectore, ventre, abdominis lateribus, pedibus subaureo-pubescentibus; pube pronoti et mesonoti tenuissima, vix conspicua; capite crasso, pone oculos dilatato; mandibulis latis, antice crasse rugoso-punctatis; clypeo densius punctulato, medio impresso, apice truncato; antennis setiformibus, 25—26-articulatis, abdomine multo brevioribus, thoracem una cum capite longitudine multo superantibus; articulo primo tertium, secundo quintum longitudine aequantibus, tertio 4^o vix sesqui longiore; facie fere regulariter striata; fronte supraantennali medio anguste sulcatim impressa, inter antennis subgibboso-elevata; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; sincipite polito, nitente; pronoto antice fere perpendiculariter declivi, supra medio brevissimo, utrobique tuberculo humerali instructo; pronoti lateribus deflexis interdum nigro-lituratis; mesonoti lobo medio rugis crassis transversis obtecto; lobis lateralibus laevibus; parte antescutellari rugosa, medio nigra, utrobique rufata; fovea media profunda, utrobique serie punctorum crassiorum repleta et longitudinaliter carina acuta dimidiata; scutello subruguloso, apice parvo tuberculo conico instructo, appendice laevi; postscutello levissime ruguloso; mesopleuris laevibus, nitentibus, vix punctulatis; abdominis dorso laevi, nitente, apice minus rotundato; segmento ultimo dorsali longius producto; vagina exserta, crassiuscula, apicem versus attenuata.*

Long. 20—22 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

Von *D. Andrei* Knw., welcher die neue Art nahe verwandt ist, ausser durch die Färbung des Körpers und der

Flügel hauptsächlich verschieden durch die Bildung der Stirn und des hinteren Theiles des Mesonotum. Die erstere ist bei *Andrei* unter dem vorderen Nebenaugel breit und tief grubig eingedrückt; und das Mesonotum ist vor dem Schildchen kaum grubig vertieft und in der Vertiefung nicht gekielt. Die Bildung der Tarsen und Klauen ist dieselbe.

2. Gen. *Xiphydria* Latr.

1. *X. paragaudis* n. sp. ♀ *Nigra*; *macula interantennali triangulari, orbita interiore, macula ad oculorum angulum supero-interiorem sita, 2 vittis verticalibus, fascia temporali, utrobique pronoti 2 maculis parvis tuberculo humerali discretis, scutelli macula, postscutello, mesopleurorum macula superiore citreis; abdominis segmentis dorsalibus 2^o, 4^o, 9^o utrobique citreo-maculatis, 5^o, 6^o, 7^o, 8^o citreo-fasciatis; fascia segmenti 7 i utrobique decurtata; pedum anticorum genibus tibiisque fuscis; ventre passim rufo-pellucente; alis subcinereo-hyalinis; venis et stigmatibus obscure fuscis. — Gracilis, parum nitida, cano-pubescent; capite thorace fere latiore, pone oculos subdilato; palpis maxillaribus elongatis, 6-articulatis; articulo primo 2 insequentes, tertio 2 ultimos longitudine aequantibus, paenultimo brevissimo; clypeo subtilissime striato, apice dente minimo instructo, a fronte non discreto; antennis abdomine brevioribus, subsetaceis, fere 23-articulatis, articulo primo 3^o vix longiore, curvato, apicem versus incrassato; secundo 7^o aequilongo; tertio 4^o non sequi longiore; 2 basalibus subnitentibus, ceteris opacis; facie punctata et subtilissime rugulosa, subopaca; fronte supraantennali medio late et profunde foveolatum impressa; oculo inferiore in linea oculos tangente posito; vittis verticalibus in aversum convergentibus, superne decurtatis; sincipite laevi, nitente, punctis impressis consperso; pronoti parte praecisa superne linea tenui undulata terminata; mesonoto subtiliter ruguloso et punctato, subopaco; scutello utrobique tenuiter marginato; mesopleuris rugulosis; abdominis segmentis dorsalibus 4 anterioribus laevibus, nitentibus, ceteris subtilissime sculpturatis, ultimis opacis; unguiculis simplicibus; vagina longius exserta.*

Long. 11 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

3. Gen. *Aprosthemata* n. g.

(aus *a* privativum und *προσθημα* gebildet: sine cellula appendiculata; nomen gen. feminini).

Da Le Peletier für seine Gattung *Schizoceros* — Le P. schrieb „*Schizocera*“; aber lateinisch ist nur die Form

Schizoceros möglich — lediglich die Arten *T. furcata* Vill., *geminata* Gmel. und *H. plumigera* Kl. anführt, so kann dieser Name allein für die Gattung gebraucht werden, für die seit Thomson der Dahlbom'sche Name *Cyphona* angewandt wurde. Dagegen erlaube ich mir für die seit Thomson unrichtig unter dem Namen „*Schizocera*“ oder „*Schizocerus*“ aufgeführte Gattung obigen Namen vorzuschlagen. Diese Gattung ist durch folgende Merkmale charakterisiert: Flügel ohne Anhangszelle; Vorderflügel ohne Intercostalnerv; Cubitalzellen 4; der erste Cubitalnerv manchmal oblitteriert; der erste Medialnerv mündet in die 2. Cubitalzelle, der zweite in die dritte, oder derselbe ist interstitial; der Discoidalnerv ziemlich weit vor der Basis des Cubitus; Humeralfeld gestielt; Hinterflügel mit 2 Mittelzellen; Humeralfeld etwas länger als der freie Theil des Brachius hinter demselben; drittes Fühlerglied des ♂ gegabelt, des ♀ ziemlich kurz, dick, stumpf; Tibien ohne Supraapicalsporn.

4. Gen. *Allantus* Jur.

1. *A. primoris* n. sp. ♀ *Ater, nitidus; labro, clypeo, abdominis segmento primo dorsali — summa basi excepta — eburneis; ceteris segmentis dorsalibus et ventralibus postice luteo-limbatis; pedum trochanteribus cum coxarum summo apice, genibus, tibiaram basi et mandibularum macula e luteo albidis; alis fusciscenti-hyalinis; superiorum vitta obscure fusca, violaceo-nitente; venis nigris, stigmatate piceo. — Magnus, parce cano-pilosulus; capite crasso, thoracem latitudine fere superante, pone oculos rotundato-subangustato, fere polito, nitente; clypeo apice profundius emarginato; antennis thoracem longitudine paullulum superantibus; articulo tertio 2 basalibus duplo longiore, ceteris fere clavam subfusiformem efficientibus; fronte supraantennali late et profunde longitudinaliter sulcata; temporibus postice acute marginatis; vertice longitudine sua fere duplo latiore; mesonoto sparsim punctato, nitido; scutello pyramidatim elato; mesopleuris crasse rugoso-punctatis, ad pectus intumescens; alarum superiorum areis intercostali, radiali, anali, areae cubitalis maxima parte, areae humeralis medio, cellula discoidali, inferiorum area intercostali obscure fuscis; feminae vagina exserta, angusta, pilosa.*

Long. 17 mm.

Patria: Sikkim.

2. *A. cingulifer* n. sp. ♀ *Niger*; *palpis luteis*; *mandibulis* — *apice brunneo excepto* — *labro, clypeo, pronoti angulis posterioribus latis, scutello, macula metapleurali sulphureo-albidis*; *antennarum articulo basali flavo, secundo concolore, nigro-maculato vel toto nigro*; *abdominis segmentis dorsalibus 2^o et 7^o totis nigris, 1^o, 3^o, 6^o utrobique albido-maculatis, 4^o et 5^o postice albido-limbatis, quinti fascia medio latius interrupta*; *segmentis 8^o et 9^o sulphureo-albidis, summa basi nigris*; *segmentis ventralibus 3^o, 4^o, 5^o apice luteo-limbatis vel maculatis*; *pedibus nigris*; *tibiis, coxarum summo apice, trochanterorum omnium et femorum anteriorum latere antico, femorum posteriorum basi apiceque sulphureis*; *tibiis anterioribus apice nigro-maculatis, posticis apice nigris*; *tarsis rufescentibus, posticis medio nigricantibus*; *alis lutescenti-hyalinis*; *costa rufa*; *stigmate testaceo, basi fusco*; *ceteris venis fuscis, basin versus rufescentibus*. — *Subelongatus*; *capite, pronoto, mesopleuris cinereo-pilosulis*; *hoc lato, pone oculos non angustato, crassius, ruguloso-punctato, parum nitente*; *clypeo apice minus profunde emarginato*; *antennis brevibus, apice clavatis, thoracem longitudine aequantibus*; *articulo primo crasso, secundo brevissimo, tertio 2 insequentes longitudine fere superante, ultimo fortius compresso, facie supraantennali depressa*; *fronte vix impressa*; *ocellis superioribus super lineam oculos tangentem positis*; *vertice longitudine sua fere duplo latiore*; *mesonoto crassius punctato, subnitente*; *mesopleuris rugoso-punctatis, fere opacis*; *scutello fortius transverso et elato, sparsim et non profunde punctato, nitente*; *abdomine apice pubescente*; *segmento primo dorsali medio nitente, ceteris subtiliter sculpturatis, fere opacis*; *vagina nigra, parum exserta, cano-pilosula*.

Long. 12—13 mm.

Patria: Turkestan (Kl. Alai).

Dem *A. Schaefferi* Kl. nahe verwandt und ähnlich gefärbt, hauptsächlich durch das viel breitere und stark erhabene Rückenschildchen verschieden, das bei *Schaefferi* flach und scharf punktiert ist.

3. *A. glesicornis* n. sp. ♀ *Niger*; *palpis, labro, clypei lateribus vel maxima parte, pronoti maculis 4 angularibus, tegularum margine anteriore, scutello, segmentorum dorsantium margine posteriore sulphureis*; *segmento secundo nigro*; *primi apice medio et angulis lateralibus sulphureis*; *segmentorum 3i et 4i fascia apicali lateribus latissima, medio angustata*; *ceteris fasciis angustioribus*; *pedibus nigris*; *trochantero secundo et femorum anticorum latere anteriore al-*

bescentibus; tibiis tarsisque et antennis rufis; illorum articulo basali flavo; alis flavescenti-hyalinis; costa et stigmatibus rufis, ceteris venis dilute fuscis. — Elongatus, cinereo-pubescentis; capite pone oculos non angustato, parum nitente; clypeo longitudine sua parum latiore, apice minus profunde et subtriangulariter exciso; antennis tenuibus, apice non vel vix clavatis, caput una cum thorace longitudine fere aequantibus; facie vix, fronte supraantennali evidentius punctulatis; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice densius punctulato, subopaco, longitudine sua sesqui latiore; temporibus inferioribus interdum luteo-lituratis; mesonoto et mesopleuris dense punctulatis et fere opacis; scutello crassiore, transverso, subelato, punctulato, magis nitente.

Long. 11 mm.

Patria: Sibiria or. (Irkutsk).

Unserm *A. Scrophulariae* L. verwandt, durch viel längere und dünnere Fühler, längeren Clypeus und viel feinere Skulptur auf Kopf und Thorax verschieden.

4. *A. annuliger* n. sp. Niger; palpis, mandibularum dimidio basali, labro, clypeo, antennarum basi et annulo medio, pronoto, mesonoti lobo medio — macula magna basali nigra excepta — et macula parva utrobique ante scutellum sita, scutello, postscutello, tegulis, meso- et metapleuris maxima parte, abdominis dorso maxima parte, pedibus pallide sulphureo-vel virescenti-albidis; tibiis apice magis minusve fusco; tarsis nigro-annulatis; alis hyalinis; costa et stigmatibus sulphureis; illius latere interiore fusco; ceteris venis, summa basi excepta, fuscis. — Ovatus, albedo-pubescentis, subnitidus; capite lato, pone oculos non angustato, vix sculpturato, parum nitente; clypeo profunde semicirculariter exciso; antennis tenuibus, apice clavatis, thoracem longitudine aequantibus; articulis 2 basalibus sulphureis, tertii basi et annulo angusto apicali concolore; fronte supraantennali medio vix sulcatim impressa; ocellis superioribus supra lineam oculos tangentem positis; sincipite brevi; vertice longitudine sua plus quam duplo latiore; mesonoto vix, antice evidentius et densius punctulato; scutello subconvexo; abdominis segmentis dorsalibus primo et 3 vel 4 apicalibus fere totis pallidis, ceterorum limbo apicali medio magis minusve angustato; ventre nigro, segmentis posterioribus magis minusve pallido-limbatis; vagina angusta.

Long. 10 mm.

Patria: Bokhara or.

Dem *A. discolor* Knw. nahe verwandt, aber durch den viel tiefer ausgeschnittenen Clypeus, die längeren Fühler,

die höher stehenden Ocellen, das nicht punktierte Gesicht und die dichtere und feinere Punktulierung des Mesonotum verschieden. Das zugehörige Männchen dürfte rote Hinterleibsmittle haben.

5. *A. dissiduus* n. sp. ♂ ♀ *Niger*, *maris abdomine rufo-cingulato*; *pulpis, mandibularum macula exteriori, labro, clypeo, pronoti angulis posterioribus, tegulis, feminae etiam scutelli macula, mesopleurorum litura, metapleurorum macula virescenti- vel albido-sulphureis*; *abdomine maris nigro, segmentis 3^o, 4^o, 5^o obscure rufis*; *segmenti ultimi ventralis et forcipis apice late luteo*; *feminae segmentis dorsalibus apice late sulphureo-imbatis*; *fasciis 2^a, 3^a, 4^a, medio late interruptis, 5^a, 6^a, 7^a medio angustatis, segmentis 8^o et 9^o fere totis pallidis*; *segmentis ventralibus 3—6 apice magis minusve albido-imbatis*; *pedibus utriusque sexus sulphureis, feminae magis minusve rufescentibus*; *coxarum basi et tibiarum posticarum tarsorumque apice nigris*; *maris etiam femoribus posticis ante apicem nigro-maculatis*; *alis hyalinis*; *costa et stigmati testaceis*; *illius latere interiore fusco*; *ceteris venis nigricantibus*. — *Ovatus, albido-pubescentis, nitidus*; *capite pone oculos rotundato*; *clypeo apice angustius exciso, angulis latis, punctatis*; *antennis thoracem longitudine vix aequantibus, apice compresso-clavatis, nigris, feminae articulo basali luteo-maculato*; *facie subpunctulata*; *frontis sulco super antennas angusto, sub oculo anteriore dilatato et minus profunde impresso*; *ocellis superioribus in linea oculos tangente positis*; *sincipite brevi*; *vertice longitudine sua fere triplo latiore*; *temporibus densius punctulatis*; *mesonoto sparsim, scutello et mesopleuris densius subtiliter punctatis*; *abdominis dorso subtilissime sculpturato, fere opaco*; *segmento basali nitente*; *feminae vagina angusta, parum exserta, basi apiceque nigra*.

Long. 9--10 mm.

Patria: Turkestan (Kl. Alai).

5. Gen. *Tenthredo* L.

1. *T. serraticornis* n. sp. ♀ *Nigra*; *pulpis rufescentibus*; *mandibulis — apice brunneo excepto — labro, 2 clypei maculis majoribus, macula metapleurali albidis*; *abdomine rufo, segmentis 1^o et 2^o dorsalibus nigris*; *pedibus rufis, coxis trochanteribusque et tarsis posticis nigris*; *illorum summa basi et unguiculis rufis*; *alis hyalinis, costa rufa, ceteris venis et stigmati fuscis*. — *Elongata*; *capite et mesopleuris cano-pubescentibus*; *hoc lato, pone oculos non an-*

gustato; antennis gracilibus, apicem versus attenuatis, abdomine multo brevioribus, caput una cum thorace longitudine vix superantibus; articulis mediis apice subincrassatis et subproductis, fere serratis; fronte supraantennali punctata, medio sulcatim depressa; ocellis superioribus supra lineam oculos tangentem positis; sincipite sparsim punctulato, parum nitente; vertice longitudine sua fere sesqui latiore; mesonoto subtilissime sculpturato, opaco; lobis lateralibus praeterea acute punctulatis; scutello subelato, punctato; vagina nigricante, vix exserta, nigro-pilosa.

Long. 13 mm.

Patria: Mongolia (Karaschar).

Diese Art, die ich Herrn Dr. O. Staudinger verdanke, ist dem gleichfalls in der Mongolei vorkommenden *Allantus Haberhaueri* Kirby sehr ähnlich gefärbt; doch unterscheiden sie leicht die dünnen, fast sägezähnigen Fühler, die deutlichen Fühlerhöcker und die nicht getrübbten Flügel.

2, *T. auraria* n. sp. ♀ *Tricolor; capite et thorace nigris; ore — mandibularum apice brunneo excepto — facie inferiore usque ultra antennis, orbitis interioribus, medio dilatatis; superne oculorum angulum supero-interiorem superantibus, genarum appendice, temporibus inferioribus usque ad sinciput, pronoti latis angulis anterioribus et posterioribus, tegulis, scutello, meso- et metapleuris eburneis; scutello postice nigro-limbato, appendice utrobique albido-marginato; abdomine rufo; segmentis dorsalibus 3 anterioribus nigris, utrobique pallido-limbatis; ventre basin versus pallescente; pedibus rufis; coxis, trochanteribus, femorum anteriorum latere antico, posticorum basi pallide flavidis; femoribus postice nigro-vittatis; tibiis anticis postice fusco-lineatis; alis flavescenti-hyalinis; costa et stigmatate rufis; ceteris venis et stigmatatis medio fuscis. — Elongata; capite thorace fere angustiore, pone oculos angustato; antennis tenuibus, fere filiformibus, apice vix attenuatis, caput una cum thorace longitudine paullulo superantibus; fronte inter antennis profunde depressa, tuberculis antennalibus valde prominentibus; vertice brevi, in aversum dilatato, longitudine sua fere duplo latiore; mesonoto subtiliter punctulato, subnitente; vagina angusta subexserta, cano-pilosa.*

Long. 11 mm.

Patria: Alaska (Ft. Wrangell).

Diese nordamerikanische Art ist der *T. scaevola* Cress. fast gleich gefärbt; aber viel schmaler und schlanker; der Kopf viel kleiner, hinter den Augen deutlich verschmälert;

die Fühler viel länger und dünner, und der Scheitel kürzer und breiter. Bei *T. scaevola* ist der Kopf breit und dick, hinter den Augen fast breiter als vorn quer über dieselben; die Fühler ziemlich dick und kürzer als Kopf und Thorax zusammen; der Scheitel wenig breiter als lang; und das Mesonotum ist dicht, besonders auf dem Mittellappen sehr dicht punktuiliert, matt.

Zur weiteren Kenntniss der Coleopteren-Gattung *Mycetochara* Berthold.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1. *Mycetochara satanula* n. sp.

Langgestreckt, ziemlich flach, fast gleichbreit, schwarz, etwas glänzend, fein, anliegend grauschwarz behaart. Fühler die halbe Körperlänge kaum erreichend, dick, einfarbig, röthlichbraun, die Glieder wie bei den bekannten Arten gebaut. Kopf gross, sammt den grossen, vorgequollenen Augen wenig schmaler als der Thorax, der Raum zwischen ihnen halb so breit als der Durchmesser eines Auges, Schläfen kaum vorhanden, oben fein und dicht punktiert, Clypeus schwarz, durch einen kurzen Quereindruck von der Stirne abgesetzt. Halsschild quer, flach, schmaler als die Flügeldecken, an der Basis am breitesten, von da zur Mitte schwach, von hier zur Spitze stärker verengt, die Vorderwinkel breit abgerundet, die hintern rechteckig, vor der schwach dreibuchtigen Basis mit 3 Eindrücken, der mittlere klein, die seitlichen gross, flach, schräg über die Hinterwinkel ansteigend, daher die Gegend der letzteren stärker verflacht. Flügeldecken sehr dicht punktirt und mit mehreren ausgesprochenen Dorsalstreifen, daher weniger glänzend, als andere Arten. Beine schmutzig hellbraun, die Schenkel dunkler, die Tarsen schlank. Long. 7—8 mm.

Gehört in die I. Gruppe nach Seidlitz Rev. zu *ocularis* und *angustifrons* m.

Kamtschatka; 2 ♀ von Herz im Juli 1890 gesammelt. (Col. Reitter.)

2. *Mycetochara angustifrons* n. sp.

Der *M. gracilis* Fald. täuschend ähnlich, ebenfalls ziemlich lang gelbgrau behaart, und ähnlich gefärbt: oben

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Konow Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: [Einige neue Clialastogastra Â• Arten und eine neue Gattung 148-155](#)