© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Deporaus Samou.[1]) aus Europa und dem Kaukasus.

Gegeben von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

(Kopf am Hinterrande halsartig eingeschnürt).

1'' Flügeldecken in der Umgebung des Schildchens verworren punktiert, um die Hälfte länger als zusammen breit; Rüssel länger als der Kopf. Schwarz, Flügeldecken blau, selten grün. Fühlerkeule (3-gliedrig) oval, die Glieder dicht aneinandergeschlossen.

2'' Oberseite schwarz behaart. — Mittel und Südeuropa. — *tristis* Fbr.

2' Oberseite greis behaart, die Behaarung etwas kürzer und weniger gehoben. Flügeldecken häufig grün. — Kaukasus. *seminiger* Reitt.

1' Flügeldecken im Umkreis des Schildchens nicht verworren punktiert, ohne abgekürzten Scutellarstreifen.

3'' Halsschild breit und quer scheibenförmig, an den Seiten stark gerundet, die dreigliederige Fühlerkeule stark abgesetzt, die Glieder nicht gedrängt aneinander gegliedert, das letzte schmäler als das vorhergehende. Flügeldecken mit breiten, dicht punktierten Zwischenräumen.

Schwarz, die Flügeldecken und Schenkel blauschwarz, fein grau behaart. Rüssel dick, beim ♂ so lang als der Kopf, beim ♀ länger, Stirn vom Rüssel quer abgesetzt, Augen stark vortretend, Schläfen nach hinten leicht verengt, ziemlich kurz, Hals schwach eingeschnürt. Halsschild querelliptisch, dicht hinter der Mitte am breitesten, wie der Kopf dicht und fein punktiert, manchmal mit angedeuteter Mittellinie. Schildchen quadratisch. Flügeldecken breit wie bei *tristis*, $^1/_2$ mal länger als zusammen breit, parallel, mit starken Punktstreifen, die Zwischenräume breiter als die Streifen und wie der Thorax dicht verworren punktiert. Beine normal, Tarsen ziemlich schlank. Long. 3.5—4 mm ohne Rüssel. ***punctatissimus*** n. sp.

Befand sich in einiger Zahl in den Vorräthen des Herrn Cristoph, unter dem kaukasischen Materiale. Nachdem Cristoph auch in Ostsibirien gesammelt hatte und dort Arten vorkommen, die dieser näher verwandt sind als die kaukasischen, so musste auch auf die sibirischen Arten um so mehr Rücksicht genommen werden, als dieser ja möglich nur durch Verwechslung unter die Kaukasier kam. — Von

1) Siehe Faust, D. 1887 163.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

den ostsibirischen Arten kommen *Deporaus unicolor* Roel., *affectatus* Fst., *pacatus* Fst., *amurensis* Fst., *proximus* Fst. und *depressus* Fst. in Betracht. — *D. unicolor* und *affectatus*[1]) scheinen dem *betulae* sehr nahe zu stehen und sind schwarz, ebenso ist *depressus* ganz schwarz und matt; *pacatus* und *amurensis* sind lang und schmal gebaut, und *proximus* hat nur einreihig punktierte Zwischenräume der Flügeldecken.

3′ Halsschild schmäler, nicht oder wenig kürzer als breit. Käfer gestreckter, die Zwischenräume der Flügeldecken mit einer unordentlichen sehr feinen Punktreihe. Körper länglich.

4″ Oberseite wie der ganze Käfer schwarz und oben schwarz behaart; Hinterschenkel des ♂ verdickt. — Europa bis Ostsibirien. — *Rh. alni Müll.* ***betulae*** Lin.

4′ Oberseite dunkel blau, fein grau oder greis behaart; Hinterschenkel des ♂ einfach. Käfer langgestreckt.

5″ Augen wenig vorragend, die Schläfen fast so breit als der Augenrand, Rüssel beim ♀ so lang als Kopf und Halsschild, beim ♂ so lang als der Kopf; Halsschild merklich breiter als lang. Sonst dem nachfolgenden ähnlich, aber weniger schmal. Long. 3 mm. — Kaukasus?, Ostsibirien: Wladiwostok. ***pacatus*** Faust.

5′ Augen stark vorragend, die Schläfen schmäler als der äussere Theil der Augenwölbung, Rüssel beim ♂ und ♀ so lang als breit, schmal. Long. 3 mm. — Nord- und Mitteleuropa, Frankreich. — *Rh. constrictus* Schh. *D. Mannerheimi* Bedel (non Humm.) ***megacephalus*** Germ.

---

[1]) Als *affectatus* Fst. erhielt ich von Freund Koltze 3 Exemplare (♂ mit verdickten Hinterschenkeln), welche ich aber für *betulae* Lin. halte.

Neue Tenthredinidae aus Südamerika.

Von Fr. W. Konow, p. — Teschendorf.

1. Gen. *Acorduleceros* Say.

(cf. Entom. Nachrichten 1898, n. 16, p. 250).

1. *A. vericulatus* n. sp. ♂ ♀ Niger, nitidus; mandibulis magis minusve rufatis; antennarum 2 articulis basalibus maris obscure rufis, feminae luteis; pedibus albidis; tarsorum apice nigricante; maris coxis — apice excepto — et femoribus posticis nigris; maris femoribus anterioribus obscuratis; feminae pronoto, mesonoto, scutello, postscutello rufis, et abdominis basi magis minusve rufo-pellucente; tegulis piceis; alis utriusque sexus dilute nigricantibus; venis et stigmate fuscis.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Depbraus Samou. aus Europa und dem Kaukasus. 306-307