

- den ostsibirischen Arten kommen *Deporaus unicolor* Roel., *affectatus* Fst., *pacatus* Fst., *amurensis* Fst., *proximus* Fst. und *depressus* Fst. in Betracht. — *D. unicolor* und *affectatus*¹⁾ scheinen dem *betulae* sehr nahe zu stehen und sind schwarz, ebenso ist *depressus* ganz schwarz und matt; *pacatus* und *amurensis* sind lang und schmal gebaut, und *proximus* hat nur einreihig punktierte Zwischenräume der Flügeldecken.
- 3' Halsschild schmaler, nicht oder wenig kürzer als breit. Käfer gestreckt, die Zwischenräume der Flügeldecken mit einer unordentlichen sehr feinen Punktreihe. Körperlänglich.
- 4'' Oberseite wie der ganze Käfer schwarz und oben schwarz behaart; Hinterschenkel des ♂ verdickt. — Europa bis Ostsibirien. — *Rh. alni* Müll. *betulae* Lin.
- 4' Oberseite dunkel blau, fein grau oder greis behaart; Hinterschenkel des ♂ einfach. Käfer langgestreckt.
- 5'' Augen wenig vorragend, die Schläfen fast so breit als der Augenrand, Rüssel beim ♀ so lang als Kopf und Halsschild, beim ♂ so lang als der Kopf; Halsschild merklich breiter als lang. Sonst dem nachfolgenden ähnlich, aber weniger schmal. Long. 3 mm. — Kaukasus?, Ostsibirien: Wladiwostok. *pacatus* Faust.
- 5' Augen stark vorragend, die Schläfen schmaler als der äussere Theil der Augenwölbung, Rüssel beim ♂ und ♀ so lang als breit, schmal. Long. 3 mm. — Nord- und Mitteleuropa, Frankreich. — *Rh. constrictus* Schh. *D. Mannerheimi* Bedel (non Humm.) *megacephalus* Germ.

¹⁾ Als *affectatus* Fst. erhielt ich von Freund Koltze 3 Exemplare (♂ mit verdickten Hinterschenkeln), welche ich aber für *betulae* Lin. halte.

Neue Tenthredinidae aus Südamerika.

Von Fr. W. Konow, p. — Teschendorf.

1. Gen. *Acorduleceros* Say.

(cf. Entom. Nachrichten 1898, n. 16, p. 250).

1. *A. vericulatus* n. sp. ♂ ♀ Niger, nitidus; mandibulis magis minusve rufatis; antennarum 2 articulis basalibus maris obscure rufis, feminae luteis; pedibus albidis; tarsorum apice nigricante; maris coxis — apice excepto — et femoribus posticis nigris; maris femoribus anterioribus obscuratis; feminae pronoto, mesonoto, scutello, postscutello rufis, et abdominis basi magis minusve rufo-pellucente; tegulis piceis; alis utriusque sexus dilute nigricantibus; venis et stigmate fuscis.

Parvus; capite et thorace maris subtiliter et brevissime nigro-pilosulis; feminae sincipite fusco-pilosulo, facie et thorace cano-pubescentibus; capite pone oculos valde angustato; temporibus brevissimis; oculis maximis, elongatis, mandibularum basin attingentibus; clypeo apice rotundato; palpis maxillaribus elongatis, obscuris, apice subcompressis et paullulum dilatatis; antennis brevibus, oculorum diametra transversa parum longioribus; articulis 2 basalibus crassioribus; secundo 1^o fere longiore; flagello nigro, nigro-pilosulo, medio subincrassato; articulo tertio e basi tenui apicem versus dilatato, 2 insequentes longitudine aequante; illis globosis; ultimo maris elongato, praecedente sesqui longiore, feminae fere globoso; fronte supraantennali laevi, medio subimpressa; ocellis longe sub linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua duplo latiore; mesonoto laevi; sulco medio profundo, longe a scutello distante; scutello margine tenui acuto circumcincto; margine apicis depresso et, a latere invisio, ad dentis instar prolongato; tarsis anticis tibia parum longioribus; tibiarum posteriorum spina supraapicali tenerrima, vix conspicua; abdomine apicem versus attenuato, feminae subcompressa; vagina subexserta, crassiuscula, apicem versus subattenuata, breviter cano-pilosula. — Long. 3,5—4 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

2. *A. longimanus* n. sp. ♀ Niger, nitidus; ore et pedibus albidis; tarsis nigris, anticorum basi pallida; scutelli apice et postscutello subrufescentibus; alis dilute nigricantibus; venis et stigmate fuscis.

Parvus; sincipite et mesonoto subtiliter et brevissime nigro-pilosulis, facie et mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos valde angustato; temporibus brevissimis; oculis majoribus, mandibularum basin attingentibus; clypeo apice truncato; palpis albidis, brevioribus; antennis . . . (?); fronte supraantennali convexa, non impressa; ocellis longe sub linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua duplo latiore; mesonoto laevi; sulco medio profundo, spatio depresso a scutello sejuncto; scutello margine acuto circumcincto; tarsis anticis longissimis, tibia multo longioribus; tibiarum posteriorum spina supraapicali validiuscula; abdominis apice rotundato; vagina e basi angusta apicem versus subdilatata, apice rotundata. — Long. 4 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

3. *A. ruficeps* n. sp. ♂ ♀ Niger; capite rufo; palpis antennisque e viridi nigricantibus; mandibularum basi pallida,

viventium viridi: clypeo magis minusve obscurato; maris pronoto, tegulis, abdominis parte, pedibus luteis; abdomine apicem versus magis minusve nigrato, interdum maxima parte nigro; segmento ultimo ventrali nigro; feminae ano e viridi luteo, vagina nigra, pedibus pallidis, magis minusve nigratis, viventium viridibus; utriusque sexus coxis — summo apice excepto — nigris, tarsis magis minusve nigricantibus; alis maris lutescenti-hyalinis; costa et stigmate pallide testaceis; ceteris venis pallide fuscescentibus, medio obscurioribus; alis feminae subcinereo-hyalinis; costa et stigmate obscure testaceis vel fuscis, viventium saturate viridibus; ceteris venis fuscis, medio nigris.

Crassiusculus; mas cano-, femina obscure breviter pilosulis; capite crasso, pone oculos elongato et vix angustato; palpis maxillaribus tenuibus, elongatis, antennis longitudine superantibus, articulo ultimo longissimo; palpis labialibus crassiusculis; clypeo medio transversim elato, fere fracto, apice rotundato; antennis gracilibus, capitis latitudinem longitudine fere aequantibus; articulis 2 basalibus brevibus, crassiusculis, fere aequilongis; ceteris elongatis; tertio 4^o non sesqui longiore; genarum appendice primum antennarum articulum longitudine aequante; oculis breviter elipsiformibus; fronte supraantennali subelata, medio sulcatim impressa; ocellis superioribus fere in linea oculos tangente positis; vertice crasso, longitudine sua paullulo latiore; mesonoto vix sculpturato, subnitente; scutello magno, margine lato, acuto, suberecto circumcincto; maris segmento dorsali 8^o brevissimo, sub praecedente occulto; segmento ultimo ventrali erecto, anum occludente, apice late rotundato-truncato; feminae vagina non exserta, crassa, apice hiant et pilosa. — Long. 5—6 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

2. Gen. *Labidarge* n. g.

(aus *λαβίς* = forceps und *Arge* gebildet).

Argidum genus. Corpus elongatum, molliculum. Caput mediocre, pone oculos angustatum; palpis maxillaribus longis et tenuibus; clypeo a fronte discreto; facie infera medio carinata; antennis elongatis, gracilibus, utriusque sexus biserialiter pilosulis; fronte area pentagona ornata; genis iuxta ocellum inferiorem magis minusve fractis; ocello inferiore in linea oculos tangente posito; sulcis verticinis profundis. Pronotum postice profunde et anguste excisum. Alae

tenerae; omnes cellula appendiculata praeditae; anteriores 4 cellulis cubitalibus instructae; nervo discoidali magis minusve a cubiti basi remoto, a nervo primo mediali valde diver-nervo secundo mediali fere interstitiali. Tibiae posteriores gente; longa spina supraapicali ornatae. Feminae vagina forcipiformis. Cetera ut in genere *Arge*.

In die neue Gattung gehören ausser den folgenden neuen Arten auch die „*Hylotoma*“ *terminalis*, *melanopyga*, *helvola*, *basalis* Kl. und wahrscheinlich sämtliche von Klug aus Südamerika beschriebenen *Hylotoma*-Arten.

1. *L. Bolivari* n. sp. ♂ ♀ Nigra, nitida; prothorace, episternis, scutello, metathorace, abdominis pedumque maiore parte luteis: omnibus tarsis tibiisque posterioribus et abdominis apice nigris; pronoti medio, tegulis, metanoti partibus depressis saepius fuscis vel nigricantibus; interdum abdominis dorso biseriatim fusco-liturato; alis dilute nigricantibus; venis et stigmate nigris.

Elongata; sincipite et mesonoto nigro-, facie et prothorace pallido-pilosulis; capite pone oculos angustato; labro apice depresso et emarginatim impresso; palpis pallidis; maxillaribus valde elongatis; clypeo brevi, apice subemarginato, basi carina acuta medio fracta circumcincto; antennis gracilibus, maris truncum, feminae abdomen longitudine fere aequantibus; articulo tertio maris apicem versus, feminae summa basi subattenuato; fronte bicarinata; carinis acutis, ad carinam facialem convergentibus et cum ea conjunctis, superne fractis et ocellum inferiorem amplectentibus, medio carina transversa sectis; area supera pentagona, utrobique ex angulo laterali carinam ad oculum versus emittente; ocello inferiore in linea oculos tangente posito; vertice longitudine sua maris duplo, feminae sesqui latiore; tibiis tarsisque posticis mediocribus, nigro-pilosis. — Long. 6,5—10 mm.

Patria: Bolivia (Yungas), Peru (Callanga, Cuczo).

Es ist mir besondere Ehre, diese Species dem Herrn Universitäts-Professor J. Bolivar in Madrid dedizieren zu dürfen. Dieselbe kann als typisch für die Gattung gelten,

2. *L. notaticollis* n. sp. ♀ Lutea, nitida; capite, mesonoti macula anteriore, abdominis segmento nono, 2 maculis segmenti octavi, vaginae apice, pedum omnibus tarsis et tibiis posterioribus nigris; alis fusco-hyalinis; venis et stigmate nigris.

Elongata; sincipite et mesonoti macula fusco-, facie, prothorace, mesopleuris cano-pilosulis; capitis iisdem charac-

teribus gaudet quibus *L. Bolivari*; sed antennis abdomine brevioribus; articulo tertio medio subincrassato, crassius pilosulo; mesonoti macula nigra fere dimidium anterius lobi medii occupante; alis fusco-pilosulis. — Long. 9 mm.

Patria: Bolivia.

3. *L. dibapha* n. sp. ♀ Rufa, nitida; capite — ore, facie infraantennali, antennarum 2 articulis basalibus exceptis —, abdominis apice inde a segmento septimo, pedum tibiis posterioribus — basi excepta — et omnibus tarsis nigris; alis flavescenti-hyalinis; apice lato et area intercostali fuscis; venis et stigmate testaceis.

Elongata; sincipite nigro-, pronoto fusco-, facie, mesonoto, mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos rotundato, vix angustato; palpis maxillaribus crassiusculis; antennis abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio ante apicem incrassato, crassius nigro-piloso; facie ut in *L. Bolivari* carinata; sed area pentagona elongata, angulis superioribus fere rotundatis; vertice longitudine sua parum latiore; alarum nervo discoidali longius a cubiti origine remoto; tibiis tarsisque posticis crassiusculis, subcompressis. — Long. 10 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

Von *L. terminalis* Kl. verschieden durch intensivere Färbung, schwarze Mitteltibien, längere und viel stärker behaarte Fühler, breiteren Kopf, schmaleren Scheitel, und dadurch, dass im Vorderflügel der Discoidalnerv viel weiter vor der Basis des Cubitus liegt.

Das von Klug nicht erwähnte Männchen der *L. terminalis* Kl. unterscheidet sich von *L. Bolivari* ♂ durch den gelben Thorax und die viel kürzeren Fühler.

4. *L. Braunsi* n. sp. ♀ Nigra, nitida; thorace, ventris basi, pedum coxis, trochanteribus, femoribus rufis; pronoti medio, mesonoti parva macula anteriore, metanoto nigris; femorum posticorum summo apice nigrato; tibiis anticis antice pallidis; alis nigricantibus; venis et stigmate nigris.

Elongata; capite nigro-, thorace et tibiis anticis pallido-, tibiis posterioribus fusco-pilosulis; capite pone oculos rotundato-angustato; clypeo brevi, subemarginato-truncato; palpis rufis, elongatis; antennis gracilibus, medio vix incrassatis, nigro-pilosis, abdomen longitudine superantibus; facie ut in *L. Bolivari* carinata; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum anteriorum nervo discoidali mox ante cubiti basin sito. — Long. 9 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

Von meinem verehrten Freunde, Herrn Dr. med. J. Brauns erbeutet und mir freundlichst mitgetheilt. Die Art gehört in die Verwandtschaft der *L. rubricollis*, *stigmaticollis*, *infuscata* und *collaris* Kl. Möglicherweise könnte dieselbe mit *L. infuscata* Kl. zusammenfallen; aber bei der reinen Färbung des ♀ ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Männchen unbestimmte Farben zeigen sollte.

3. Gen. *Braunsiola* n. g.

Argidum genus. Corpus parvum. Caput breve; temporibus fere nullis; palpis longiusculis; clypeo medio a fronte non discreto, sed utrobique scrobiculo profundo determinato; facie non carinata; antennis gracilibus, feminae pilosis; ocellis super lineam oculos tangentem positis; vertice brevissimo. Pronotum brevissimum, postice latius et profundius excisum. Alae cellula appendiculata carentes; anteriores 4 cellulis cubitalibus instructae, quarum secunda et tertia singulum nervum medialem excipiunt; nervo discoidali longius a cubiti origine remoto; area humerali petiolata; inferiores sine area humerali, humero non nisi summa basi exstante. Tibiae inermes. Abdomen breve; segmento primo dorsali brevissimo, fere nullo; nuditate maxima; feminae serra longiuscula, sed vix exserta.

1. *Pr. truculenta* n. sp. ♀ Nigra nitida; trochanteribus posterioribus albidis; alis fuscis, obscure pilosulis; venis et stigmate nigricantibus.

Parva, ovata; capite et mesopleuris nigro-pilosulis; hoc pone oculos celeriter rotundato-angustato; clypeo apice rotundato-truncato; antennis tenuibus, caput una cum thorace longitudine aequantibus, abdomine longioribus; articulo tertio subcompresso, lineali; fronte super antennis vix scrobiculatim impressa, utrobique scrobiculo maiore determinata; vertice longitudine sua quadruplo latiore; alarum cellula tertia cubitali 2^a parum longiore sed multo latiore, apicem versus dilatata; nervo tertio cubitali S-formi; tibiis posterioribus incrassatis, femore suo multo crassioribus. — Long. 4 mm

Patria: Brasilia (Santos).

Die neue Gattung trägt ihren Namen zu Ehren ihres Entdeckers, des Herrn Dr. med. Brauns.

Tabelle der *Argides*.

1. Vorderflügel mit Intercostalnerv (Subtr. *Argides*). . 2.
- Dieselben ohne Intercostalnerv (Subtr. *Schizocerides*).

2. Hintertibien mit Supraapicalsporn 3.
- Dieselben unbewaffnet 4.
3. Das untere Nebenaugen in der Augentangente; Körper gestreckt; Fühler lang und dünn, bei beiden Geschlechtern zweireihig behaart.
 1. gen. *Labidarge* Knw.
- Ocellen über der Augentangente; Körper eiförmig; Fühler ziemlich dick, nur beim ♂ zweireihig behaart.
 2. gen. *Arge* Schrank.
4. Hinterflügel mit Anhangszelle; im Vorderflügel mündet der zweite Medialnerv in die dritte Cubitalzelle oder ist interstitial 5.
- Hinterflügel ohne Anhangszelle 7.
5. Tibien comprimiert.
 3. gen. *Athermantus* Kirby.
- Tibien und Tarsen einfach 6.
6. Discoidalnerv des Vorderflügels von der Basis des Cubitus entfernt; das untere Nebenaugen in der Augentangente.
 4. gen. *Cibdela* Knw.
- Discoidalnerv entspringt unmittelbar neben der Basis des Cubitus; Ocellen hoch über der Augentangente.
 5. gen. *Pampsilota* Knw.
7. Vorderflügel mit 3 Cubitalzellen (der zweite — oder dritte? — Cubitalnerv fehlt).
 6. gen. *Topotria* Kirby.
- Vorderflügel mit 4 Cubitalzellen (oder der erste Cubitalnerv ist fehlgeschlagen) 8.
8. Discoidalnerv entspringt dicht vor der Basis des Cubitus; Ocellen in flachem Bogen; Fühler, Tibien und Tarsen stark verbreitert.
 7. gen. *Pachylota* Westw.
- Discoidalnerv von der Basis des Cubitus entfernt 9.
9. Vorderflügel mit Anhangszelle; Ocellen im Dreieck; Fühler und Beine einfach; beim ♂ das 3. Fühlerglied gespalten.
 8. gen. *Dieloceros* Curtis.
- Alle Flügel ohne Anhangszelle; Ocellen in flachem Bogen; Hintertibien verdickt.
 9. gen. *Braunsiola* Knw.

Die Gattungen *Topotria* und *Athermantus* sind mir nicht bekannt. Dieselben werden von W. G. Ashmead zu den *Schizocerides* gestellt, gehören aber sehr wahrscheinlich an die ihnen oben angewiesene Stelle. Möglicherweise fällt sogar die Gattung *Athermantus* mit *Cibdela* zusammen; aber Kirby's ungenügende Diagnose lässt ein sicheres Urtheil nicht zu. Da ferner Mr. Wm. Ashmead's Auf-

stellungen, soweit ich dieselben kontrollieren konnte, sich fast nirgends als haltbar erwiesen haben, so sind seine angeblich neuen Gattungen *Micrange* und *Gymniopterus* in die obige Tabelle nicht aufgenommen worden. Die Gattung *Micrange* würde sich von *Braunsiola* dadurch unterscheiden, dass der erste Cubitalnerv fehlt, während bei *Gymniopterus* die Vorderflügel eine Anhangszelle haben.

4. Gen. *Blennocampa* Htg.

1. *Bl. munda* n. sp. ♀ Flava, nitida; antennis, sincipite cum faciei superiore parte, vagina, pedum posteriorum tibiis tarsisque nigris; tarsorum anticorum apice fusco.

Ovata; sincipite et mesonoto fusco-pilosulis; capite pone oculos angustato, temporibus brevissimis; clypeo apice rotundato; antennis caput una cum thorace longitudine aequantibus, nigro-pilosulis; articulo primo magis minusve pallescente, 2^o aequilongo; tertio 4^o sesqui longiore; fronte super antennis vage impressa et utrobique scrobiculo profundiore determinata; ocellis superioribus in oculorum tangente sitis; vertice longitudine sua vix latiore; alis dilute nigricantibus, basin versus sublutescentibus; venis et stigmate nigris; cellula tertia cubitali 2^a vix longiore; nervo mediali secundo interstitiali; pedum unguiculis apice bifidis; tibiis tarsisque posticis crassiusculis. — Long. 8 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

2. *Bl. torva* n. sp. ♂ Nigra, nitida; pronoti angulis posterioribus, tegulis, mesonoto, scutello sanguineis; mesonoti lobo medio antice nigrato; alis obscure fuscis; venis et stigmate nigricantibus.

Ovata; capite et pronoto nigro-pilosulis; hoc pone oculos rotundato-angustato; temporibus brevissimis; clypeo apice rotundato-truncato; antennis nigro-pilosulis, abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio 4^o sesqui longiore; ceteris longitudine decrescentibus; ultimo parvo; fronte supra antennis vage impressa, utrobique scrobiculo profundiore determinata; ocellis superioribus in linea oculos tangente sitis; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum cellula tertia cubitali 2^a longiore, apicem versus valde dilatata; nervo tertio cubitali cum radiali interstitiali, cum cubito angulum acutum efficiente. — Long. 5 mm.

Patria: Peru (Callanga, Cuczo).

Es ist fast wahrscheinlich, dass diesem Männchen das vorige Weibchen als anderes Geschlecht zugehört, obwol

die andere Form des Scheitels dagegen zu sprechen scheint. In diesem Falle würde für die Spezies der Name des Mannes zu behalten sein.

5. Gen. *Monophadnus* Htg.

1. *M. alveatus* n. sp. ♂ ♀ Rufus, nitidus; capite, abdominis apice, pedum tibiis tarsisque nigris; tibiis anticis antice rufatis; alis fuscis; venis et stigmatibus nigris.

Elongatus, fere cylindricus; maris abdomine subdepresso; capite et tibiis nigro-, thorace luteo-pilosulis; capite pone oculos angustato; clypeo elongato, apice rotundato-truncato; palpis longis, nigris, medio magis minusve pallescentibus; antennis abdomen longitudine aequantibus, medio incrassatis; brunneo-pilosulis; articulo tertio 4^o longiore; fronte inter antennis alveata, supra 2 scrobiculis parvis coarctata; area pentagona nulla; ocellis superioribus in linea oculos tangente positus; vertice longitudine sua sesqui latiore; alarum nervo radiali fere interstitiali; nervo tertio cubitali obliquo, cum cubito, angulum acutum efficiente; cellula tertia cubitali 2^a longiore; abdominis segmentis dorsalibus 5—8 medio nigris, utrobique rufis; feminae vagina subexserta, fusco-pilosa. — Long. 9—10 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

6. Gen. *Stromboceros* Kuw.

1. *Str. tribrachys* n. sp. ♂ ♀ Niger, nitidus; prothorace, mesonoto, scutellis, tegulis, episternis, mesopleurorum limbo superiore et posteriore, metapleurorum maiore parte, pedibus rufis; abdominis dorso medio per longitudinem rufato; mesonoti 3 maculis nigris, quarum prima partem anteriorem lobi medii, ceterae partem posteriorem loborum lateralium obtinent; pedum anteriorum tarsis fuscis, tibiis postice fusco-lineatis; pedum posteriorum unguiculis nigricantibus; alis dilute fuscescentibus; venis nigricantibus; costa, area intercostali, stigmatibus testaceis.

Elongatus; capite et mesonoto nigro-pilosulis; mesopleuris subtilissime cano-pubescentibus; capite pone oculos angustato; clypeo apice emarginato; palpis medio rufescentibus, basi apiceque nigricantibus; antennis nigro-pilosulis, abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio 4^o vix longiore; fronte supraantennali late longitudinaliter impressa; ocellis superioribus in linea oculos tangente sitis; vertice latitudine sua fere longiore; alarum nervo discoidali longius ante cubiti originem sito; cubiti basi fortius arcuata; cellula

tertia cubitali 2^a vix longiore; feminae vagina vix exserta, apicem versus incrassata, apice rotundata et breviter nigro-pilosula. — Long. 9—11 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

2. *Str. aemulus* n. sp. ♂♀ Rufus, nitidus; capite anoque nigris; abdominis 2 seriebus macularum dorsalium nigrificantibus; tarsorum unguiculis fuscis; alis dilute fuscescentibus; venis fuscis; costa, area intercostali, stigmatibus testaceis.

Elongatus; capite et mesonoto nigro-pilosulis; mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos fortius angustato; clypeo subemarginato-truncato; palpis rufis, maxillaribus longis; antennis nigris, basi magis minusve rufatis, fusco-pilosulis, abdomen longitudine superantibus; articulo primo saepius nigro; secundo et tertii basi pallidis; articulo tertio 4^o parum longiore; fronte supraantennali late sed non profunde impressa; vertice quadrato; alarum nervo discoidali minus longe a cubiti origine distante; cubiti basi leniter arcuata; cellula tertia cubitali 2^a longiore; nervo tertio cubitali medio incurvo. — Long. 9—11 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

3. *Str. absonus* n. sp. ♂♀ Rufus, nitidus; capite, mesonoti macula anteriore, abdominis apice inde a segmento 8^o, pedum tibiis — basi excepta — et tarsi nigris.

Parvus, angustus; capite et mesonoto fusco-pilosulis; hoc pone oculos fortiter rotundato-angustato; temporibus brevissimis; clypeo truncato; antennis nigro-pilosulis, abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio 4^o sesqui longiore; fronte supra antennis bis punctiformiter impressa et utrobique scrobiculo maiore determinata; area pentagona deleta; vertice longitudine sua duplo latiore; alis fuscescentibus; venis et stigmatibus fuscis; cubiti basi recta, a nervo discoidali vix remota; cellula tertia cubitali 2^a fere brevior; nervo 1^o cubitali interdum oblitterato; feminae vagina vix exserta. — Long. 6—7 mm.

Patria: Bolivia.

Dem peruanischen *Str. notabilis* sehr ähnlich, aber an der rotgelben Brust, der Bildung der Stirn und dem geraden Cubitus leicht zu unterscheiden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Konow Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: [Neue Tenthredinidae aus Südamerika. 307-316](#)