

Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung *Dila* Fisch.

Gegeben von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Wie ich schon in D. 1899. 204 hervorgehoben habe, ist diese Gattung mit *Coelocnemodes* Bates sehr nahe verwandt, kann aber leicht an den kurzen Enddornen der Schienen von der letzteren erkannt werden.

- A" Die Vorderschenkel mit einfachem zur Spitze des Schenkels gerichtetem Zahne. (Vorderschenkel innen auf der Oberkante allmählig verbreitert; vor der Spitze plötzlich scharf ausgerandet, wodurch die oben angegebene Form des Zahnes bedingt wird.)
- 1" Flügeldecken nur fein oder undeutlich gestreift, alle Streifen oder Punktreihen zur Spitze frei auslaufend, oder in irreguläre Punktur übergehend.
- 2" Bauch des ♂ ohne Grube, aber mit Ausnahme der 2 letzten Segmente quer gerieft, beim ♀ fast glatt.
- 3" Spitze des Vorderschenkelzahnes fast rechteckig, die Ausrandung der Vorderschenkel von der Spitze des Zahnes senkrecht abfallend. — Turkestan, Altai, Songorei. *laevicollis* Gebler.
- 3' Spitze des Vorderschenkelzahnes scharf zugespitzt, indem die Ausrandung dahinter tief im Bogen nach innen zurückgreift. Die Querriefen des Abdomens beim ♂ mehr weniger im Bogen gewunden. In Grösse, Form und Sculptur der *D. angustata* Baudi ganz ähnlich. — Persien. *persiana* n. sp.
- 2' Bauch des ♂ mit einer breiten, länglichen Grube in der Mitte, welche den hinteren Theil des sichtbaren ersten und den ganzen zweiten Bauchring in Anspruch nimmt: nur das erste sichtbare Segment beim ♂ in der Mitte quer gerieft. Zahn der Vorderschenkel wie bei *laevicollis*, normal. — Persien. — *D. dilaticollis* Redtb. in lit.?, *Mniscechi* Allard (1880), *laticollis* Baudi ♀. *angustata* Baudi ♂ (1875).
- 1' Flügeldecken mit je 8 ziemlich starken Streifen, die vor der Spitze paarweise verbunden sind und zur Spitze sodann in 4 Streifen auslaufen; die Naht ist an der Spitze beim ♂ furchig vertieft. Long. 27—33 mm. Turkestan. *16-striata* Kr. i. l.
- A' Die Vorderschenkel mit dornförmigem, fast im rechten Winkel von der Schenkelkante abstehendem Zahne. Die

- Naht der Flügeldecken beim ♂ an oder dicht vor der Spitze furchig längsvertieft.
- 4'' Halsschild normal, nicht herzförmig, fast so lang als breit, an den Seiten gleichmässig gerundet, nach vorne meistens etwas stärker verengt. Schildchen in normaler Lage sichtbar. Flügeldecken langgestreckt, zur Spitze verengt. Die ersten 3 sichtbaren Bauchsegmente beim ♂ flach quer gerieft. Die Naht der Flügeldecken beim ♂ dicht vor der Spitze tief gefurcht.
- 5'' Flügeldecken mit mehr weniger ausgesprochenen Punktstreifen, die inneren 5 deutlicher, die äusseren zahlreicher, undeutlicher und doppelt dichter gedrängt. ♂ und ♀ gleichartig, schwach glänzend. — Transcaspien: Kuljab. *seriata* Reitt.
- 5' Flügeldecken ohne Streifen, nur innen mit angedeuteten Punktstreifen. ♂ stark lackglänzend, ♀ matt; Hintersehnen des ♂ fast gerade. Buchara. — Grosse ♂ sind der *laevicollis* äusserst ähnlich. v? *bucharica* m.
- 4' Halsschild quer, herzförmig, die gerundeten Seiten vor den Hinterwinkeln ausgeschweift; Schildchen in normaler Lage nicht sichtbar. Flügeldecken nur doppelt so lang als zusammen breit, zur Spitze verengt. Nur das erste sichtbare Bauchsegment in der Mitte kurz gerieft. Die Naht der Flügeldecken an der Spitze undeutlich kurz gefurcht. — Kurdistan: Mardin. *transversecordata* Reitt.

Papilio Sticheli nov. spec. aut subsp.

Von H. Tetens, Berlin.

Herr Stichel in Berlin, der in jüngster Zeit so manche gute Beobachtung gemacht hat und durch dessen Hände ein reichhaltiges Insecten-Material geht, hatte kürzlich Gelegenheit, aus einer Collection von Malacca-Schmetterlingen einen neuen *Papilio* der *Hewitsoni*-Gruppe in seinen Besitz zu bringen und als solchen zu erkennen. Der Fall hatte für mich besonderes Interesse, weil ich mich gerade eingehend mit dem Studium der Euploeen-Nachahmer beschäftige und überliess es mir der Besitzer, den Falter, den ich nach seinem Namen benenne, zu beschreiben.

Selbst wenn es sich später erweisen sollte, dass dieser *Papilio*, der allerdings nur in einem Exemplare vorliegt,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Dila Fisch. 295-296](#)