

teris glabris, crebre fortiter punctatis, genis plus minusve nigricantibus. Long. 13.5 mm.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Gattung und Art wird in den Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien erfolgen.

E. Reitter.

Literarische Revue.

Jac. Spangberg, Species Gyponae generis Homopterorum. Bihang till k. Svenska Vet. Akad. Handlingar Band 5 Nr. 3. Stockholm 1878. 76 S. 80.

Das Genus Gypona wurde 1821 von Germar von dem Genus Cercopsis abgetrennt und enthielt bisher 52 Species, von denen Fabricius 6, Say 1, Burmeister 7, Fitch 1, Stal 36, Uhler 1 beschrieben haben. Der Verfasser fügt in der vorliegenden Abhandlung 55 neue Arten hinzu, die sämtlich Amerika zum Vaterland haben (1 aus Tahiti?).

Tauschverkehr und Kaufgesuche.

Allgemeiner Tauschverein für Käfer und Schmetterlinge Europas.

Denjenigen Herren Entomologen, welche dem allgemeinen Tauschverein beitreten wollen, werden auf franco Anfragen die projectirten Statuten des Vereins vom Unterzeichneten franco zugesandt.

Dessau, im Februar 1879.

G. Melchert.

-
1. Sammlern deutscher Käfer biete ich im Tausche an:
Necrophilus subterraneus Dahl
aus hiesiger Gegend. Exemplare tadellos, ungenadelt.
 2. Suche mit einem Sammler in Wien oder Umgebung in Tauschverbindung zu treten. Gesucht: die gewöhnlicheren Käfer Niederösterreichs.
 3. Wo und unter welchen Bedingungen kann man eine kleine Partie australischer Coleopteren bestimmen lassen?
Rud. Oberndorfer, Günzburg a/D.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literarische Revue. 83](#)