

*Klugia* (vergeben von Robineau-Desvoidy 1863); schlage *Tuttiolia* m. vor.

*Kollaria* (vergeben von Pictet); nenne sie *Superflua* m.

*Erschoffia* (vergeben von Swinhoe 1900); möge *Pseudothecla* m. heißen.


*Felderia* (ist wiederholt vergeben; Priorität hat Walsingham 1887); nenne sie *Thecliolia* m.

Bethune-Baker hat in: *New Heterocera from British New Guinea* (Novit. Zool. 15. p. 175—243) eine neue Lepidoptere ngattung *Megaloptera* aufgestellt. Da aber dieser Name seit 1803 bei den Neuropteren vergeben ist, schlage ich vor, Bethune-Bakers Gattung *Megalopteroidea* zu nennen.


### Illustrierte Gattungs-Tabellen der Käfer Deutschlands

Von Apotheker P. Kuhnt, Friedenau-Berlin.


6. Hsch. mit tiefer Mittelfurche. Flgd. mit Längsrippen (Fig. 9). Fühler (Fig. 9 a). *Colydium* Fab.  
 — Hsch. mit 2 vorn einander genäherten Streifen. Flgd. nur mit Punktreihen (Fig. 10). Fühler (Fig. 10 a). . . . . *Aulonium* Er.



7. Augen fehlen (Fig. 11 a). Körper oval, glatt und stark punktiert (Fig. 11). Fühler (11 b), Unterkiefer (11 c). . . . . *Aglenus* Er.  
 — Augen vorhanden (Ditomini) (Fig. 15, 16). . . . . 8  
 8. Hsch. und Flgd. mit höckerigen, zahnartigen Erhabenheiten (Fig. 12). Kiefertaster (Fig. 13). *Endophloeus* Er.  
 — Hsch. und Flgd. ohne Zähne (Fig. 15—18). . . . . 9




9. Fühler 11gliedrig mit 2gliedr. Keule (Fig. 16 a, 15 a). . . . . 10  
 — Fühler 10gliedr. mit nur 1 Endknopf (Fig. 18 a, 14). 11  
 10. Hsch. oben mit 4 Längskielen, Seiten scharf gerandet, Vorderrand gerade. Körper gestreckt (Fig. 15). Fühler (Fig. 15 a). . . . . *Ditoma* Herbst.  
 — Hsch. ohne Längskiele, Seiten flach abgesetzt, Vorderecken stark vorspringend. Fühler 2gl. Keule (Fig. 16 a). Körper oval (Fig. 16). *Colobius* Latr.



11. Flgd. mit gelber Bindenzeichnung und Flecken, pubescent (Fig. 17). Fühler (Fig. 14).

*Cicones* Curt.

- Flgd. ohne Bindenzeichnung (Fig. 18). Fühler (Fig. 18 a). . . . . *Synchita* Hellw.




12. Fühler dick, kurz behaart, 11gliedrig, vom 3. Gliede an stark quer, ohne abgesetzte Keule. Oberseite mit Höcker (Fig. 19). Kein Deutscher. *Corticus* Latr.  
 — Fühler mit 1—4gliedr. Keule und einfachen Haaren (Fig. 23 a). . . . . 13

13. Erstes Tarsenglied sehr klein (Fig. 21). Hsch. mit dornig vorspringenden Vorderecken (Fig. 20).

*Apistus* Motsch.

- Erstes Tarsenglied mindestens so lang als das zweite Glied (Fig. 24). Vorderecken des Hsch. nicht dornig vorspringend (Fig. 22). . . . . 14




14. Hinterleibsspitze von den Flgd. unbedeckt (Fig. 22). Fühler mit 4 verdickten Endgliedern. Seitenrand d. Hsch. glatt. Flgd. ungestreift.

*Myrmecoxenus* Chevri.

- Hinterleibsspitze bedeckt (Fig. 23, 25, 27). . . . . 15

15. Schienen mit zahnartiger Spitzenecke (Fig. 24). Körper unbehaart (Fig. 23). Fühler 11gliedrig (Fig. 23 a). . . . . *Pynomerus* Er.  
 — Schienen mit einfacher Spitze, Körper behaart. 16



16. Der umgeschlagene Rand der Hsch.-Seiten vorn zur Aufnahme der Fühlerkeule ausgehöhlt. Hsch. länger als breit, mit 3 Längsrippen (Fig. 25).



*Langelandia* Aube.

— Hsch. ohne Fühlergruben. Seiten fein gezähnt (Fig. 26, 27). . . . . 17

17. Hsch. fast viereckig, hinten gerundet (Fig. 27). Flgd. einfarbig braun. Fühler (Fig. 27a).



*Diodesma* Latr.

— Hsch. herzförmig, quer, vor den Hinterecken ausgebuchtet (Fig. 26). Flgd. mit gelber Zeichnung (Fig. 26). . . . . *Coxelus* Latr.



18. Augen fehlen (Fig. 28). Tarsen 3gliedrig, Schienen gegen die Spitze erweitert (Fig. 28a). Fühler (Fig. 28b). . . . . *Anommatus* Wes.

— Augen vorhanden (Fig. 31, 35, 37). Tarsen 4gliedrig (Fig. 39). . . . . 19







19. Vorderhüften schmal getrennt, desgl. die Hinterhüften mässig weit (Fig. 6). . . . . 20

— Vorder- und Hinterhüften weit getrennt (Fig. 4). . . . . 21

20. Körper fein punktiert, kahl (Fig. 29). Fühler mit 2gliedr. Keule (Fig. 30). Fuss (30a). Kopf (30b).



*Teredus* Shuck.

— Körper grob punktiert, abgehend behaart (Fig. 31). Fühler nur einen Endknopf (Fig. 32). *Oxytaemus* Er.






21. Vorletztes Tasterglied stark verdickt, sehr gross, letztes sehr klein (Fig. 33). Fühler mit 2gliedr. Keule, deren 2 Glieder verwachsen sind (Fig. 36). Hsch. fast viereckig (Fig. 35). . . . . *Cerylon* Latr.

— Letztes Tasterglied gross, vorletztes fast gleich dick (Fig. 34). Fühlerkeule aus 2 getrennten Gliedern bestehend (Fig. 38). Hsch. herzförmig (Fig. 37). Schiene mit Tarsen (Fig. 39). . . . . *Bothrioderes* Er.



XXXIX. Familie. Endomychidae.

Kleine Käfer mit vorgestreckten, 11gliedr. Fühlern (selten 8—10gliedr.) mit vergrösserten Endgliedern (Fig. 11b, 15, 16, 23). Vordere Hüfthöhlen hinten offen (Fig. 3). Vorderhüften kugelig oder quer (Fig. 3), Hinterhüften quer, breit getrennt (Fig. 2). Die Tarsen 4gliedr., mit meist kleinem, im zweiten versteckten dritten Gliede (cryptotetramer), ausnahmsweise nur 3gliedrig (Fig. 4, 4a, 5). Abdomen mit 5 freien Segmenten, deren erstes verlängert, zwischen den Hinterhüften einen breiten Intercoxalfortsatz bildet (Fig. 2). Es sind Pilzfresser. Larve von *Lycoperdina bovistae* Fabr. (Fig. 1).






1. Tarsen 4gliedr. mit sehr kleinem dritten Gliede, das mit dem Endgliede eng verbunden ist und in der ausgehöhlten Oberseite des zweiten Gliedes steckt (cryptotetramer) (*Endomychinae*) (Fig. 4), Seitenansicht (4a). . . . . 6

— Tarsen 4gliedr. mit freiem dritten Gliede oder dreigliedrig (Fig. 5, 12, 13). Fühler 11gliedr., selten 8—10gliedr. (Fig. 11b, 15, 16). . . . . 2

2. Sehr kleine (1—1,7 mm), halbkugelige (Fig. 6) Käferchen. Fühler 10gliedr. Das Metasternum (M) geht bis zum Seitenrand des Körpers, da die Episternen (E) der Hinterbrust nach vorn zugespitzt (Fig. 9) sind (*Sphaerosominae*). Unterlippe (Fig. 7). *Sphaerosoma* Leach.

(Alexia Steph.)

— Das Metasternum (M) durch die vorn am breitesten Episternen (E) der Hinterbrust vom Seitenrande getrennt (*Mycetaeinae*) (Fig. 8). Fühler 11gliedrig. Hsch. meist mit je einer Längsfurche (Fig. 10, 11). 3



(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Kuhnt Paul

Artikel/Article: [Illustrierte Gattungs-Tabellen der Käfer Deutschlands 162-163](#)