



Entomologische Rundschau

mit Beilage: Insektenbörse.

Herausgegeben von **Paul Kuhn**t, Friedenau-Berlin.

28. Jahrgang.

No. 3.

Mittwoch, 1. Februar 1911.

Alle die Redaktion betreffenden Manuskripte und Zuschriften sind ausschliesslich an Herrn **Paul Kuhn**t, Friedenau-Berlin, Handjerystrasse 14. zu richten

In allen geschäftlichen Angelegenheiten wolle man sich an die Expedition der Entomologischen Rundschau: Stuttgart, Poststrasse 7. wenden. Fernsprecher 5257.

Die Entomologische Rundschau erscheint als Hauptblatt am 1. und 15. jedes Monats, die Beilage Insektenbörse wird wöchentlich ausgegeben. Alle Postanstalten und Buchhandlungen nehmen Bestellungen zum Preise von M. 1.35. pro Vierteljahr an. Postzeitungsliste No. 3866. Bei Zusendung unter Kreuzband direkt vom Verlag nach dem Ausland wird ein Portozuschlag von 15 ¢ pro Vierteljahr erhoben.

Illustrierte Gattungs-Tabellen der Käfer Deutschlands.

Von Apotheker **P. Kuhn**t, Friedenau-Berlin.

XL. Familie. Coccinellidae.


Kleinere Käfer mit meist 11gliedr., seltener 8- bis 10gliedr. Fühlern (Fig. 8, 9, 23), die eine 3- od. mehrgliedr. Keule besitzen. Die Fühler sind in Fühlerfurchen der Kopfunterseite einlegbar. Die Beine sind einziehbar. Vorderhüften quer, schräg gestellt; die breit getrennten Hinterhüften quer, hinten bogenförmig gerandet (Fig. 21 a, 30, 31). Die Schenkel innen zur Aufnahme der Schienen mit einer Längsfurche (Fig. 1 a). Die Schienen aussen an der Spitze mit Furche zur Aufnahme der Tarsalwurzel. Tarsen 4gliedr., cryptotetramer, mit kleinem (1*) im zweiten verstecktem dritten Gliede, nur selten ganz 4gliedrig (Fig. 1, 1 a, 1 b). Klauen meist gezähnt (Fig. 7 a, 7 b, 27). Abdomen mit 5-6 freien Segmenten, das erste gross, meist jederseits mit einer Schenkellinie (Fig. 21 a, 35). Die Gestalt ist rund od. eiförmig, unten flach, oben stark gewölbt. Sie erscheinen mehrmals

im Jahre. Ihre Larven sind arge Feinde der Blattläuse. Larve von *Coccinella bipunctata* L. (Fig. 2). *Novius cruentatus* (Fig. 3). Bein desselben (Fig. 3 b) und Nymphe mit Larvenhaut (Fig. 3 a).

1. Das 2. Tarsenglied nicht über die Wurzel des Endgliedes verlängert (Fig. 1 a). Mandibeln mit Basiszahn (Fig. 3) Fig. 4. 1 Art aus Süddeutschland, Oesterreich.


Lithophilus Fröhl.

2. Tarsenglied ist weit über die Wurzel des Endgliedes verlängert und nimmt das kleine 3. Glied in der ausgehöhlten Oberseite auf (Fig. 1). 2



2. Oberkiefer mit mehrzahniger Spitze (3-4 Zähne), ohne Basiszahn (Fig. 6 b). (Pflanzenfresser; Epilachninae). Fühler 11gliedrig (Fig. 8). 3
- Oberkiefer mit Basalzahn und gespaltener od. einfacher Spitze (Fig. 6 a). (Blattlausfresser; Coccinellinae). Fühler 8-11gliedrig (Fig. 9). 5

(Fortsetzung folgt.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Kuhnt Paul

Artikel/Article: [Illustrierte Gattungs=Tabellen der Käfer Deutschlands. 17](#)