


90. *Eucosmia certata* Hb. häufig überall.
 91. *Lygris reticulata* F. selten südl. Talseite.
 92. *Larentia dotata* L. Altdorf, Erkertshofen.
 93. *Larentia fulvata* Forst. Raupe auf Gartenrosen.
 94. *Larentia juniperata* L. Gemein Sept., Okt.
 95. *Larentia truncata* Hufn. selten, Raupe auf *Rubus idaeus* L.
 96. *Larentia suffamata* Hb. In feuchten Wäldern überall recht häufig.
 97. *Larentia ferrugata* Cl. Ueberall häufig.
 98. *Larentia olivata* Bkh., häufig südl. Talseite.
 99. *Larentia frustrata* Fr. Juli, sehr häufig.
 100. *Larentia rigata*; Juli an Waldrändern, Raupe auf *Rhamnus catartica* L.
 101. *Larentia rivata* Hb. Juli in Schluchten der südlichen Talseite.
 102. *Larentia lugubrata* Stdgr. Ueberall in Wäldern südl. Talseite.
 103. *Larentia molluginata* Hb. selten 1 Stück Juni 1909.
 104. *Larentia affinitata* Steph. 1 Stück selten.
 105. *Larentia alchemillata* L. häufig August-September.
 106. *Larentia bifasciata* Hw. in Wäldern südl. Talseite.
 107. *Larentia testacea* Don. Herbst 1910 als Raupe zahlreich gefunden, Hirnstetten.
 108. *Larentia sordidata* F. sehr häufig überall.
 109. *Larentia silacea* Hb. häufig Ablassmühle, Erlingshofen.
 110. *Larentia capitata* H. S. 1 Stück 1908.
 111. *Larentia corylata* Thnbg. häufig Raupe auf Weissdorn und Birke.
 112. *Larentia badiata* Hb. häufig Morsbacher Tal.
 113. *Larentia barbarata* Schiff. gemein in 2 Gen.
 114. *Larentia nigrofasciaria* Goeze; häufig in Gärten.
 115. *Asthenia candidata* Hb. Burgruine bei Altdorf, Brunnenberg, nicht selten.
 116. *Tephroclystia venosata* F. Eichstädt.
 117. *Tephroclystia absynthiata* Cl. häufig als Raupe auf *Sol. virgaurea* L.
 118. *Tephroclystia actacata* Walderd. sehr häufig.
 119. *Tephroclystia virgaureata* Dbld. sehr häufig.
 120. *Tephroclystia succenturiata* L. nicht selten.
 121. *Tephroclystia scabiosata* Bkh. nicht selten.
 122. *Tephroclystia innotata* Hufn. Emsing, Eichstädt.
 123. *Tephroclystia exigua* Hb. häufig.
 124. *Tephroclystia lanceata* Hb. überall häufig.
 125. *Tephroclystia sobrinata* Hb. gemein.
 126. *Phibalapteryx polygrammata* Bkh. selten, Meierfeld, Euerwang.
 127. *Phibalapteryx tersata* Hb. Linden, Altdorf, Kesselberg, nicht selten.
 128. *Epirranthis diversata* Schiff. Waldungen um Herlingshardt und Erkertshofen.
 129. *Bapta bimaculata* F. selten, Raupe auf Birke.
 130. *Numeria pulveraria* L. nicht selten.

131. *Ennomos fuscantaria* Hw. Herlingshardt, Wachenzeller Talgrund.
 132. *Therapis evonymaria* Schiff. südliche Abhänge, ziemlich selten.
 133. *Crocallis elinguararia* L. Raupe auf *Rosa canina* nicht selten.
 135. *Biston pomonaria* Hb. Raupe auf Linden, Emsing.
 136. *Boarmia angularia* Thnbg. 1 Stück Pfarrgarten.
 137. *Boarmia jubata (glabraria)* Thnbg. Brunnenberg, nicht selten August.
 138. *Gnophos furevata* Schiff. Wachenzeller Talgrund.
 139. *Gnophos obscuraria* Hb. Nur beobachtet.
 140. *Gnophos dilucidaria* Hb. Emsing, Altdorf.
 (Fortsetzung folgt.)

Eine neue ostafrikanische Fulgoride.

Von Embrik Strand (Berlin, K. Zoolog. Museum)
 (Mit 1 Figur.)

Im Anschluss an die von mir früher in dieser Zeitschrift*) publizierte Abbildungen und Beschreibungen ostafrikanischer Rhynchoten gebe ich hiemit eine Figur von einer *Malfeytia*, die neu sein dürfte; Herr Edm. Schmidt, dem ich dies Bild zur Begutachtung sandte, erklärte, die Art sei ihm unbekannt und dieselbe Antwort bekam ich von Herrn Prof. Dr. A. Jacobi, dem ich es ebenfalls zugesandt hatte; später teilte mir Herr Prof. Jacobi freundlichst mit,



er habe die Art unter Vorräten ostafrikanischer Fulgoriden, die er aus dem Berliner Museum zur Bearbeitung hat, wiedergefunden und mit Sicherheit als neue Art erkannt; hier im Museum war das Exemplar, das als Vorlage für diese Figur gedient hatte, nämlich z. Zt. nicht zu finden und die genaue Lokalität daher auch unbekannt. — Ueber die Art, die ich *Malfeytia Jacobii* m. nenne, wird voraussichtlich Herr Prof. Jacobi demnächst Näheres mitteilen.

Das Cliché auch zu dieser Abbildung verdanke ich Herrn Prof. Dr. F. Karsch.

*) Strand: Neue und wenig bekannte ostafrikanische Heteroptera. Mit 7 Figuren. In: Ent. Rundschau 27. (1910), p. 151 sq.

Strand: Neue und wenig bekannte afrikanische Homoptera. Mit 8 Figuren. Ebenda p. 158 sq.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Eine neue ostafrikanische Fulgoride. 86](#)