

Stirkecke wenig kürzer als der Scheitel. Procoxite als die Strahladten, vor denen sie stehen. Vomer und sie breit abgerundet und etwas nach außen gebogen. Sehr stark behaart. Vorderende mit sehr dichten und kräftigen Borsten besetzt. In der hinteren Hälfte stoßen die Stirnkegel mit den Innenkanten zusammen, die äußeren Halften auseinanderweichend.

Pronotum sehr kurz, nur als ganz schmaler Streifen zwischen dem Hinterrand des Kopfes und dem Dorsulum sichtbar, schmaler als der Kopf mit den Augen zusammengenommen.




Fig. 1. *Euryconus enderleini* n. sp. Vorderrflügel.

Dorsulum so lang wie breit, sehr groß und kugelig gewölbt. Vorderrand in der Mitte gerade abgestützt, Hinterrand halbkreisförmig gebogen mit den seitlichen Teilen des Vorderrandes in der Mitte der Seiten zusammenlaufend.

Mesonotum, hinterer Teil so lang wie das Dorsulum und erheblich breiter als dieses, stark gewölbt.

Scutellum klein, kugelig, sehr tief liegend.

Vorderflügel: I. Stammstück $1\frac{1}{2}$ mal so lang als der Stamm des Cubitus. Unterer Zweig des Cubitus so lang wie der Stamm, gegabelt. I. Zinke so lang wie der untere Zweig, schwach gebogen. II. Zinke doppelt so lang als die I. Zinke, rechtwinklig gebogen. Randzelle viereckig. Oberer Zweig des Cubitus doppelt so lang als der Stamm des Cubitus, gegabelt, im letzten Drittel schwach gebogen. III. Zinke so lang wie der obere Zweig, fast gerade. IV. Zinke wenig länger als die III. doppelt gekrümmt. Randzelle dreieckig.



Fig. 2. *Euryconus enderleini* n. sp. Hinterflügel.

Stamm der Subcosta so lang wie das I. Stammstück. Subcosta rechtwinklig geknickt. Stigma fehlt. Radialflügel gestreckt, vor der Flügelspitze einmündend. Costalader doppelt. Sämtliche Adern stark lebhaft hervortretend, beiderseits mit einer braunen unterbrochenen Linie eingefabt.

Die gesamte Oberfläche mit brauner Fleckenzeichnung.

Tibien des Hinterbeines am Grunde mit einem kurzen hellen Zahn, am Ende mit 2 großen und drei kleineren schwarzen Zähnen.

Erstes Tarsalglied am Ende mit zwei gleich großen gebogenen sehr kräftigen schwarzen Zähnen, zwischen denen das Krallenglied steht.

Hab. Neu Guinea, Sorong. L.M. D'Albertis, I.

Diese hübsche neue Art benenne ich zu Ehren des ausgezeichneten Entomologen Herrn Dr. G. Enderlein in Stettin.

Eine neue Symphalide des Kgl. Naturalienkabinetts Stuttgart.

Von H. Fruhstorfer.

Neptis rikasi batuensis subsp. nova.

Am nächsten *N. rikasi* Horsf. von Java — von dieser jedoch zu trennen durch rundlicheren Flügel schnitt — markantere und lichter graubraune Binden der Oberseite aller Flügel und intensivere violette Streifen der Unterseite der Hflgl.

Batu-Insel Pulo Tello nahe Nihäs.

Der II. internationale Entomologenkongreß zu Oxford.

3. — 10. August 1912.

(Fortsetzung.)

In der Abteilung für Systematik und Verbreitung eröffnet Kolbe (Berlin) die Vorträge durch Mitteilungen über den Wert zoogeographischer Eigentümlichkeiten für die entsprechenden Faunen. Je nach der Zeitperiode, aus der die Elemente der verschiedenen Faunen sich erhalten haben, müssen sie eingeschätzt werden, wenn sie zur Lösung tiergeographischer Probleme herangezogen werden sollen. An Hand einer großen Zahl von Einzel-Mitteilungen gelangt der Vortragende zu einem Resultat, das in der Diskussion auch von andern Entomologen bestätigt wird, die es auf anderem Weg erreichten.

Horn (Berlin) spricht über den Catalogus Coleopterorum von Junk und Schenkling, die auf seine Veranlassung das Unternehmen auf sich genommen hatten. Das schnelle Erscheinen des Katalogs sei wesentlich abhängig von der Finanzlage des Unternehmens. Da nun ein schnelles Erscheinen im Wunsche Aller liege, wendet sich der Redner mit der eindringlichen Bitte an die Anwesenden, in ihren Kreisen auf vielseitige Abnahme der Junk'schen Kataloge hinzuwirken. In der Diskussion empfiehlt Seitz eine Herabsetzung des Preises der Junk'schen Kataloge unter dem Hinweis, daß ein Katalog, der ohne Abbildung zum gleichen Preis und gleicher Zeit erscheint, wie ein umfassendes Werk mit reicher Illustration, doch naturgemäß einen schweren Stand haben müsse. Tags darauf stieg der mit allgemeiner Spannung erwartete Vortrag Ch. Oberthürs (Rennes): „Namen ohne Hinzufügung einer guten Abbildung sollen keinen Wert haben“. Wer die Ankündigung dieses Vorschlags las, mochte kopfschüttelnd sich fragen, wie sich ein so hervorragendes

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Nymphalide des Kgl. Naturalienkabinetts Stuttgart. 118](#)