

Die vertikale Verbreitung der Lepidopteren in der Columbischen Ost-Cordillere.

(Fortsetzung. Vgl. Nr. 8.)

Von A. H. Fassl, Teplitz.

	Westen											Osten			
	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	3000	2500	2000		1500	1000	500
<i>Callitaera aurorina</i> Weym., <i>Hetaera macleaynmania</i> Bull., <i>piera</i> L., <i>Pierella lamia</i> Sulz., <i>hortona</i> Hw., <i>Anfirrhaea philaretes</i> Fld., <i>Euptychia herse</i> Cr., <i>arnaeva</i> F., <i>pe-loria</i> Fld., <i>agaya</i> Bl., <i>Amphidecta pignerator</i> Bl.															
<i>Tisiphone maculata</i> Hopff., <i>hercyna</i> Hbn., <i>Oressinoma typhla</i> D. H., <i>Amphidecta callioma</i> Fld.															
<i>Euptychia westwoodii</i> Bl., <i>languida</i> Bl., <i>torva</i> Weym.															
<i>Lymanopoda albocincta</i> Hw., <i>larunda</i> Hopff., <i>leana</i> Hw.															
<i>Lymanop. labda</i> Hw.															
<i>Lymanop. samius</i> Fld., <i>apiculata</i> Fld., <i>levana</i> Godm., <i>jonius</i> Westw., <i>Idioneura erebioides</i> Fld., <i>Steroma pronophila</i> Fld.															
<i>Pedaliodes manis</i> Fld.															
<i>Pedal. poesia</i> Hw., <i>drymaea</i> Hw., <i>phrasicla</i> Hw., <i>pylas</i> Hw., <i>panyasis</i> Hw.															
<i>Pedal. phacina</i> Stgr., <i>pallantis</i> Hw.															
<i>Pedal. empusa</i> Fld., <i>phoenissa</i> Hw., <i>tomentosa</i> Weym., <i>coeytia</i> Feld., <i>paneis</i> Hw.															
<i>Pedal. ochrotaenia</i> Fld.															
<i>Pedal. fuscata</i> Fld., <i>phitiotis</i> Hw.															
<i>Pedal. nebris</i> Thieme															
<i>Eretris ocellifera</i> Fld., <i>calisto</i> Fld.															
<i>Eretr. oculata</i> Fld.															
<i>Mygona irmina</i> D. H., <i>Pronophila thelebina</i> Stgr.															
<i>Oxeochistus simplex</i> Bl., <i>Catargynnis loxo</i> Dgn., <i>Lastophila sombra</i> Thieme, <i>prosynmia</i> Hw., <i>Daedalma dinias oenotria</i> Weym., <i>Proboscis propylea</i> Thieme															
<i>Pronophila creus</i> Latr.															
<i>Lastophila circe</i> Fld., <i>Daedalma dora</i> Stgr., <i>Polymastus doraete</i> Hw., <i>dorinda</i> Fld.															
<i>Tagyetes mermeria</i> Cr., <i>erubesc.</i> Bl.															
<i>Tagyel. penelea</i> Cr., <i>kerea</i> Bull.															
<i>Tagyel. chrysgone</i> D. H.															
<i>Corades pannonia ploas</i> Thieme, <i>medeba</i> Hw., <i>enyo almo</i> Thieme															
<i>Corad. chelonis</i> Hw., <i>cybele</i> Bl.															
<i>Corad. chirona</i> Hw.															
<i>Corad. cistene dymantis</i> Thieme															
Erycinidae überhaupt:															
<i>Eurybia patrona</i> Weym., <i>Diorhina periander</i> Cr., <i>Zecouia bogota</i> Saund., <i>Methonella chrysomela</i> Bull., <i>Anteros dematria</i> D. H., <i>Mesene margaretha</i> Westw.															
<i>Eurybia donna</i> Fld., <i>Mesosemia telegone</i> Bsd., <i>cecropia</i> Druce, <i>Euselasia enoras</i> Hw., <i>gyda</i> Hw., <i>Lymnas jarbas</i> F., <i>Lyropteryx lyra</i> Saund.															
<i>Eurybia nicaeus</i> F., <i>fassli</i> Seitz, <i>latifasciata</i> Hw., <i>Mesosemia chava</i> Hw., <i>zanao</i> , <i>Euselasia eutyclus</i> Hw., <i>Lyropteryx apollonia</i>															
<i>Chamaelinnas briola</i> Bat., <i>Ancy-luris huascar</i> Saund., <i>jurgensentii</i> Saund., <i>Diorhina licarsis</i> , <i>Itho-meis corena</i> Fld., <i>eulema</i> Hw., <i>Isapis agrytus</i> Cr., <i>Monethe cajetanus</i> Fld., <i>Ethemopsis linearis</i> Godm., <i>Tmetogene dimorah</i> Bat.															
<i>Aneyluris meliboeus</i> F., <i>aulestes</i> Cr., <i>Riodina lysippus</i> L., <i>Amarynthis meneria</i> Cr.															

(Schluß folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Fassel Anton Heinrich

Artikel/Article: [Die vertikale Verbreitung der Lepidopteren in der Columbischen Ost-Cordillere. 44](#)