Beschrieben nach 16 ♂ und 8 ♀ aus der Umgebung von Nikolajev am S.-Bug (Varvarovka, Didova Chata, Ssoljanyje, Ternovka) 12. Mai bis 12. Juni 1923—1934, N. OBRATZTSOV leg. (in coll. m.), die ich als Cotypen anspreche. Eine weitere Serie der neuen Unterart (6 ♂, 4 ♀) stammt aus Odessa 25. Mai 1908, L. SHELJUZHKO leg. (in coll. L. SHELJUZHKO).

Variabilität:

ab. *parvipuncta Trti.* — 1 ♀: Odessa 25. Mai 1908.

ab. *violascens nova* — 4 ♂: Varvarovka 28. Mai, 30. Mai, 6. Juni 1934. Stücke mit violettem Schimmer auf dem größten Teile der Flügeloberfläche. Alle Exemplare aus Odessa haben auch einen violetten Grundton, was ich nur für eine spätere Veränderung der Farbe infolge des langen Aufenthalts in der Sammlung zu erklären geneigt wäre.

ab. *viridescens nova* — 1 ♂, 1 ♀: Varvarovka 18. Mai, 30. Mai 1934. Oberseite grünlich.

Neue Lepidopteren aus Lappland.

Von *Rudolf Rangnow*, Berlin.

Mit Abbildungen.

(Fortsetzung.)

28. *Polyploca flavicornis L.* ***lapponica,*** *nov. subsp.* (Abb. 3, Fig. 28). Zeichnung normal, Färbung ziemlich gleichmäßig zu lichtgrau (im Gegensatz zu *finnmarchica Schöyen*). Das costale Mittelfeld über der etwas grünlichen Makel leicht aufgehellt, ebenso der lichte Fleck am Apex.

29. *Acronicta leporina L. forma* ***musella*** *form. nov.* (Abb. 3, Fig. 29 a) Vorderflügel seidig mausgrau, äußere Saumbinde zusammenhängend schwach sichtbar, mittlerer Costalfleck kräftig, ein schwarzer Basalfleck und 6 Bindenansätze längs Costalrand vorhanden, sonst völlig zeichnungslos. Hinterflügel gefleckt, Leib mausgrau wie die Vorderflügel.

29. *forma* ***grisescens*** *form. nov.* (Abb. 3, Fig. 29 b) Vorderflügel auf weißem Grunde grau gepudert, 3 Bindenansätze am Costalrand, Mittelfleck und Saumpunkte (aller Flügel) kräftig schwarz, sonst außer vier Restpunkte der Außenbinden und Basalstrich zeichnungslos. Leib wie die Vorderflügel gefärbt.

29. *forma* ***minor*** *form. nov.* (Abb. 2, Fig. 29 c). Nur 11 mm spannend, das Tier bräunlich getönt, fast zeichnungslos. Saum aller Flügeln mit braunen Stichen zwischen den Adern, die den Saumrand nicht erreichen, also quer (statt längs wie bei voriger) gerichtet sind.

(Fortsetzung folgt.)

Abb. 3. Erklärung s. Nr. 18, S. 234.

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Rundschau

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 52

Autor(en)/Author(s): Rangnow Rudolf

Artikel/Article: Neue Lepidopteren aus Lappland. (Fortsetzung.) 223-224