

Meinen Mitteilungen habe ich vergrößerte Abbildungen von Eiern, Raupen und Puppen und zwei Falterbilder in natürlicher Größe beigelegt. Ich lasse nun noch besondere Merkmale zu den einzelnen Entwicklungsstadien folgen: Das Ei von *A. emarginata* misst etwa 0,42 mm, ist unregelmäßig oval, regelmäßig sechseckig genetzt und ist hell rötlichbraun. Die Raupe ist hell bis dunkel schmutzigbraun, runzlig, quer gerippt, mit heller, dunkelgesäumter Rückenlinie, vorn verjüngt, Kopf geknöpft. Die Puppe ist licht gelbbraun und hat im frischen Zustande grünliche Flügelscheiden. Der Falter ähnelt zum Teil in Färbung *Timandra amata*, dem Ampferspanner: Grundfarbe ein liches Ocker, mit schwach rötlichem Anflug, dunkle Querlinien, die inneren auf den Unterflügeln fehlend. Ober- und Unterflügel haben — außer den charakteristischen Ausbuchtungen — diffuse Mittelschatten. Letztere sind beim ♂ schwächer, beim ♀ breiter und stärker. Beide Flügelpaare tragen deutliche Distalpunkte und dunkle Saumlinien. Das Weibchen ist etwas kleinflügeliger und kräftiger gestaltet.

## Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina.

Von Fr. Hoffmann, Jaraguá.

(Fortsetzung.)

### *Erycinidae.*

*Libytheinae*

*Libythea carinenta* Cr.

*Erycinini*

*Euselasia zara* Hew. ♀

— *thucydides* F. (Zucht).

ist *eugeon* Hew. nicht das ♀ von *thucydides*?<sup>1)</sup>.

— *leucorrhoea* G. & S.

— *eucerus* Hew. Hiervon auch Zucht<sup>2)</sup>.

— ? *anthe* Godm.

*Eurybia carolina* Godt.

— *pergaea* Hbn.-G.

— *nicaeus-molochina* Stich.

— ? *leucolopha* Thieme

*Mesosemia odice* Godt.

*Diopthalma matatha* Hew.

*Napaea umbra* Bsd.

— *nepos orpheus* Ww.

*Tmetoglene drymo* G. & S.

*Lepricornis melanchroa* Fldr.

— *teras* Stich.

*Panara phereclus barsacus* Ww.

*Panara episatnius* Pritt.

— *thisbe thymele* Stich.

*Riodina lycisca* Hew.

*Lymnas pixe zoëga* Hew.

— *erythrus xeniaades* Stich.

— — *depompata* Stich.

— — *hillapana pronostriga* Stich.

— — *melander opites* Hew.

*Barbicornis melanops* Btlr.

*Syrmatio dorilas* Cr.

*Zeonia licursis* F.

*Diorina arcius huanus* Sndrs.

— *periander* Cr.

*Ancyluris aulestes pandama* Snd.

*Notheme eumeus angellus* Stich.

*Monethe alphonsus* F.

*Mesene pyripphe sanguinolenta* Stich.

— *epalia* Godt.

*Phaenochitonnia bocchoris* Hew.

— *sagaris tyriotes* G. & S.

*Symmachia arion* Fldr. ♂, ♀.

— *menetas pilarius* Stich.

*Caria castalia marsyas* Godm.

(Schluß folgt.)

1) Nein (d. Red.)

2) Diese Zeitschr. Bd. 48, S. 55.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1935-36

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Fritz

Artikel/Article: [Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina. \(Fortsetzung.\) 240](#)