

Kaukasus REITTER l. c.; Armenische Gebirge: REITTER-LEDER; Elbrusgebirge: E. KÖNIG (von diesen beiden Fundplätzen Stücke in meiner Sammlung). — Die Angabe G (= Germania) im Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae (A. WINKLER) Spalte 1030 muß wegfallen.

## Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina.

### *Lycaenidae.*

Von *Fr. Hoffmann*, Jaraguá.

Nachstehend angeführte 64 Arten habe ich meist im Laeißtale, und zwar im März bis April an blühender Mikania gefangen <sup>1)</sup>. Außer einigen wenigen Arten ist es der Fang aus dem Jahre 1934. Die Bestimmung ist derart schwierig, daß ich in früheren Jahren alles unbestimmt ließ. Erst 1935 hatte ich es der Güte des Herrn J. F. ZIKAN zu verdanken, daß meine Ausbeute aus 1934 bestimmt wurde, wofür ich ihm auch an dieser Stelle danke. Ich habe auch einige Arten aus der Raupe gezogen, so: *triquetra*, *latreillei*, *catharina*, *phydela*, *melibaeus hemon*, *janius*. Ich schätze die Artenanzahl im Staate Sta. Catharina auf 110 Arten.

### Theclini.

1. *Thecla imperialis ducalis* Dbl. Nur in dieser Form im April an Mikania im Laeißtal, 7 Stück 1934.
2. *tuneta* Hew. Am 15. März 1935 ein prachtvolles reines Stück am Innenfenster eines Gebäudes in Jaraguá.
3. *latreillei* Hew. Dezember und April. Einige Stücke (♀♀) aus der Raupe gezogen. Jaraguá und Laeiß.
4. *marsyas* L. Im Mai und Juni einzeln in Jaraguá. Manche hatten eine Vorderflügelänge von 34 mm, sind also größer als *damo Drc.* am Bild im Seitzwerk Tafel 147 d. Sie saßen an Gebüschchen. Leider wird im Seitzwerk Bd. 5 S. 748 nicht gesagt, wo *damo* fliegt. Es kann ja schließlich auch diese Art sein.
5. *hamila* Jones. Nicht selten am Laeiß im April. 10 Stück an ZIKAN zum Bestimmen gesandt.
6. *lisus* Stoll. 1 Stück am 4. April 1932 am Laeiß.
7. *hemon* Cr. Im April und Mai in Jaraguá, auch aus der Raupe. Laeiß im April an Mikaniablüten.
8. *iracema* Zikan (sp. n. 1935). 4 Stück im April. Laeiß. Das werden jene Falter sein, die mir Herr SAVARY vor einigen Jahren als *viresco* Dr. bestimmte.
9. *deniva* Haw. Selten im April am Laeiß, jedoch auch in Jaraguá.
10. *triquetra* Hew. April und Juli Raupe an einer Melastoma. Nicht häufig.
11. *polybe* L. März und April, am Laeiß an Mikaniablüten nicht

1) S. Bemerkung im Seitzwerk V S. 743 unten.

- selten. Die Basis der Vorder- und Hinterflügel unten ist rot. Ein schöner Falter, dessen Schönheit man beim Anblicke des Bildes im Seitzwerk Tafel 148 e nicht ahnt.
12. *atys* Cr. Nur 1 ♀ am 10. April 1932 am Laeiß.
  13. *cosa* Hew. Im November in Jaraguá, April am Laeiß 6 Stück.
  14. *silumena* Hew. 4 ♂ 6 ♀♀, im April 1934 am Laeiß.
  15. *didymaon* Cr. 1 ♂ und 19 ♀♀ desgleichen. Daß die ♀♀ vorherrschten, schreibe ich dem Zustande zu, daß die Flugzeit ziemlich zu Ende ging, da die meisten Falter sehr geflogen waren.
  16. *theia* Hew. Nur 1 Stück im April am Laeiß.
  17. *phydela* Hew. August, September, Dezember und Februar häufig, überall. Auch aus der Raupe gezogen.
  18. *melibaeus* F. Die häufigste Art, überall, sitzt meist an Blättern. Auch aus der Raupe.
  19. *azaria* Hew. Am 29. November 1929 in Jaraguá, 1 Stück.
  20. *spurius* Fldr. Laeiß im April einzeln.
  21. *ellida* Hew. Eine häufige Art, Februar—April.
  22. *malina* Hew. Desgleichen 1934 11 Stück an Mikania.
  23. *palegon* Cr. Jaraguá 19. Juni 1930 1 Stück.
  24. *dinus* Hew. 1 ♂ vom April 1934 im Laeißtal. Im Seitzwerk, 5 S. 762 ist nur von 1 ♀ die Rede.
  25. *chloris* Hew. Diese Falter mit der grasgrünen Unterseite sind wohl schwierig zu bestimmen. ZIKAN bestimmte 1 ♀ aus Laeiß. Ich hielt sie für *amyntor* A.
  26. *herodotus* F. Nicht selten vom Februar—April am Laeiß (determ. SCHAUS und ZIKAN).  
*phaleros* L. erhielt ich aus Paraguay.
  27. *longula* Hew. 6 Stück dieser prachtvoll blauen Art im April 1934 am Laeiß.
  28. *acaste* Prittwitz Dezember und April am Laeiß, nicht selten.
  29. *remus* Hew. Februar—April, desgleichen nicht selten.
  30. *janius* Cr. Diesen prächtigen Falter erzog ich aus der Raupe in Jaraguá.
  31. *meton* Cr. In einer abweichenden Form im August und wieder April, Jaraguá und Laeiß. ♂ mit einer gelben Makel im Vorderflügel; Hinterleib unten weiß. Diese Form benannte ZIKAN mit *leucostigma* Zikan. Hier ist der Falter nicht sehr gemein! (s. SEITZ, S. 764).
  32. *aurora* Drc. Selten in Jaraguá. (det. SAVARY).
  33. *thyrea* Hew. 1 ♀ April, Laeiß.
  34. *orgia* Hew. 7 Stück desgleichen. Ich hielt sie für *m-album* Bsd., nach SAVARYS Bestimmung.
  35. *gratiosa* Zikan (sp. n. 1935). 1 ♂ vom April, Laeiß.
  36. *selica* Hew. März—April häufig an Mikania im Laeiß.
  37. *rustan* Stoll 2 Stück im April, Laeiß.
  38. *polama* Schaus, 2 ♂♂, 2 ♀♀ desgleichen. Die als »überall häufig« angegebene Art *jebus* Godt habe ich nicht erbeutet.

(Schluß folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1935-36

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Fritz

Artikel/Article: [Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina. Lycaenidae. 278-279](#)