

Amastus elongata Fldr. Jaraguá im November. Selten. (Det. Dr. REICH, von Dr. SCHAUS mit einem ? versehen.)

Pericopinae.

Pericopis lucifer Btlr. Jaraguá und Laeiß häufig, Juli, Dezember bis Januar, Mai. Am Licht nur ♂♂!

subapicalis Wkr. Desgleichen.

fantasma Btlr. Nur am Laeiß im Januar. Im August ein ♂ e. l. aus einer unbeachteten Raupe. Die Raupen, soweit ich sie kenne (*Pericopinae* im allgemeinen), sind sich einander ähnlich. (Dr. SCHAUS det.) (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Rhodometra sacraria L. ist, einer Privatnachricht zufolge, auf Ösel gefunden worden. Leider wurden die 2 Belegstücke durch die Unachtsamkeit sammelnder Schüler verdorben. Aber nach einer Nachricht des Berichterstatters — Herrn VON REHKAMP, also eines sachkundigen Beobachters — ist an der Richtigkeit der Feststellung nicht zu zweifeln. Für diese spricht auch die sonstige Verbreitung der im wesentlichen afrikanischen Art, die normal auf Südeuropa übergreift, aber auch den Beweis erbracht hat, daß sie auf ungeheure Entfernungen entführt werden kann, wie ihr Vorkommen auf den atlantischen Inseln, vor allem aber auf St. Helena beweist. An der Südküste von Großbritannien ist *sacraria* seit lange bekannt, sein sporadisches Vorkommen bis nach Skandinavien ist von verschiedenen Punkten gemeldet und wie weit er in Westasien nach Norden geht, wissen wir nicht. Daß er auf Ösel ein dauernd geeignetes Biotop für sein Fortbestehen findet, dürfte aber unwahrscheinlich sein. Dabei ist eine Verschleppung durch Verkehrsmittel bei *Rh. sacraria* darum sehr unwahrscheinlich, weil diese Tiere ihre Standorte (dürre Grasstellen an Wegrändern und Stoppelfelder) sehr ungern verlassen und nicht leicht auf Schiffen anfliegen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. 24](#)