

## Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Von *W. Jacobs*, Goslar.

(Schluß.)

### 10. Familie:

*Reichenbachia xanthoptera* Rchenb. — Steinberg, August und September.

*Bythinus validus* Aubé. — Grauhof, im März.

*B. puncticollis* Denny — Gosetal, im Oktober.

### 11. Familie:

*Euthia linearis* Muls. — Steinberg, Dezember (E. JÜNGER leg. et det.).

*Stenichnus exilis* Er. — Juliushütte, im Dezember.

### 13. Familie:

*Catops Dorni* Reitter — Rammelsberg, Mai und Juni.

*Colon appendiculatum* Sahlb. — Steinberg, im Juni.

*Hydnobius multistriatus* Gyll. — Bollrich, im Juli (um 18 Uhr).

*H. punctatus* v. *spinipes* Gyll. — Granetal, im September.

*Liodes calcarata* a. *nigrescens* Fleisch. — Grauhof, im August.

*L. picea* Illig. — Bleiche, im September (um 17 Uhr).

*L. nigrita* Schmitt, Stammform — Bollrich, im September.

*Cyrtusa minuta* Ahr. — Bollrich, im August (um 18 Uhr).

### 17. Familie:

*Millidium minutissimum* Web. — Sudmerberg, Oktober, November (im Dünger).

*Ptilium exaratum* Allib. — Sudmerberg, September bis November (im Dünger).

*Ptiliolium Kunzei* Heer. — Sudmerberg, im Oktober und November (im Dünger).

*Pt. fuscum* Er. — Sudmerberg, im Oktober (im Dünger).

### 19. Familie:

*Scaphosoma boleti* Panz. — Sudmerberg, im Juli.

### 20. Familie:

*Carcinops 14-striata* Steph. — In einem Warenlager, im August.

*Gnathoncus punctulatus* a. *subsuturalis* Rtrr. — Kompost, Mai und Juni.

*Hister 12-striatus* v. *14-striatus* Gyll. — Bleiche, im März.

### 22. Familie:

*Aphodius subterraneus* L. — Steinberg, August und September.

*A. foetens* F. — Sudmerberg, September, Oktober.

*A. foetens* a. *vaccinariarius* Hbst. — Steinberg, September.

*A. tessulatus* Payk. — Sudmerberg, im November.

*A. corvinus* Er. — Grauhof, im Juni.

- A. inquinatus* a. *nubilus* Panz. — Rammelsberg, im Juni.  
*A. sordidus* F. (Stammform). — Bollrich, im Juli.  
*A. Zenkeri* Germ. — Grauhof, September (im Wald gekätschert).  
*Cetonia aurata* a. *piligera* Muls. — Grauhof, im September.

## 23. Familie:

- Hydraena excisa* Kiesw. — Gosetal, im August.  
*Hydrochus carinatus* Germ. — Grauhof, im Juli.  
*Cercyon bifenestratus* Küst. — Grauhof, Oker, im Juni und Juli.  
*C. unipunctatus* a. *impunctatus* Kuw. — Okertal, im Juni.  
*C. convexiusculus* Steph. — Ohlhof, im September.

## 25. Familie:

- Nemosoma elongatum* L. — Steinberg, im Juni (E. JÜNGER leg. et det.).

## 26. Familie:

- Heterhelus solani* Heer. — Herzberg, im Juli und August.  
*Meligethes symphyti* Heer. — Grauhof, im Juli.  
*M. lugubris* Strm. — Grauhof, im Juli.  
*M. bidentatus* Bris. — Grauhof, im Mai.  
*M. gaganinus* Er. — Grauhof, im September.  
*M. coracinus* a. *decoloratus* Foerster. — Grauhof, im Juni.  
*Amphotis marginata* F. — Stadtwall, im Juni bei *Lasius fuliginosus*.  
*Soronia punctatissima* Illig. — Nonnenberg, August und September.  
*Epuraea limbata* Oliv. — Gosetal, im August und September.  
*E. boreella* Zett. — Gosetal, im Juli.  
*E. angustula* Strm. — Steinberg, im Januar und Dezember.  
 (*E. deleta* E. ist noch nicht gefunden worden.)  
*Nitidula carnaria* Schall. — Rammelsberg, im Mai und Juni.  
*Thalycra fervida* Oliv. — Stadtwall, im Juni unter Eichenrinde.  
*Cryptarcha imperialis* F. — Stadtwall, im Juli an Eichenrinde.  
*Rhizophagus parvulus* Payk. — Bleiche, im Dezember unter Pappelrinde.

## 27. Familie:

- Psammoecus bipunctatus* a. *Boudieri* Luc. — Ohlhof, im Sept.  
*Monotoma brevicollis* Aubé. — Sudmerberg, im November.

## 28. Familie:

- Telmatophilus typhae* Fallén. — Ententeich, im Juli.  
*Atomaria Zetterstedti* Zett. — Bollrich, im September.  
*A. fuscipes* a. *dichroa* Rtt. — Sudmerberg, im Juli.  
*A. analis* a. *pallidipennis* Holdh. — Grauhof, im Juni.  
*A. fimetarii* Hbst. — Grauhof, im September (E. JÜNGER leg. et det.).  
*Ephistemus globulus* a. *dimidiatus* Strm. — Rammelsberg, im Mai und Juni.

## 29. Familie:

*Tritoma bipustulata* F. (Stammform). — Grauhof, im Juni.  
*Combocerus glaber* Schall. — Sudmerberg, im März.

## 31. Familie:

*Lathridius constrictus* Gyll. — Steinberg, im Juli.  
*Corticaria ferruginea* Marsh. — Rammelsberg, Juli und August.  
*C. linearis* a. *obscuripes* Rttv. — Rammelsberg, im Juni.  
*Corticarina similata* Gyll. — Grauhof, im November.

## 35. Familie:

*Cis castaneus* Mell. — Rammelsberg, im Juni.  
*C. festivus* Gyll. — Grauhof, im Juni.  
*C. Lucasi* Rttv. — Gosetal, im Juni (HÄNEL det.).  
*Rhopalodontus fronticornis* Panz. — Grauhof, im Februar.  
*Ennearthron cornutum* Gyll. — Grauhof, im Februar.

## 36. Familie:

*Myrmecoxenus vaporariorum* Guer. — Sudmerberg, September,  
 Oktober.

## 37. Familie:

*Endomychus coccineus* L. — Grauhof, im Juni.

## 38. Familie:

*Coccinella 10-punctata* a. *pellucida* Weise. — Sudmerberg, im  
 August.  
*C. bipunctata* a. *Simoni* Weise. — Rammelsberg, im Juli.

## 39. Familie:

*Trogoderma nigrum* Hbst. — Stadtwall, im Juli bei *Lasius fuli-*  
*ginosus*.

## 41. Familie:

*Limnichus pygmaeus* Strm. — Grauhof, im Mai und Juni.  
*Syncalypta paleata* Er. — Oker, im April.

## 45. Familie:

*Agrilus viridis* a. *linearis* F. — Grauhof, im Mai.  
*Trachys troglodytes* Gyll. — Sudmerberg, im Mai (E. JÜNGER  
 leg. et det.).

## 46. Familie:

*Drapetes biguttatus* Pill. — Sudmerberg, im Juli.

## 49. Familie:

*Adrastus rachifer* a. *Reitteri* Buyss. — Rammelsberg, im Juli.  
*Pheletes quercinus* a. *Solarii* Buyss. — Grauhof, im Juli.  
*Quasimus minutissimus* Germ. — Steinberg, April und Mai auf  
 Birke.

## 51. Familie:

*Podabrus alpinus* a. *ruficeps* Gabr. — Grauhof, im Juni.  
*Malachius viridis* F. — Sudmerberg, im Mai und Juni.

## 53. Familie:

*Necrobia violacea* L. — Sudmerberg, September, Oktober (unter Strohdünger).  
*N. rufipes* Deg. — Mit dem vorigen.  
*N. ruficollis* F. — Mit dem vorigen.

## 54. Familie:

*Laricobius Erichsoni* a. *niger* Pic. — Steinberg, im Mai.

## 58. Familie:

*Dorcatoma chrysomelina* Strm. — Stadtwall, im Juni (E. JÜNGER leg. et det).

## 59. Familie:

*Ptinus tectus* Boild. — In Blechdosen mit trockenen Wasserflöhen Larven, Puppen und Käfer in Menge.

## 60. Familie:

*Caenocorse depressa* F. — In einem Warenlager, im Juni.  
*Scaphidema metallicum* F. — Sudmerberg, im März und April.  
*Alphitobius piceus* Rtt. — In einem Warenlager im September.

## 62. Familie:

*Phloeotrya rufipes* Gyll. — Rammelsberg, im Juni (E. JÜNGER leg. et det.).

## 63. Familie:

*Mordellistena Neuwaldeggiana* Panz. — Steinberg, Juli und August.  
*Anaspis maculata* Fourcr. — Grauhof, im Juni.

## 64. Familie:

*Metoecus paradoxus* L. — Bleiche, im September gekätschert.

## 66. Familie:

*Meloë violaceus* ♂ mit einfachen Fühlern, entsprechend der f. *simplicicornis* bei *M. proscarabaenus*.

## 67. Familie:

*Notoxus monoceros* L. — Sudmerberg, im Juli und August.

## 70. Familie:

*Lissodema cursor* Gyll. — Grauhof, im August.

## 71. Familie:

*Strangalia revestita* L. — Grauhof, im Mai (unter alter Buche im Grase).  
*Leptidea brevipennis* Muls. — Warenlager, Juli (in altem Weidenkorb).

## 72. Familie:

*Plateumaris consimilis* a. *variabilis* Kunze. — Steinberg, im Juni.

*Cryptocephalus flavipes* F. — Grauhof, im Juli.

*Cr. vittatus* F. — Steinberg, im Juni (E. JÜNGER leg. et det.).

*Cr. vittatus* a. *negligens* Weise. — Grauhof, im Juli.

*Cr. aureolus* a. *coerulescens* Schilsky. — Sudmerberg, im Juli.

*Chrysomela geminata* a. *nigra* Weise. — Grauhof, im Juli.

*Chr. haemoptera* a. *rugosopunctata* Hlbb. — Sudmerberg, im Juli.

*Colaphus Sophiae* Schall. — Steinberg, im Mai (E. JÜNGER leg. et det.).

*Melasoma aenea* a. *haemorrhoidalis* L. — Sudmerberg, im Juni.

*Epitrix atropae* a. *suturata* Hkrtgr. — Granetal, im September.

*Chaetocnema aridula* Gyll. — Bleiche, April, Mai, September bis November.

*Phyllotreta ochripes* Curt. — Grauhof, im Juni (E. JÜNGER leg. et det.).

*Aphthona lutescens* Gyll. — Ohlhof, im Mai und Juni.

*Longitarsus Jacobaeae* Waterh. — Sudmerberg, im Oktober.

*L. atricillus* a. *similis* Weise. — Grauhof, im Juli.

*L. holsaticus* L. — Grauhof, im Juli.

*L. luridus* a. *nigricans* Weise. — Sudmerberg, im Oktober.

## 73. Familie:

*Bruchidius marginalis* F. — Rammelsberg, im Juni.

## 74. Familie:

*Tropideres niveirostris* F. — Rammelsberg, im Mai und Juni.

## 75. Familie:

*Otiorrhynchus porcatus* Hbst. — Gosetal, im April.

*Sitona gressorius* F. — Rabenkopf, im September.

*Tanymecus palliatus* F. — Grauhof, im Mai.

*Alophus triguttatus* F. — Steinberg, im April (E. JÜNGER leg. et det.).

*Liosoma deflexum* Panz. — Gosetal, im Oktober.

*Magdalinus armigera* Geoffr. — Rammelsberg, im Juni.

*Coeliodes trifasciatus* Bach. — Grauhof, im Juli.

*C. rubicundus* a. *melanocephalus* Steph. — Steinberg, im Juli.

*Sirocalus terminatus* Hbst. — Steinberg, im Juli und August.

*Ceuthorrhynchidius Barnevillei* Grem. — Rammelsberg, im August.

*Ceuthorrhynchus puncticollis* Boh. — Gosetal, im Oktober.

*C. asperifoliarum* Gyll. — Bollrich, im August.

*C. rugulosus* a. *chrysanthemi* Hbst. — Rammelsberg, im August.

*Rhinoncus bruchoides* Hbst. (Stammform). — Grauhof, im September.

- Coryssomerus capucinus* Beck. — Ohlhof, im Mai.  
*Balaninus rubidus* Gyll. — Rammelsberg, im September.  
*Anthonomus rufus* Gyll. — Steinberg, im Juni (E. JÜNGER leg. et det.).  
*Bradybatus elongatulus* Boh. — Steinberg, Grauhof, Mai bis August.  
*Smicronyx Jungermanniae* Reich. — Steinberg, im Mai und Juni.  
*Bagous tempestivus* Hbst. — Ohlhof, im Mai.  
*Elleschus scanicus* Payk. — Steinberg, im Mai.  
*Rhynchaenus foliorum* Müll. — Ohlhof, im August.  
*Nanophyes marmoratus* Goeze. — Ohlhof, im September (E. JÜNGER leg. et det.).  
*Apion confluens* Kirby. — Rammelsberg, Juli bis November.  
*A. atomarium* Kirby. — Grauhof, im Oktober.  
*Rhynchites interpunctatus* Steph. — Grauhof, im Mai.

\* \* \*

Die Gesamtzahl der auf dem Gebiet der Stadt Goslar gesammelten Käfer beträgt jetzt 2290 Arten und 549 Nebenformen.

## Zur Kenntnis der australisch-melanesischen Harpalinen.

(Zweiter Beitrag.)

Von Dr. E. Schaubberger, Ried i. I., Oberösterreich.

### *Subtribus Anoplogeni.*

Die Gattung *Anoplogenius* Chd., die bisher unter die *Acupalpi* eingereiht war, ist, wie ich schon anderenorts (Kol. Rundsch. XX, 1934, S. 106) kurz streifte, von *Acupalpus* Latr. und den mit dieser Gattung nächstverwandten Gattungen so sehr verschieden, daß sie aus der Subtribus *Acupalpi* ausgeschieden und als Vertreter einer eigenen Subtribus: *Anoplogeni* bezeichnet werden muß.

Die besonderen Merkmale dieser neuen Subtribus *Anoplogeni* sind folgende:

Die Taster endglieder sind langgestreckt, fast zylindrisch, fast kahl; das vorletzte Lippentasterglied trägt auf der Innenseite zwei lange Borstenhaare, das vorletzte Maxillartasterglied ist lang, so lang oder etwas länger als das Endglied.

Die Glossa ist rundlich, vorne breit, verrundet. Die Paraglossen sind ziemlich lang, länger als die Glossa und kahl.

Das zweite Fühlerglied trägt nur eine Borste, das erste zwei Borsten.

Die Vorderschienen sind ziemlich lang, bis gegen das Ende verbreitert, am Vorderrand nach außen nicht deutlich abgeschrägt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H. \(Schluß.\)  
267-272](#)