

Entomologische Rundschau

mit Societas entomologica.

Verlag: Alfred Kernen, Stuttgart-W, Schloß-Str. 80

Die Entomolog. Rundschau erscheint am 1., 8., 15. und 22. des Monats gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung in derselben.

Mitarbeiter erhalten 30 Sonderdrucke ihrer Beiträge unberechnet

Schriftleitung: Prof. Dr. A. Seitz, Darmstadt, Bismarckstr. 23

Inhalt: Max Draudt, Neue Agrotiden- (= Noctuiden-) Arten und Formen aus den Ausbeuten von Herrn HÖNE, Shanghai - Struve, Ein Beitrag zur Hemipterenfauna der Nordseeinsel Borkum — J. F. Zikán, Neue Nymphaliden-Arten und -Formen aus Brasilien — Ch. Boursin, Beiträge zur Kenntnis der »Agrotidae-Trifinae XX — Edgar Ruediger, MARIA SIBYLLA MERIAN — Georg Belter, Berichtigung zu: »Neues aus der *Melitaea didyma* Esp.-Gruppe.

Neue Agrotiden- (= Noctuiden-) Arten und Formen aus den Ausbeuten von Herrn H. HÖNE, Shanghai.

Von Prof. Max Draudt, Darmstadt.

(Mit Tafel IV.)

(Fortsetzung.)

Acronicta (Hyboma) longatella sp. n. (Taf. IV, Fig. 1 f) Kopf und Thorax mit schwarzen, weißlichen und graubraunen Schuppen und Haaren bedeckt. Palpen gelbweiß, seitlich mit schwarzem Band. Vorderflügel auffallend lang und schmal, auf weißlichem Grund dicht schwarz und grau bestreut mit feinem langem Basalstrahl unter der Mediana; vordere Querlinie sehr undeutlich und verloschen doppelt, schräg auswärts zum Innenrand ziehend. Ringmakel weit nach außen verlagert, etwas weißlicher als der Grund, nur innen von einem schwarzen Bogenstrich begrenzt; die Nierenmakel kaum zu erkennen, unbegrenzt. Die Postmediane liegt dem Saum nahe, ist sehr scharf und stark gezackt, stellenweise undeutlich doppelt, submedian von einem schwarzen Analstrahl durchschnitten, der vor den Fransen etwas nach oben abgesetzt erscheint; hinter der Postmediane stellenweise weißliche Aufhellung, auf der Diskalfalte von bräunlichem Längswisch durchschnitten. Wellenlinie durch einige schwarze Pfeilflecken dargestellt, auf dem Saum mit schwarzen Dreieckspunkten. Fransen weißlichgrau, auf den Adern etwas schwärzlich gemischt. Hinterflügel weiß mit schwärzlichen Saumflecken, die beim ♀ besser entwickelt sind und analwärts an Größe zunehmen. Fransen weiß mit schwärzlicher Teilungslinie. Flügelspannung: 40—43 mm. Likiang (Nord-Yünnan), Mai, Juni.

Acronicta (Hyboma) renirufa sp. n. (Taf. IV, Fig. 1 b). Kopf und Thorax schiefergrau, Palpen seitlich schwarzbraun. Vorderflügel

schiefergrau mit dickem schwarzen Basalstrahl; die sehr undeutliche vordere Querlinie doppelt, der äußere Anteil bildet am Vorderrand vor der Ringmakel einen verloschenen schwarzbräunlichen Vierecksfleck, sie zieht vom Vorderrand schräg auswärts bis fast zur Innenrandsmittle; deutlicher sind nur 2 schwarze Parallelstriche, die vom Basalstrahl nach unten abgehen. Ringmakel etwas viereckig, rotbräunlich gefüllt, fein schwarz umzogen; die Nierenmakel bildet einen rotbraunen, viereckigen Fleck, nur innen und unten schwarz begrenzt; zwischen beiden Makeln erscheint der Zellgrund etwas aufgehellt, die Mediana ist vom äußeren Ringmakelende bis über die Nierenmakel hinaus schwarz. Postmediane stark gezackt, nur am Vorderrand und Innenrand undeutlich doppelt, das Feld dahinter bis zum Saum schwach dunkler, analwinkelwärts, wo auf der Submedianfalte ein starker schwarzer Längsstrahl liegt, etwas dunkler und bräunlicher; eine Wellenlinie nicht sichtbar. Fransen hellgrau, von dunklerer Teilungslinie durchzogen. Hinterflügel hellbraun mit verloschenem Diskalfleck und angedeuteter Postmediane, die beide unterseits deutlicher sind. Fransen bräunlich mit weißlicher Basallinie. Flügelspannung: 32—35 mm. Likiang (Nord-Yünnan), Juli, August; auch vom Hoeng-Shan (Provinz Hunan), schon im Mai.

Acronicta (Hyboma) succedens sp. n. (Taf. IV, Fig. 3 b) gehört in die nächste Nachbarschaft der *renirufa* und sieht ihr recht ähnlich. Kleiner, heller, die Vorderflügel außen etwas mehr erweitert mit schrägerem Saum. Am 2. Palpenglied seitlich ein weißer Ring am Ende. Vorderflügel heller grau, der schwarze Basalstrahl viel dicker, nach außen erweitert. Von der Subbasale und vorderen Querlinie sind nur am Vorderrand sehr schräggerichtete schwärzliche Striche zu sehen; eine Ringmakelandaeutung fehlt ganz; die Nierenmakel ist wie bei voriger ein rotbrauner, nur unten und innen begrenzter Wischfleck, der nach außen bis fast zur Postmediane verschwimmt; diese selbst einfach, innen etwas heller angelegt, diskal von einem sehr kurzen und schwachen, submedian von einem langen starken schwarzen Strahl durchschnitten. Die Linie liegt dem Saum auffallend nahe; Subterminale fehlt. Die weißen Fransen mit schwarzer Teilungslinie und schwarzen Zwischenaderfleckchen. Hinterflügel rauchbräunlich, am Saum schwach dunkler, mit von unten durchscheinendem Diskalfleck. Fransen weißlich mit dunkler Teilungslinie. Unterseits zeigen die Hinterflügel noch eine schwach angedeutete Postmediane. Flügelspannung: 30—32 mm. Zahlreiche Stücke in beiden Geschlechtern von Likiang (Nord-Yünnan), von Ende April bis Mitte Juni.

Acronicta (Hyboma) expurgata sp. n. (Taf. IV, Fig. 3 c) steht in der Nähe von *phaedra* Pgl. Kopf und Thorax grauweiß, schwarz gemischt, Stirn mit schwarzem Querband, Palpen am 2. Glied seitlich mit 2 schwarzen Längsstreifen, Halskragen mit schwarzem Querband kurz vor dem Ende. Hinterleib hellgrau. Vorderflügel grauweiß, schwarz bestreut, subbasal mit 2 schwarzen Vorderrand-

strichen und einem schwärzlichen ovalen Fleck zwischen Submediana und Ader 1, der in den tiefen Bogen der doppelten Antemediane hineingreift, welche fast in der Innenrandsmittle endet. Die undeutliche Ringmakel etwas viereckig, weißlich, die ebenfalls helle Nierenmakel ganz undeutlich, außen nur durch schwärzliche Punktflecke begrenzt; vor und zwischen den Makeln liegt schwärzliche Verdunkelung, die fast die Makeln vortäuscht; hintere Querlinie doppelt, etwas heller ausgefüllt, zwischen 1 und 3 einen tiefen Bogen nach innen beschreibend und auf 1 eine spitze Zacke nach außen bildend, submedian vom dicken, etwas verwaschenen Analstrahl durchschnitten, der den Saum erreicht. Anstatt der Wellenlinie nur ganz schwache, fleckige Aufhellungen. Auf dem Saum und in der hellen Fransenbasis schwarze Zwischenaderpunkte. Hinterflügel grauweißlich, am Saum schmal verdunkelt, mit kleinem Diskalpunkt und Postmediane, die unterseits, wo die Saumverdunkelung fehlt, etwas besser hervortritt. Flügelspannung: 31—32 mm. Wenige Stücke vom Hoeng-Shan (Prov. Hunan), im April 1933.

Acronicta (Hyboma) cavillatrix sp. n. (Taf. IV, Fig. 2 d) ist nahe verwandt mit *albistigma* Hmps. (South. ined.) Kopf und Thorax weiß, braungrau durchsetzt, Palpen mit Ausnahme des Endgliedes seitlich schwarz, Hinterleib gelblichgrau. Vorderflügel weiß, bräunlichgrau bestreut; die Subbasale besteht aus schwarzen Doppelstrichen unterhalb des Vorderrandes und im Submedianraum, die letzteren sind weiß ausgefüllt. Die vordere Querlinie ist doppelt, gewellt, die beiden Anteile ziemlich weit auseinandergerückt; Ringmakel schräg viereckig, weiß, bräunlich gekernt und nur seitlich schwarz umzogen; Nierenmakel in der Mitte eingeschnürt, etwas fleckig schwarz und weiß begrenzt, der Raum zwischen ihr und der Ringmakel braun; die doppelte Postmediane ist gezähnt, doppelt, weiß angefüllt, hinter ihr zwischen 1 und 2 und 4 und 6 fleckig graubraune Verdunkelung. Wellenlinie in dem reinen weißen Saumfeld nur andeutungsweise sichtbar; auf dem Saum schwärzliche Dreiecksfleckchen, Fransen schwach braungrau durchschnitten. Hinterflügel dunkel graubraun mit weißlichem Postmedianband und weißlichen Fransen. Unterseits sind die Hinterflügel weißlich mit dickem Diskalfleck und einem Strichfleck davor am Vorderrand, sowie braungrauer Postmedianlinie, die unter dem Vorderrand etwas nach außen abgesetzt ist. Eine breitflügelige Art mit abgerundetem Apex der Vorderflügel, die sich sofort durch die viel hellere weißliche Färbung und die ganz dunklen Hinterflügel mit hellem Mittelband von der japanischen *albistigma* unterscheiden läßt. Flügelspannung: 43—45 mm. West Tien-Mu-Shan (Prov. Chekiang), aus 1600 m Höhe, im Juli 1932.

Acronicta (Hyboma) regifica sp. n. (Taf. IV, Fig. 2 b) gehört zur *rumicis*-Gruppe. Kopf und Thorax braunschwarz mit blauweißen Schuppenhaaren durchsetzt; Palpen seitlich schwarz, am 1. und 2. Glied unten weiß. Hinterleib bläulich grauweiß. Vorderflügel auf bläulich grauweißem Grund dicht braunschwarz bestreut mit vio-

lettem Schimmer, die Subbasale durch 2 schwarze Schrägstriche am Vorderrand angegeben; unter der Submedianfalte liegt ein feiner schwarzer Basalstrahl, der mit einer bis Ader 1 ausgebreiteten schwarzen Bestäubung zusammen eine ovale Figur bildet, die in einem Bogen der doppelten Antemediane hineingreift. Ring- und Nierenmakel fein schwarz umzogen, erstere rundlich, letztere von einem vom Vorderrand herkommenden Schrägschatten durchzogen; das Feld vor und hinter ihr ist am hellsten bläulichgrau; die hintere Querlinie vom Vorderrand bis Ader 3 einfach, gezackt, von da zum Innenrand doppelt, zwischen Submedianfalte und Ader 3 schwärzlich, unter ersterer abstechend blauweiß ausgefüllt. Die Subterminale wird durch schwarze Winkelstriche dargestellt; auf dem Saum schwarze Fleckchen. Fransen innen schwarz und hell gemischt, außen weiß und schwarz gescheckt. Hinterflügel rein weiß, die Adern in der Saumhälfte und eine feine Linie zwischen 2 und 7 bräunlich. Flügelspannung: 40—42 mm. Likiang (Nord-Yünnan), im Juni 1935. (Fortsetzung folgt.)

Ein Beitrag zur Hemipterenfauna der Nordseeinsel Borkum.

Von Pastor *Struve*, Borkum.

(Schluß.)

41. *Globiceps cruciatus* Reut. (2621), 5 Exemplare im Juli in den Süddünen, im Garten.
42. *Orthotylus flavosparsus* C. Sahlb. (2657), 5 Exemplare im September auf *Atriplex* und *Chenopodium*.
43. *Orthotylus ericetorum* Fall. (2677), 1 Exemplar im September in einer feuchten Delle auf *Calluna*.
44. *Pseudoloxops coccinea* Mey.-D. (2686), 1 Exemplar im Juli in der »grauen« Düne.
45. *Onychumenus decolor* Fall. (2824), 8 Exemplare vom Juni bis August auf dem Platz beim reformierten Friedhof, in der »grauen« Düne, bei Upholm am Deich.
46. *Psallus quercus* Kbm. (3000), 7 Exemplare im Juni im Achilleion auf Eiche.
47. *Psallus falleni* Reut. (3013), 3 Exemplare in der »grauen« Düne von Birke.
48. *Psallus varians* H.-Sch. (3015), 7 Exemplare im Juni, von Esche.
49. *Psallus diminutus* Kbm. (3016), 8 Exemplare im Juni im Achilleion, auf Eiche, aber auch auf dem Platz beim Friedhof, wo nur *Salix* und *Populus canadensis* stehen.
50. *Campylomma verbasci* Mey.-D. (3136), 1 Exemplar im September bei Upholm.
51. *Hydrometra stagnorum* L. (3240), 12 Exemplare im Juni in einem Graben bei »Zur Heide«.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Draudt Max Wilhelm Karl

Artikel/Article: [Neue Agrotiden- \(= Noctuiden-\) Arten und Formen aus den Ausbeuten von Herrn H. HÖNE, Shanghai. \(Fortsetzung.\) 381-384](#)