

83. *Oxytenis modestia* Cr. Jaraguá und Laeß, nicht zu selten am Lichte, auch aus der Raupe, 2. Mai e. l. Flugzeit September bis Dezember, meist jedoch November.
84. — *naemia* Druce. 2 ♂♂, 18. Dezember 1933, Jaraguá. Dasselbst 1933 einen halbseitigen Zwitter (Coll. Tring-Museum).

Melitaea aurinia ab. *Insterburgia* Braun.

Von H. Braun, Insterburg.

In unserem Insterburger Stadtwalde fliegt unter den gewöhnlichen *Mel. aurinia* anbei abgebildete Abart. Statt der gelbbraunen Binde auf der Oberseite der Hinterflügel hat diese eine dunkelschwarzbraune Binde, die schwarzen Flecken darin sind gelbbraun umringt. Sonst gleicht diese Abart der typischen *aurinia*, auch die Unterseite ist nur etwas dunkler und kräftiger gezeichnet.



Melitaea aurinia insterburgia, und typisch.

Soweit ich aus der mir erreichbaren Literatur feststellen kann, ist diese Art noch nicht benannt, da ich sie aber in beiden Geschlechtern besitze und die Zeichnung konstant ist, ich auch trotz aller Variation der *aurinia* keine Übergänge gesehen habe, so benenne ich diese Art »*Melitaea aurinia* ab. ***Insterburgia*, Braun.**«

Sollte aber trotz allem dies Tierchen schon einen Namen haben, so wird meine Benennung hinfällig.

Ich bilde hier in der oberen Reihe ♀ und ♂ dieser Abart ab, ferner, um die Unterschiede klar zu zeigen, ein ♀ und ♂ der typischen *aurinia*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Braun H.

Artikel/Article: [Melitaea aurinia ab. Insterburgia Braun. 556](#)