

langen schmalen Uncus, gedrunghenen Aedoeagus mit ca. 24 Cornuti, schwachen gerundeten Saccus. Sie könnte vorläufig dort belassen werden, wohin sie schon PIERCE gestellt, nämlich hinter dem Genus *Selenia*; es scheint mir indessen richtiger, sie hinter der näher verwandten *Cephis* einzufügen.

Auch *L. convergata* Vill. und *partitaria* Hbn. nebst Verwandten haben den typischen Bau der Ennominae, weichen aber ab durch den an die Gattung *Epione* und *Cephis* erinnernden, sehr tief ausgeschnittenen Saccus. Von letzterer trennt sie die verschiedene Flügelform.

Ganz und gar nicht zu *Lithina* gehören *L. rippertaria* Dup. und die ähnliche noch nicht anatomisch untersuchte *L. tancrearia* Stgr., die beide Valven vom *Semiothisa*-Typus haben, erstere mit starken Oktavals und gewaltigem Ausschnitt des 8. Segmentes, mit mindestens sechs sehr kräftigen Dornen des typischen Uncus (statt mit Zweigehörn) usw., ein anatomisches Bild, das sich in keine der bestehenden Untergattungen der *Semiothisa* einordnen läßt; sie werden deshalb zu letzterer in ein neues Subgenus *Spinuncina* gestellt.

## Die Bärenspinner von Südbrasilien.

### Faunistische Mitteilungen aus meiner Sammlung.

Von Dr. Paul Reich, Tel-Aviv.

(Fortsetzung.)

*Prumala tessellata* Schs.: 1 ♂ von der Serra do Cubotão.

*P. nigripunctata* Reich nov. spec. (vgl. I. E. Z., 29. Jahrg., S. 266):  
1 ♂ von der Serra do Cubotão.

29. *Idalus Wkr. admirabilis* Cr.: Joinville, Jaraguá, Blumenau; ferner Serra do Cubotão.

*I. agastus* Dyar: Joinville (2 ♀♀), 1 ♀ von Sa. Anna, Paraná.

*I. catenatus* Schs.: Joinville, Jaraguá, Blumenau. Serra do Cubotão.

*I. hippia* Stoll: Joinville, Jaraguá, Nova-Teutonia. Das ♀ ist größer; das dunkle Wurzelfeld dehnt sich über die halbe Flügelfläche aus, ist schön mit Rot untermischt und in der Mitte durch eine helle Querbinde von der Grundfarbe durchbrochen. Stücke von Peru und Costa-Rica zeigen wenig Unterschiede.

*I. flavoplaga* Schs.: Joinville.

*I. doncasteri* Rothsch.: Jaraguá, Neu-Bremen, Blumenau.

*I. obliquefasciatus* Reich spec. nov.: 1 ♂ Neu-Bremen (vgl. I. E. Z., 29. Jahrg., S. 267).

30. *Amaxia Wkr. hebe* Schs.: Joinville, Jaraguá, Neu-Bremen, Blumenau, Timbó-Blumenau, Nova-Teutonia. Ferner von der Serra do Cubotão. Alle Stücke fast durchweg scharf gezeichnet, besonders die ♀♀.

*A. consistens* Schs.: Neu-Bremen, Sa. Catharina, Porto União. Weniger scharf und kontrastreich gezeichnet als *hebe*.

*A. apyga* Hmps.: São Paulo, Serra do Cubotão. Stücke von Costa Rica, Venezuela, Amazonas (Uyupiranga-Manáos) weichen kaum ab.

*A. chaon* Druce: Serra do Cubotão. Andere Stücke von Bolivien und Columbien wenig abweichend (nur ♀♀). ♂ Stücke von Französisch-Guayana sind viel kleiner, zierlicher und scharf gezeichnet.

32. *Neonerita* Hmps. *minerva* Schs.: Porto União.

*N. dorsipuncta* Hmps.: Joinville, Neu-Bremen, Blumenau.

35. *Neaxia* Hmps. *ockendeni* Rothsch.: Joinville, Blumenau.

*N. klagesi* Rothsch.: Joinville.

*N. pardalis* Wkr.: Joinville.

*N. theon* Druce: Serra do Cubotão.

37. *Paranerita* Hmps. *irregularis* Rothsch.: Jaraguá.

*P. androconiata* Rotsch.: Rio Grande do Sul.

*P. metapyria* Dgn.: Blumenau, São Paulo.

*P. aurantiipennis* Rothsch.: Serra do Cubotão.

*P. kennedyi* Rothsch.: Neu-Bremen.

*P. basirubra* Reich spec. nov.: Serra do Cubotão. 1 ♂. Vgl. I. E. Z., 29. Jahrg., S. 267.

38. *Neritos* Wkr. *onytes* Cr.: Joinville, Jaraguá, Neu-Bremen. Serra do Cubotão.

*N. repanda* Wkr.: Neu-Bremen, Jaraguá.

*N. metaleuca* Dgn.: Sa. Catharina.

*N. cotes* Drc.: Joinville.

40. *Parevia* Hmps. *vulmonaria* Schs.: Joinville, Neu-Bremen.

41. *Hyponerita* Hmps. *pinon* Drc.: Joinville.

*H. viola* Dgn.: Serra do Cubotão.

*H. rhodocraspis* Hmps.: Joinville, Blumenau, Neu-Bremen, Serra do Cubotão.

43. *Antaxia* Hmps. *collaris* Jones: Blumenau. Ferner Serra do Cubotão und São Paulo. Das ♀ ist größer, hat längliche Vorderflügel. Die Färbung mehr rot. Die Randbinde ist zum Teil in Flecken aufgelöst. Auch das Wurzelfeld ist mehrfach fein durchbrochen.

*A. abdominalis* Herr.-Sch.: Joinville, Jaraguá, Neu-Bremen, Serra do Cubotão. Sieht besonders in der Zeichnung des Mittelfeldes manchen Syntomididen ähnlich.

44. *Eupseudosoma* Grt. *involuta* Sepp.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Serra do Cubotão.

*E. nivea* H.-Sch.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Neu-Bremen. Ferner São Paulo, Alto Paraná.

*E. aberrans* Schs.: Joinville, Porto União, Serra do Cubotão.

*E. grandis* Rothsch.: Blumenau. Stücke von West-Columbien und Paraguay sind noch größer, aber sonst nicht abweichend.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Reich Paul

Artikel/Article: [Die Bärenspinner von Südbrasilien. Faunistische Mitteilungen aus meiner Sammlung. \(Fortsetzung.\) 563-564](#)