

Entomologische Rundschau

mit Societas entomologica.

Verlag: Alfred Kernen, Stuttgart-W, Schloß-Str. 80.

Die Entomolog. Rundschau erscheint am 1., 8., 15. und 22. des Monats gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung in derselben. Mitarbeiter erhalten 30 Sonderdrucke ihrer Beiträge unberechnet

Schriftleitung: Prof. Dr. A. Seitz, Darmstadt, Bismarckstr. 23

Inhalt: H. Zukowsky, Reise ans Schwarze Meer und Herkulesbad (Lep.) — W. Marten, Zur Kenntnis der *Axiidae* — Paul Reich, Die Bärenspinner von Südbrasilien.

Reise ans Schwarze Meer und Herkulesbad (Lep.).

Von H. Zukowsky, Hamburg.

(Schluß.)

- Amorpha populi* L. Bukarest. Noch Ende August.
Celerio euphorbiae L. und ab. *suffusa* Tutt B.
Deilephila nerii L. Einmal. H.
Macroglossum stellatarum L. Überall.
Stilpnobia salicis L. Bukarest und B. Noch Ende August am Licht.
Pygaera curtula L. B.
Lasiocampa trifolii Esp. und
 » » v. *medicaginis* Bkh. H. Häufig am Licht.
Gastropacha quercifolia L. B. Typische Exemplare am Licht; nicht selten.
Odonestis pruni L. H. Anfang September noch ein Exemplar.
Thaumetopoea processionea L. H. Einzeln am Licht.
Drepana cultraria F. H.
Cilix glaucata Scop. H. Typisch.
Dysauxes punctata F. H. Mehrfach am Licht.
Nola chlamitulalis Hbn. B.
 » *cristatula* Hbn. B.
Lithosia unita v. *palleola* Hbn. B. Am Licht.
Spilarctia lubricipeda L. B.
Phragmatobia fuliginosa L. B. Häufig am Licht.
 » *placida* Friv. B. Nur 2 Exemplare am Licht.
Coscinia striata trans. ad *intermedia* Spul. H. Einmal am Licht.
Hepialus sylvinus L. H. Nicht selten in der Dämmerung über Wiesen fliegend.
- Acronicta psi* L. B.
 » *rumicis* ab. *meridionalis* Dann. H.
Oxycesta geographica F. B. Gemein am Licht.

Simyra nervosa F. B. Einige Male.

Agrotis c-nigrum L. B. Am Licht.

» *xanthographa* F. H. Am Licht.

» ab. *dufranei* Lamb. H. Am Licht.

» *corticea* Hbn. B. Am Licht.

» *ypsilon* Rott. B. Am Licht.

» *segetum* Schiff. B. Am Licht.

« *crassa* ab. *lata* Tr. B. Am Licht.

Mamestra oleracea L. B.

» *trifoli* Rott.

» » ab. *farkasii* Tr. B. Nicht selten am Licht.

» » aberr. nova.

» » *marmorosa* Bkh. B. Wenige Stücke am Licht.

Bryophila ravula Hbn. B. Gar nicht selten am Licht.

» » ab. *unicolor* Spul. Desgl.

» *muralis* Forst. B.

Talpophila matura Hufn. H.

Hadena gemina-remissa Tr. B.

Polia chi L. H. Ein auffallend großes Stück am Licht.

Actinotia hyperici Schiff. B. Vereinzelt am Licht.

Polyphaenis subsericata H.-Sch. B. 2 Exemplare am Licht; ist auch bei Warna in Bulgarien gefunden worden.

Mania maura L. H.

Leucania obsoleta Hbn. B. Am Licht.

» *l-album* L. H. Am Licht.

» *vitellina* Hbn. B. Am Licht.

» *straminea* Tr. B. Am Licht.

» *albipuncta* F. B. Am Licht.

Caradrina exigua Hbn. B. Am Licht.

» *quadripunctata* F. B. Am Licht.

» *ambigua* F. B. und H. Am Licht.

» *aspersa* Rmb. B. Am Licht.

» *gluteosa* Tr. B. Am Licht.

Xanthia fulvago F. H. Am Licht.

» *flavago* F. H. Am Licht.

Cucullia umbratica L. B.

» *santonici* Hbn. B. 2 Stücke am Licht.

Eutelia adulatrix Hbn. B.

Heliothis scutosa Schiff. B.

Mycteroplus puniceago Bsd. B. Am Licht.

Tarache urania Friv. B. 1 Stück am Licht.

» *lucida* Hufn. B.

» » ab. *albicollis* F. B. Sehr häufig am Licht.

» » f. *insolatrix* Hbn. B. Nur ein Exemplar dieser prachtvollen Form, die wie eine andere Art anmutet.

» *luctuosa* Esp. H. und B. Häufig.

» » ab. *angustifascia* Warr.

» » ab. *ochracea* Tutt.

- Porphyrinia respersa* Hbn. B.
Calymma communimacula Hbn. 5 Stücke dieser hübschen Art am
 Licht.
Erastria trabealis Sc. B.
Prothymia viridaria Cl. B. Am Licht.
 » » ab. *aenea* Hbn.
 » » ab. *pusea* Tutt.
Plusia gamma L. B. und H.
Ophiusa algira L. H.
Catocala nupta L. H.
Toxocampa viciae Hbn. H.

Hemistola vernaria Hbn. B.
Pseudoterpna simplex Alph. B. Ein Stück der nur aus dem Osten
 (Armenien) bekannten Art.
Euchloris prasinaria Ev. B. und H.
Chlorissa viridata L. H.
 » *pulmentaria* Gn. H.
Orthostixis cribraria Hbn. H. Nicht selten am Licht.
Ptychopoda rufaria Hbn. B.
 » *camparia* H.-Sch. B.
 » *dimidiata* Hufn. H.
 » *obsoletaria* Rmb. B.
 » *rusticata* F. B.
 » *filicata* Hbn. H.
 » *degeneraria* Hbn. H.
Acidalia turbidaria Hbn. B.
 » *submutata* Tr. B.
 » *marginepunctata* Goeze B. und H.
 » *ornata* Sc. B. und H. Sehr häufig.
 » *violata* Thbg. mit v. *decorata* Bkh. B.
 » *subtilata* Chr. H. Nur ein Stück.
 » *rubiginata* Hufn. B. und H. Häufig.
 » » ab. *ochraceata* Stgr.
 » *imitaria* Hbn. B. und H.
Rhodostrophia vibicaria Cl., B. und H.
 » » ab. *strigata* Stgr.
Anaitis plagiata L. H.
Ortholitha moeniata Sc. H.
 » *bipunctaria* Schiff. H.
Lythria purpurata L. B. Gemein.
Larentia olivata Bkh. H.
 » *fluctuata* L. H.
 » *galiata* Hbn. H.
 » *corollaria* H.-Sch. B.
 » *nebulata* Tr. H.
 » *tophaceata* Hbn. H.
 » *riguata* Hbn. B.

- Larentia bilineata* L. H.
 » *comitata* L. H.
Campaea margaritata L. H.
Horisme corticata Tr. H.
 » *vitalbata* Schiff. B. und H.
Eupithecia oblongata Thbg. H.
 » *linariata* L. B.
 » *denticulata* Tr. B. und H.
 » *absinthiata* Cl. B. und H.
 » *albipunctata* Hw. H.
Nychiodes lividaria Hbn. B. Selten.
Gnophos mucidaria Hbn. B.
Synopsia sociaria Hbn. B.
Boarmia umbraria Hbn. H.
Selidosema plumaria Schiff. (= *ericetaria* Vill.) H.
Chiasma glarearia Brahm. B.
Tephrina arenacearia Hbn. gen. aest. *flavidaria* Ev. B.

135 Micros in 55 Arten, die später veröffentlicht werden.

Zur Kenntnis der *Axiidae*.

Von Dr. W. Marten, Krefeld.

(Mit 1 kolor. Tafel, 1 Schwarztafel, 1 Karte und zahlreichen Textfiguren.)

(Fortsetzung.)

Über die anderen Arten ist weniger zu sagen. — *Axia vaulogeri*, die ich auf Tafel III und auf der Tafelskizze a 1—4 abbilde, wird im SEITZ-Werk wie folgt beschrieben: »Beträchtlich größer als *margarita* Hbn. Vorderflügel violettrot, gegen die Mitte bedeutend dunkler werdend; an der Basis des submedianen Zwischenraumes ein kleiner dreieckiger brauner Fleck, fein silbern gesäumt . . .« — Die Farbbezeichnung, bekanntlich immer ein etwas heikler Punkt, da hier das persönliche Empfinden — wie REISSER richtig sagt — weitgehend mitspielt, ist nicht ganz zufriedenstellend gelöst. Er nennt sie »trübfleischrosa« und dürfte damit genau das richtige getroffen haben, wenigstens für die Mehrzahl der Individuen. Das Rot der Abbildung im Supplement zu Band 2, Tafel 15 f müßte matter sein. Ich besitze 6 ♂♂ und 2 ♀♀, die von frischer Farbe sind. Nach diesen und drei weiteren mir vorliegenden Exemplaren möchte ich sagen: Farbe ein mehr oder weniger intensives Trübfleischrosa, mit Übergängen bis zu reiner Lehmfarbe (von der var. *ernestina* ganz abgesehen). Die weitere Beschreibung müßte lauten: ♀ an der Basis des submedianen Zwischenraumes ein kleiner honiggelber (sepiabrauner) Fleck, fein gelblich-silbern umsäumt. Im Gegensatz zu *margarita* fehlt bei *vaulogeri* der gelbe Wisch an

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Zukowsky H.

Artikel/Article: [Reise ans Schwarze Meer und Herkulesbad \(Lep.\). \(Schluß.\) 573-576](#)