

## Verzeichnis

der im 54. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten,  
Formen und Namen.

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| achrosea ( <i>Heterolocha rosaria</i> ) WEHRLI (Lep.)         | 517   |
| aeschista ( <i>Stenodrina</i> ) BOURSIN (Lep.)                | 430   |
| agnata ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.)                     | 397   |
| albella ( <i>Phyciodes eunice</i> ) ZIKÁN (Lep.)              | 385   |
| albersi ( <i>Athetis</i> ) WARNECKE (Lep.)                    | 21    |
| alfierii ( <i>Eremodrina</i> ) BOURSIN (Lep.)                 | 439   |
| almanzorica ( <i>Zygaena contaminei</i> ) REISS (Lep.)        | 59    |
| altivolans ( <i>Zygaena trifolii</i> ) REISS (Lep.)           | 90    |
| ampliata ( <i>Dynamine zenobia</i> ) ZIKÁN (Lep.)             | 446   |
| amplomaculata ( <i>Zygaena nevadensis</i> ) REISS (Lep.)      | 29    |
| Apheterolocha WEHRLI (Lep.)                                   | 517   |
| Apocolotois WEHRLI (Lep.)                                     | 144   |
| asterope ( <i>Heliconius egeria</i> ) ZIKÁN (Lep.)            | 329   |
| asturica ( <i>Zygaena contaminei</i> ) REISS (Lep.)           | 59    |
| asturiensis ( <i>Zygaena transalpina</i> ) REISS (Lep.)       | 91    |
| atricalva ( <i>Heterolocha</i> ) WEHRLI (Lep.)                | 516   |
| aurea ( <i>Colias wiskotti</i> ) KOTZSCH (Lep.)               | 45    |
| aurea ( <i>Dynamine erchia</i> ) ZIKÁN (Lep.)                 | 445   |
| azona ( <i>Zygaena carniolica</i> ) HOLIK (Lep.)              | 9     |
| barcelonica ( <i>Zygaena lavandulae</i> ) REISS (Lep.)        | 71    |
| barcellinus ( <i>Eueides thales</i> ) ZIKÁN (Lep.)            | 330   |
| berthae ( <i>Papilio euchenor</i> ) RUPP (Lep.)               | 201   |
| bertilo ( <i>Dynamine maeon</i> ) ZIKÁN (Lep.)                | 445   |
| bifasciata ( <i>Chrysis inaequalis</i> ) A. HOFFMANN (Hymen.) | 491   |
| blaisa ( <i>Gonodontis</i> ) WEHRLI (Lep.)                    | 128   |
| blanda ( <i>Colias wiskotti</i> ) KOTZSCH (Lep.)              | 45    |
| boliviensis ( <i>Bathypoelias</i> ) JENSEN (Hem.)             | 323   |
| breddini ( <i>Tancreisca</i> ) JENSEN (Hem.)                  | 170   |
| brunnea ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.)      | 531   |
| buchgraberii ( <i>Stenotarsus</i> ) MADER (Col.)              | 65    |
| cavillatrix ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.)                | 383   |
| chamaelon ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.)                    | 6     |
| chekiana ( <i>Trisuloides</i> ) DRAUDT (Lep.)                 | 400   |
| chrysochloris ( <i>Colias diva</i> ) KOTZSCH (Lep.)           | 540   |
| chrysoides ( <i>Heterolocha</i> ) WEHRLI (Lep.)               | 502   |
| cingulata ( <i>Zygaena transalpina</i> ) REISS (Lep.)         | 91    |
| circumcingulata ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) | 451   |
| clarior ( <i>Athetis albersi</i> ) WARNECKE (Lep.)            | 22    |
| communa ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.)      | 531   |
| concerpta ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.)                  | 398   |
| concolor ( <i>Eunica amelia</i> ) ZIKÁN (Lep.)                | 423   |
| confluens ( <i>Zygaena nevadensis</i> ) REISS (Lep.)          | 29    |

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>conjuncta</i> ( <i>Anartia amathea</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .          | 387   |
| <i>contaminata</i> ( <i>Trisuloides</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .           | 399   |
| <i>culminicola</i> ( <i>Colias cocandica</i> ) KOTZSCH (Lep.) . . . . .     | 44    |
| <i>cupreatus</i> ( <i>Encymon violaceus</i> ) MADER (Col.) . . . . .        | 63    |
| <i>cycloptera</i> ( <i>Anaea</i> ) ZIKAN (Lep.) . . . . .                   | 447   |
| <i>decorata</i> ( <i>Chrysis</i> ) HOFFMANN (Hymen.) . . . . .              | 491   |
| <i>decorata</i> ( <i>Veterna</i> ) JENSEN (Hem.) . . . . .                  | 322   |
| <i>defasciata</i> ( <i>Amauris nossifna</i> ) RÖBER (Lep.) . . . . .        | 298   |
| <i>dehaliaria</i> ( <i>Metrocampa</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .             | 2     |
| <i>demavendi</i> ( <i>Zygaena carniolica</i> ) HOLIK (Lep.) . . . . .       | 7     |
| <i>depuncta</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . .  | 531   |
| <i>disjunctus</i> ( <i>Eucteanus mediojunctus</i> ) MADER (Col.) . . . . .  | 65    |
| <i>Dzhugesia</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .                                    | 145   |
| <i>ecuadoriensis</i> ( <i>Agroecus</i> ) JENSEN (Hem.) . . . . .            | 171   |
| <i>edolatina</i> ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .               | 398   |
| <i>elaiodes</i> ( <i>Heterolocha</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .              | 503   |
| <i>eldritha</i> ( <i>Dynamine</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .                  | 446   |
| <i>elliptica</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . . | 532   |
| <i>ellisoni</i> ( <i>Paradrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .               | 431   |
| <i>eminens</i> ( <i>Parnassius autocrator</i> ) KOTZSCH (Lep.) . . . . .    | 52    |
| <i>Ephalaenia</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .                                   | 4     |
| <i>epinephela</i> ( <i>Apheterolocha</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .          | 517   |
| <i>eradiota</i> ( <i>Zygaena speciosa</i> ) REISS (Lep.) . . . . .          | 468   |
| <i>eremocosma</i> ( <i>Eremodrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .            | 438   |
| <i>Eremodrina</i> BOURSIN (Lep.) . . . . .                                  | 422   |
| <i>ergodes</i> ( <i>Corypha</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                   | 128   |
| <i>escorialica</i> ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.) . . . . .       | 30    |
| <i>espuhnica</i> ( <i>Zygaena trifolii</i> ) REISS (Lep.) . . . . .         | 90    |
| <i>eucrasia</i> ( <i>Phyciodes</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .                 | 385   |
| <i>euryptera</i> ( <i>Hoplodrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .             | 429   |
| <i>eumimeta</i> ( <i>Proteostrenia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .            | 1     |
| <i>euryptera</i> ( <i>Hoplodrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .             | 367   |
| <i>euxantha</i> ( <i>Heterolocha laminaria</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .    | 502   |
| <i>Exangerona</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .                                   | 145   |
| <i>exarcuata</i> ( <i>Zygaena hilaris</i> ) REISS (Lep.) . . . . .          | 73    |
| <i>excelsissima</i> ( <i>Eunica excelsa</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .        | 424   |
| <i>expergita</i> ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .               | 382   |
| <i>Exurapteryx</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .                                  | 160   |
| <i>flavicolor</i> ( <i>Colon brunneum</i> ) Roubal (Col.) . . . . .         | 35    |
| <i>fumigata</i> ( <i>Heliconius melpomene</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .      | 329   |
| <i>fusca</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . .     | 531   |
| <i>gelpkei</i> ( <i>Zygaena hilaris</i> ) REISS (Lep.) . . . . .            | 73    |
| <i>geminoides</i> ( <i>Zygaena filipendulae</i> ) REISS (Lep.) . . . . .    | 75    |
| <i>gigantea</i> ( <i>Craniophora ligustri</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .     | 375   |
| <i>gineri</i> ( <i>Pseudochrysis bihamata</i> ) HOFFMANN (Hymen.) . . . . . | 491   |
| <i>gredosica</i> ( <i>Zygaena rhadamanthus</i> ) REISS (Lep.) . . . . .     | 59    |
| <i>grusica</i> ( <i>Zygaena dorycnii</i> ) REISS (Lep.) . . . . .           | 103   |
| <i>guadarramica</i> ( <i>Zygaena trifolii</i> ) REISS (Lep.) . . . . .      | 89    |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| hahniella ( <i>Nepticula</i> ) WÖRZ (Lep.) . . .              | 290 |
| hepaticata ( <i>Leptomiza</i> ) WEHRLI (Lep.)                 | 127 |
| Hoplodrina BOURSIN (Lep.) . . . . .                           | 367 |
| humana ( <i>Fascellina aenigma</i> ) WEHRLI (Lep.)            | 126 |
| Hymenodrina BOURSIN (Lep.) . . . . .                          | 420 |
| hypopolia ( <i>Gonodontis</i> ) WEHRLI (Lep.) . . .           | 128 |
| icteria ( <i>Fascellina plagiata</i> ) WEHRLI (Lep.) . .      | 126 |
| incerta ( <i>Plagodis subpurpuraria</i> ) WEHRLI (Lep.)       | 162 |
| insitiva ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .         | 399 |
| insterburgia ( <i>Melitaea aurinia</i> ) BRAUN (Lep.)         | 556 |
| intensiva ( <i>Acronicta alni</i> ) DRAUDT (Lep.) . .         | 397 |
| inversa ( <i>Zygaena hilaris</i> ) REISS (Lep.) . . .         | 73  |
| isaura ( <i>Catagramma peristera</i> ) ZIKÁN (Lep.)           | 424 |
| jactans ( <i>Craniophora</i> ) DRAUDT (Lep.) . . .            | 376 |
| jucunda ( <i>Spondotriplax</i> ) MADER (Col.) . . .           | 113 |
| juno ( <i>Heterolocha chrysoides</i> ) WEHRLI (Lep.)          | 503 |
| jurečki ( <i>Endomychus</i> ) MADER (Lep.) . . . . .          | 69  |
| Kricheldorfiana ( <i>Zygaena filipendulae</i> ) REISS (Lep.)  | 75  |
| Krymaea ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . .     | 463 |
| lateripunctata ( <i>Tritoma</i> ) MADER (Col.) . . . .        | 113 |
| limbellus ( <i>Pseudosiopelus</i> ) SCHAUBERGER (Col.)        | 229 |
| Lioptilesia WEHRLI (Lep.) . . . . .                           | 129 |
| longatella ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .       | 381 |
| losonota ( <i>Satyrus statilinus</i> ) SCHMIDLIN (Lep.)       | 345 |
| lucifera ( <i>Zygaena hilaris</i> ) REISS (Lep.) . . .        | 72  |
| lucretius ( <i>Eueides eanes</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .     | 330 |
| lunulata ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.)     | 531 |
| lusitanica ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.) . . . .   | 30  |
| luxurians ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) .  | 532 |
| magnimaculata ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . | 462 |
| mayi ( <i>Anaea magdalena</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .        | 446 |
| melanographa ( <i>Nothomiza</i> ) WEHRLI (Lep.) . .           | 2   |
| merlinda ( <i>Pyrameis myrinna</i> ) ZIKÁN (Lep.)             | 386 |
| michaeli ( <i>Eueides thales</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . .         | 330 |
| minutissimum ( <i>Scaphosoma</i> ) PIC (Col.) . . . . .       | 207 |
| montana ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)         | 451 |
| naga ( <i>Papilio bootes</i> ) BELTER (Lep.) . . . . .        | 491 |
| natalense ( <i>Scaphosoma</i> ) PIC (Col.) . . . . .          | 207 |
| neugebaueri ( <i>Encymon</i> ) MADER (Col.) . . .             | 63  |
| nevermanni ( <i>Scaphosoma</i> ) PIC (Col.) . . .             | 206 |
| niveivertex ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .        | 6   |
| noguerensis ( <i>Zygaena trifolii</i> ) REISS (Lep.) . .      | 89  |
| novella ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .          | 397 |
| oberthüri ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.)    | 531 |
| ocellata ( <i>Callicore clymena</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . .    | 440 |
| octornata ( <i>Zygaena lavandulae</i> ) REISS (Lep.) . . .    | 71  |
| orbiculifera ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)    | 463 |
| Organomiza WEHRLI (Lep.) . . . . .                            | 2   |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ornatissima ( <i>Erebia epiphron</i> ) HORMUZAKI (Lep.) .         | 278 |
| Paradrina BOURSIN (Lep.) .                                        | 421 |
| Paragonodis WEHRLI (Lep.) . . . . .                               | 129 |
| parallela ( <i>Metrocampha</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .          | 4   |
| parallela ( <i>Sirinopteryx</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .         | 161 |
| parvipuncta ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) .    | 532 |
| paupera ( <i>Zygaena filipendulae</i> ) REISS (Lep.) . . . . .    | 76  |
| phaeocelis ( <i>Heterolocha</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .         | 516 |
| pinara ( <i>Heterolocha</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .             | 515 |
| plaumanni ( <i>Dasydactylus</i> ) MADER (Col.) . . . . .          | 100 |
| plesiarchia ( <i>Eremodrina bodenheimeri</i> ) BOURSIN (Lep.)     | 439 |
| pluripuncta ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) .    | 532 |
| pluspuncta ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) .        | 462 |
| politus ( <i>Anoplogenius</i> ) SCHAUBERGER (Col.) . . . . .      | 273 |
| polyphemus ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.)       | 532 |
| porphyrea ( <i>Plagodis</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .             | 162 |
| posticipluspuncta ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . | 451 |
| postobscura ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .            | 129 |
| privatus ( <i>Parnassius autocrator</i> ) KOTZSCH (Lep.) .        | 52  |
| prochlora ( <i>Leptomiza</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .            | 127 |
| prolita ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                | 130 |
| psara ( <i>Anonychia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                | 162 |
| Pseudathetis BOURSIN (Lep.) . . . . .                             | 366 |
| pseudocatalonica ( <i>Zygaena hilaris</i> ) REISS (Lep.) .        | 73  |
| pseudohispanica ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.) .        | 58  |
| pseudovariabilis ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.) .       | 58  |
| punctifera ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) .     | 531 |
| punctifera ( <i>Sirinopteryx</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .        | 161 |
| punctigerus ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .            | 7   |
| pyritosa ( <i>Heliconius melpomene</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . .     | 328 |
| quadrimacula ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)        | 463 |
| quadripunctata ( <i>Tritoma lateripunctata</i> ) MADER (Col.)     | 113 |
| quadripunctata ( <i>Zygaena speciosa</i> ) REISS (Lep.) . . .     | 468 |
| quinquemacula ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)       | 451 |
| quinquepuncta ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.) . . .      | 58  |
| regalis ( <i>Erebia</i> ) HORMUZAKI (Lep.) . . . . .              | 333 |
| regifica ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .             | 383 |
| reibenspiesi ( <i>Spondotriplax</i> ) MADER (Col.) . . . . .      | 114 |
| renirufa ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .             | 381 |
| rhabdota ( <i>Anonychia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .             | 162 |
| rjabovi ( <i>Crocallis</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .              | 145 |
| robusta ( <i>Hoffmannsegiella</i> ) JENSEN (Hem.) . . . . .       | 322 |
| romaniae ( <i>Erebia pharte</i> ) HORMUZAKI (Lep.) . . . .        | 279 |
| romilda ( <i>Anaea polyxo</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .            | 447 |
| roxana ( <i>Eremodrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .             | 438 |
| rubescens ( <i>Zygaena achilleae</i> ) REISS (Lep.) . . . .       | 59  |
| rubrior ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.) . . . . .        | 58  |
| rufispinus ( <i>Vitellus</i> ) JENSEN (Hem.) . . . . .            | 323 |

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>rufofulva</i> ( <i>Paraboea</i> ) JENSEN (Hem.) . . . . .                       | 32I      |
| <i>rufomarginata</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . .    | 532      |
| <i>rugulifer</i> ( <i>Pseudosiopelus</i> ) SCHAUBERGER (Col.) . . . . .            | 23I      |
| <i>schmidti</i> ( <i>Scaphosoma</i> ) PIC (Col.) . . . . .                         | 206      |
| <i>schwarzbaueri</i> ( <i>Encymon</i> ) MADER (Col.) . . . . .                     | 62       |
| <i>schwingenschussi</i> ( <i>Zygaena ecki</i> ) REISS (Lep.) . . . . .             | 454      |
| <i>semicaeca</i> ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .           | 452, 462 |
| <i>similatus</i> ( <i>Heliconius xanthocles</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .           | 328      |
| <i>smaragdina</i> ( <i>Canna</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .                         | 374      |
| <i>speciosa</i> ( <i>Zygaena</i> ) REISS (Lep.) . . . . .                          | 466      |
| <i>Spinuncina</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .                                          | 563      |
| <i>staudingeri</i> ( <i>Eumorphus</i> ) MADER (Col.) . . . . .                     | 6I       |
| <i>Stenodrina</i> BOURSIN (Lep.) . . . . .                                         | 368      |
| <i>stigmatica</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . .       | 53I      |
| <i>stoechadoides</i> ( <i>Zygaena carniolica</i> ) HOLIK (Lep.) . . . . .          | 9        |
| <i>striata</i> ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .             | 464      |
| <i>Stygiodrina</i> BOURSIN (Lep.) . . . . .                                        | 366      |
| <i>subchromaria</i> ( <i>Fascellina chromataria</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .      | 126      |
| <i>subpurpuraria</i> ( <i>Plagodis</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                   | 16I      |
| <i>subrugulosus</i> ( <i>Pseudosiopelus</i> ) SCHAUBERGER (Col.) . . . . .         | 23I      |
| <i>subsparsus</i> ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                       | 5        |
| <i>subvirens</i> ( <i>Fascellina plagiata</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .            | 126      |
| <i>subvirgatula</i> ( <i>Ourapteryx</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                  | 146      |
| <i>succedens</i> ( <i>Acronicta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .                      | 382      |
| <i>suffusa-argentea</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . . | 532      |
| <i>suleimanica</i> ( <i>Zygaena achilleae</i> ) REISS (Lep.) . . . . .             | 453      |
| <i>sulphurata</i> ( <i>Phyciodes lansdorfi</i> ) ZIKÁN (Lep.) . . . . .            | 386      |
| <i>surchica</i> ( <i>Hymenodrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .                    | 430      |
| <i>sutschanska</i> ( <i>Heterolocha laminaria</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .        | 502      |
| <i>Symmetresia</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .                                         | 502      |
| <i>Tancreisca</i> JENSEN (Hem.) . . . . .                                          | 169      |
| <i>tapferi</i> ( <i>Episcapha</i> ) MADER (Col.) . . . . .                         | II2      |
| <i>teberdensis</i> ( <i>Zygaena dorycnii</i> ) REISS (Lep.) . . . . .              | 103      |
| <i>teruelensis</i> ( <i>Zygaena lavandulae</i> ) REISS (Lep.) . . . . .            | 72       |
| <i>teutoburgensis</i> ( <i>Acidalia herbariata</i> ) SCHULTZ (Lep.) . . . . .      | 146      |
| <i>tignumbrum</i> ( <i>Craniophora</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .                   | 375      |
| <i>tingitana</i> ( <i>Zygaena speciosa</i> ) REISS (Lep.) . . . . .                | 469      |
| <i>trigona</i> ( <i>Selenia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                          | 4        |
| <i>trimacula-caeca</i> ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .     | 463      |
| <i>trinasuta</i> ( <i>Anonychia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                      | 162      |
| <i>trinubila</i> ( <i>Daseochaeta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .                    | 374      |
| <i>tristis</i> ( <i>Lycaena allardi</i> ) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . . . .          | 53I      |
| <i>tumulorum</i> ( <i>Heterographa</i> ) BOURSIN (Lep.) . . . . .                  | 17       |
| <i>turgaica</i> ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .            | 466      |
| <i>unifasciata</i> ( <i>Chrysis subsinuata</i> ) HOFFMANN (Hymen.) . . . . .       | 49I      |
| <i>ustapex</i> ( <i>Garaeus</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .                          | 6        |
| <i>violascens</i> ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .          | 462      |
| <i>viridescens</i> ( <i>Amata nigricornis</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .         | 45I      |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| viridissima ( <i>Apheterolocha quadraria</i> ) WEHRLI (Lep.) . | 517   |
| vittipenne ( <i>Antongilium</i> ) PIC (Col.) . . . . .         | 207   |
| xantha ( <i>Colias cocandica</i> ) KOTZSCH (Lep.)              | 45    |
| xanthorhoda ( <i>Eremodrina</i> ) BOURSIN (Lep.)               | 437   |
| xylina ( <i>Ephalaenia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . .               | 5     |
| zapateri ( <i>Zygaena sarpedon</i> ) REISS (Lep.)              | 57    |
| zobeidah ( <i>Paradrina</i> ) BOURSIN (Lep.) . . .             | 431   |

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Verzeichnis der im 54. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten, Formen und Namen. 581-586](#)