

# Entomologische Rundschau

mit Societas entomologica.

Verlag: Alfred Kernen, Stuttgart-W, Schloß-Str. 80.

Die Entomolog. Rundschau erscheint am 1., 8., 15. und 22. des Monats gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung in derselben. Mitarbeiter erhalten 30 Sonderdrucke ihrer Beiträge unberechnet

Schriftleitung: Prof. Dr. M. Draudt, Darmstadt, Osannstr. 8

Inhalt: Herbert Sick, 2. Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Ostholsteins — Henry Beuret, Beitrag zur Kenntnis der alpinen Formen von *Lycaeides idas* L. (= *argyrognomon auct. nec Bergstr.*) — Wilh. Brandt, Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran.

## 2. Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Ostholsteins.

Von Dr. *Herbert Sick*, Eutin-Fissau.

(Fortsetzung.)

7. Gattung: *Macrothylacia* Ramb.

44. *M. rubi* L. ist hier, wie in allen Nbf., besonders als Raupe h. Ich fing den Falter, vornehmlich die ♀♀, jedoch auch die ♂♂, in F. a. L. im VI.—VII.

13. Familie: *Saturnidae*.

14. Gattung: *Eudia* Jordan.

45. *E. pavonia* L. wurde schon von DAHL s. bei E. gefangen. Ich fand am 16. VIII. 28 3 Raupen im Sibbersdorfer Moor an *Calluna vulgaris* Salisb., die am 15.—17. III. 29 2 ♂♂ und 1 ♀ ergaben. Auf allen Mooren Schleswig-Holsteins n. s.—h.

Familie: *Sphingidae*.

1. Gattung: *Acherontia* O.

46. *A. atropos* L. Über diese Art ist schon so viel geschrieben worden, daß ich mich auf die einzelnen Funddaten beschränken kann. Mein Vater bekam 1900 im IX. und X. Puppen und Raupen in ziemlich großer Anzahl, die noch im selben Jahre die Falter ergaben. Ich bekam 1932 4 Raupen bzw. Puppen, die ebenfalls noch im gleichen Jahre die Falter ergaben. Von allen Nbf. bekannt.

2. Gattung: *Herse* Oken.

47. *H. convolvulvi* L. wird viel seltener als die vorige Art gefunden. Ich bekam 1932 mit *atropos* zusammen 2 Puppen, die im selben Herbst 1 ♂ und 1 ♀ ergaben. Von allen Nbf. bekannt, aber s. s.

17. Familie: *Notodontidae*.

4. Gattung: *Cerura* Schrk.

48. *C. bifida* Hbn. ist schon von DAHL gefangen, wenn auch selten. Die Art ist auch von A. und mir nur wenig beobachtet, F. a. L. 6. VIII. 36 1 Ex., 9. VI. 37 1 Ex. Es ist möglich, daß hier eine zum mindesten teilweise 2. Generation vorkommt. In allen Nbf. mehr oder minder h.

5. Gattung: *Dicranura* Bsd.

49. *D. vinula* L. ist ebenfalls nur wenig beobachtet; ich fand eine Raupe am 1. VII. 34 im Wüstenfelder Gehege. Lü., Hbg. h., K. n. s.

6. Gattung: *Stauropus* Germ.

- \*50. *S. fagi* L. Bei dieser Art bestehen noch Zweifel über die Zahl der Generationen. WARNECKE 1928 hält die Frage für ungeklärt. Vielleicht geben meine Fänge vom 4. VIII. 28 1 Ex., 14. VIII. 30 1 Ex. und 6. VIII. 31 1 Ex. in F. a. L. einigen Aufschluß. A. fing die Art am 22. VI. 30 in der Neukoppel an einem Buchenstamm. RATZOW gibt auch nur die Monate IV. bis VI. als Flugzeit an; CLOSS-HANNEMANN (Berlin) geben diese von V.—VIII. an. Nur von Hannover wird noch die Möglichkeit einer zweiten Generation erwogen, da dort ein Falter noch im VIII. gefangen wurde. Ich glaube, daß auch in Schleswig-Holstein eine zum mindesten partielle zweite Generation vorkommt.

10. Gattung: *Hoplitis* Hbn.

- \*51. *H. milhauseri* F. wurde von mir am 14. VII. 36 in 1 Ex. in F. a. L. gefangen. Die Art ist bei Lü. und Hbg. s. s. und bei K. noch nicht gefunden. Hannover s., bei Stettin 1932 zum ersten Male als Falter.

17. Gattung: *Drymonia* Hbn.

- \*52. *D. chaonia* Hbn. wurde von mir am 19. VII. 36 in 1 Ex. und 9. VI. 37 in 2 Ex. in F. a. L. gefangen. Die Art ist bei Lü. und Hbg. z. s. und ist auch in Mecklenburg und Pommern nur spärlich beobachtet.

18. Gattung: *Pheosia* Hbn.

53. *Ph. tremula* Cl. ist schon von SEMPER n. s. bei Niendorf und von A. s. bei Gbg. gefunden. Ich fing am 1. VIII. 34, 6. VIII. 36, 9. VII. 36 und 30. VI. 37 je 1 Ex. in F. a. L., von denen das letzte schon ziemlich stark abgeflogen war. Die deutet auf eine zweite Generation hin, wie sie auch von URBAHN für das Stettiner Gebiet angenommen werden. Die Art ist in allen Nbf. n. s.—z. h.

- \*54. *Ph. dictaeoides* Esp. wurde von mir am 1. VIII. 34 1 Ex., 6. VIII. 34 2 Ex., 19. VII. 36 und 21. VI. 37 je 1 Ex. gefangen. Auch bei dieser Art kann es sich am zwei Generationen handeln, wie sie WARNECKE für Hbg. angibt. Lü. und Hbg. seltener als *tremula*; fehlt bei K. (?).

21. Gattung: *Notodonta* O.

55. *N. dromedarius* L. ist von SEMPER bei Niendorf gefunden. Ich fing am 4. VIII. 34, 14. VII. 36, 19. VII. 36, 25. VI. 37, 11. VII. 37 je 1 Ex. in F. a. L. Alle Stücke waren noch nicht abgeflogen (im übrigen siehe *N. ziczac* L.).
56. *N. ziczac* L. kommt von Anfang V.—VI. und wieder von Ende VII.—IX. vor. Es handelt sich also offensichtlich um 2 Generationen. Raupen wurden hier von Mitte V.—X. gefunden. In allen Nbf. h.
- \*57. *N. anceps* Goeze wurde von mir als Raupe im August 1928 bei Sibbersdorf gefunden, die jedoch von Ameisen getötet war; am 14. VII. 36 und 6. VI. 37 fing ich je 1 Ex. in F. a. L., A. fand Raupen bei Gbg. in der Neukoppel. In allen Nbf. n. s.—h., nur bei K. s.

29. Gattung: *Lophopteryx* Steph.

58. *L. camelina* L. hat eine ausgedehnte Flugzeit von Ende IV. bis Mitte VIII., vereinzelt sogar bis weit in den IX. hinein in zwei Generationen und ist hier wie in allen Nbf. h. In dem leider noch nicht veröffentlichten Verzeichnis von RATZOW (Lübeck) gibt dieser als frühestes Funddatum schon den 22. III. (20) und als letztes den 16. VIII. (22) an. Ich fand 1 Ex. noch am 11. IX. 35 im Prinzenholz. Hierdurch wird wohl erwiesen sein, daß hier zwei Generationen vorkommen, wie sie von Hannover als regelmäßig angegeben werden. Bei Hbg. wurde die Art nur im VI.—VII. beobachtet.

32. Gattung: *Pterostoma* Germ.

59. *P. palpina* L. ist bei E. n. s.; in F. a. L. fand ich den Falter z. h. von Anfang VII. bis Mitte VIII. In allen Nbf. verbr. und n. s.

33. Gattung: *Ptilophora* Steph.

60. *Pt. plumigera* Esp. Bei dieser Art verweise ich auf die Arbeit von WARNECKE »Neuere Beobachtungen über die Verbreitung einiger Macrolepidopteren in Schleswig-Holstein« in Entomol. Anzeiger, Jahrg. IX und X. Ich fing die Art, wenn auch immer nur einzeln, so doch regelmäßig von Ende X. bis weit in den XI. hinein.

39. Gattung: *Pygaera* O.

61. *P. pigra* Hfn. ist von mir nur spärlich in F. a. L. gefangen, von A. bei Gbg. jedoch h. In allen Nbf. h.

## Noctuiiformes.

### 2. Familie: Noctuidae.

#### 1. Gattung: *Panthea* Hbn.

- 61 a. *P. coenobita* Esp. wurde in Ostholstein noch nicht gefunden. Am 16. VI. 29 fand ich ein frisches ♀ im Halloer Gehege in Mittelholstein. Die Art ist sonst in Schleswig-Holstein nur s. s. beobachtet.

#### 7. Gattung: *Colocasia* Hbn.

62. *C. coryli* L. ist hier von V.—VI. z. s. In den Nbf. n. s.—z. h.

#### 7 a. Gattung: *Diloba* Bsd.

63. *D. caeruleocephala* L. ist im X.—XI. s. h., besonders am Licht. In allen Nbf. s. h. Über die systematische Stellung vgl. Allg. Teil.

#### 14. Gattung: *Acronicta* Tr.

64. *A. aceris* L. Überall am Köder und besonders in F. a. L. z. h. Nach A. bei Gbg. nur s. In allen Nbf. n. s.

65. *A. leporina* L. fand ich immer nur einzeln in F. a. L. und meist in der *forma grisea* Cochr. Wurde auch schon von DAHL und SEMPER im Gebiet gefangen.

66. *A. ligustri* F. Wie in allen Nbf. wird die Art hier immer nur einzeln gefunden; A. fing 1 Ex. am 23. VI. 30 bei Gbg. und ich 1 Ex. am 19. VII. 36 in F. a. L.

67. *A. megacephala* F. ist oft h., besonders in F. a. L.

68. *A. strigosa* F. wurde schon von DAHL bei E. gefangen. A. fand 1907 1 Ex. bei Gbg. und am 26. VII. 28 1 Ex. bei Schwartau im Kuhbrook. In den Nbf. immer nur s.

#### 15. Gattung: *Chamaepora* Warr.

69. *C. auricoma* F. Von SEMPER im Mai bei Niendorf gefangen. Ich fing am 25. VI. 34 2 Ex. in F. a. L. In allen Nbf. z. h.

- \*70. *C. menyanthidis* View. wurde von A. am 23. VII. 17 in 1 Ex. im Süseler Moor gefangen. In den Nbf. n. s.—z. h.

71. *C. rumicis* L. ist hier s. h.—gem. Es kommen sicher zwei Generationen vor. Ich fing den Falter im ganzen Gebiet am Köder und am Licht von Ende IV. bis Ende X. in frischen Stücken. In allen Nbf. s. h.

#### 21. Gattung: *Rhyacia* Hbn.

72. *R. ypsilon* Rott. ist hier am Licht und am Köder oft s. h. von VIII. bis Ende X.

- \*73. *R. porphyrea* Schiff. wurde von mir nur 1927 und 1937 im VII. in je 1 Ex. in F. a. L. gefangen. In den Heidegegenden Schleswig-Holsteins. ist die Art h.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Sick Herbert

Artikel/Article: [2. Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Ostholsteins. 17-20](#)