

Die Noctuiden-Fauna der Leipziger Tieflandsbucht.

Von *Herbert Beck*, Borsdorf (Leipzig).

(Schluß.)

Scoliopteryx Germ.

libatrix L. Juli und Herbst bis Frühjahr überall häufig. Raupe im Juni und September auf *Salix* und *Populus*. Schmetterlinge oft in großer Zahl in Kellern und Höhlen überwintert.

Telesilla H. S.

amethystina Hb. Um die Jahrhundertwende bei Wahren, Waldsteinberg, Harth, nicht selten im Juni. Raupen im August auf *Oenanthe aquatica*, *Peucedanum*, *Silans pratensis* gefunden. Zucht mit *Daucus carota* durchgeführt. In neuerer Zeit nicht mehr beobachtet.

Habrostola O.

triplasia L. Ende April bis Juni und Juli bis September, überall, nicht selten. Am Licht häufig (BECK). Raupe im Frühsommer und Herbst an *Urtica*.

asclepiadis Schiff. Mai bis Juli, überall, häufig. Raupe im Juli und August an *Cynanchum (Asclepias) vincetoxicum*. Bei Tage an der Erde verborgen.

tripartita Hufn. im Mai/Juni, August/September, überall, nicht selten. Raupe Juni/Juli und Herbst an *Urtica*.

Plusia O.

moneta F. im Mai und August, namentlich in Gärten nicht selten. Raupe Mai/Juni und Spätsommer an *Aconitum*, *Trollius*, *Delphinium*. Meist an den Blüten und zusammengesponnenen Endblättern.

chrysis L. vom Juni bis September überall häufig. — ab. *ivincta Tutt.* häufig unter der Stammart. Raupe Mai, Juli an *Urtica*, *Bal-lota*, *Salvia*, *Echium*.

festucæ L. Juli/August, überall, jedoch nicht häufig. Raupe im Frühjahr auf nassen Wiesen an *Festuca*- und *Carex*-Arten. Auch an *Glyceria spectabilis* und *Sparganium*.

gutta Gn. Im September zerstreut und selten. Raupen an *Matricaria chamomilla* und *Achillea millefolium*.

jota L. Juni/Juli zerstreut und selten. Raupen an *Urtica*, *Lamium*, *Viola*, *Primula*, Polyphag.

pulchrina Hw. Juni bis August, zerstreut und selten. 7. 7. 26, und 25. 7. 36 je 1 ♂ 1 ♀ am Licht Borsdorf (BECK), bei Beucha, Oberholz. Raupen an *Populus tremula*, *Salix caprea*, *Vaccinium*, an niederen Pflanzen.

consona F. Juli bis September, nicht häufig. Raupe an *Pulmonaria* und *Lycopsis arvensis* im Mai/Juni. 1934 nördlich Leipzig auf *Nonnea pulla DC.* gefunden (KLÖTZSCH).

gamma L. in 2 bis 3 Generationen, überall gemein. Falter bisweilen überwinternd. Raupe polyphag an niederen Pflanzen. Bisweilen als Schädling (a. Trifolium).

Euclidia O.

mi Cl. Mai und August überall häufig. Raupe Juni und Herbst an Trifolium, Myrica gale, Rumex.

glyphica L. Mai bis August in 2 Generationen, überall häufig. Raupen an Trifolium.

Pseudophia Gn.

lunaris Schiff. Mai, Anfang Juni, überall, in Jungeichenbeständen nicht selten. Raupe Juni bis August monophag an Quercus, frißt nur die jungen Triebe.

Aedia Hb.

funesta Esp. Im Juni/Juli, früher bei Taucha, Lützschena, Mökkern gefangen. In letzter Zeit nicht mehr beobachtet. Raupe im Juli/August an Hecken an Convolvulus sepium, bei Tage an der Erde verborgen.

Catephia O.

alchymista Schiff. Im Mai überall, jedoch selten. Kohlenberg, Beucha, Drese, kommt bisweilen in einer 2. Generation im August bis September vor. 17. 8. 33/25. 8. 35 a. Kohlenberg (BECK). Raupe Juli/August an Eichenbüschen.

Catocala Schrk.

fraxini L. Ende Juli bis September überall, nicht selten. Machern, Beucha, Borsdorf, Harth. — ab. *moerens* Fuchs 1./2. 8. 37 Borsdorf, nicht selten am Köder (BECK). — ab. *gaudens* Stgr. Unter der Stammart selten. Raupe Mai/Juni an Fraxinus, Populus tremulus, auch an Quercus.

elocata Esp. August/September, überall, nicht selten. Raupe auf Populus und Salix. Mai/Juni.

nupta L. Juli bis September, überall, häufig. 1935 Borsdorf gemein (BECK). Raupe Mai/Juni an Populus und Salix.

sponsa L. Juli/August, in Eichenwäldern überall, häufig. Naunhof, Waldsteinberg, Drese, Harth. Raupe Mai/Juni auf Quercus (und Castanea sativa).

promissa Esp. Juni/Juli, verbreitet, jedoch selten. Beucha, Kohlenberg, Drese, Machern, am Köder nicht selten. Raupe Mai Juni an Quercus (auch Castanea sativa).

paranympha L. (*fulminea* Scop.). Im Juli/August, zerstreut und selten. 1 ♀ Juli 1911 Hirschfeld bei Borsdorf (KLÖTZSCH). Raupe im Mai auf Pronus und Grataegus.

Toxocampa Gn.

pastinum Tr. Zerstreut und selten. 2. 7. 36 2 ♂ am Licht, Borsdorf (BECK). Raupe Juni/Juli und Herbst bis Frühjahr an Astragalus, Coronilla, besonders Vicia cracca.

Laspeyra Germ. (Aventia Dup.).

flexula Schiff. Mai/Juni, früher selten, jetzt überall ziemlich häufig. Harth, Oberholz, Borsdorf, Waldsteinberg. Raupe September bis Mai an den Flechten von Coniferen.

Parascotia Hb. (Boletobia B.)

fuliginaria L. Juli/August, überall, jedoch selten. In der Harth wiederholt gefunden (FIEDLER). Raupe Herbst bis Juni an Flechten (Parmelia). An Baumschwämmen (Polyporus) gesellig gefunden, besonders an Quercus und Fagus.

Epizeuxis Hb. (Helia Gn.).

calvaria F. Juni/Juli, selten. Harth, Lindenthal, Scheibenhof, Borsdorf, Raupe Herbst bis Juni an dürren Blättern und welken Pflanzen.

Zanclognatha Ld.

tarsiptumalis Hb. Zerstreut und selten. Früher häufig bei Connewitz, in der Harth, bei Lucka. In neuester Zeit 2 Exemplare bei Schleußig (M. MÜLLER). Juli. Raupe Herbst bis Frühjahr an vermoderten Blättern und polyphag an niederen Pflanzen.

grisealis Hb. Zerstreut und selten. Im Juni und August. Harth, Kämmerei-Forst. Raupe Herbst bis Frühjahr an Windbruch von Carpinus betula, Quercus, auch an Rubus-Arten.

tarsicrinalis Knoch. Juni/Juli, nicht selten. Rosenthal, Leutzsch, Naunhof, Schkeuditz. Raupe an trockenen Blättern von Rubus-Arten, Clematis, auch an niederen Pflanzen.

Standfusia Spul. (Sophronia Gn.)

emortualis Schiff. Mai/Juni in Eichenwäldern überall, jedoch selten. Hauth, Kämmerei-Forst. Raupe an dürren, herabgefallenen Eichenblättern im Herbst. Überwintert als Puppe.

Madopa Stph.

salicalis Schiff. Mai/Juni, zerstreut und selten. Naunhof, Kohlenberg, Harth. Raupe vom Juli bis September auf Salix und Populus.

Herminia Latr.

tentacularia L. Juni/Juli überall, nicht selten. Raupe bis Mai an niederen Pflanzen, besonders Hieracium pilosella, auch an Gramineen.

derivatis Hb. Juni/Juli, selten, Kohlenberg, Waldsteinberg, Naunhof. Raupe an dürren Blättern von Quercus und Rubus.

Pechypogon Hb.

barbalis Cl. Im Mai/Juni, überall, häufig. Raupe an Quercus, Betula, Alnus, später an dürren Blättern am Boden. Überwintert als Raupe.

Bomolocha Hb.

fontis Thnb. Mai bis Juli überall, häufig. Raupe August/September an Vaccinium myrtillus. – ab. *terricularis Hb.* unter der Stammart.

Hypena Tr.

rostralis L. In 2 Generationen von Mai bis August, überall, häufig. Raupe Mai/Juni und September an *Urtica* und *Humulus*. — ab. *radiatalis Hb.* Unter der Stammart selten.

proboscidalis L. Mai/Juni und Ende Juli bis Oktober, überall, häufig. Im Auwald bei Schkeuditz gemein (UDE). Raupe Mai, Juni, August, September an *Urtica* und *Humulus*.

Cymatophoridae H.-S.***Habrosyne Hb.***

derasa L. Juli/August, überall, selten. In der Harth. Borsdorf 16. 7. 36 1 ♂♀ am Licht (BECK). Raupe im Herbst an *Rubus*-Arten.

Thyatira O.

batis L. Juni und September, überall, nicht selten. Raupe Mai und Juli/August an *Rubus*-Arten, besonders *Rubus idaeus*.

Cymatophara Tr.

flavicornis Cl. (or. F.). April/Mai bis Juli, überall, nicht selten. 1. 8. 37 1 Exemplar am Köder Borsdorf (BECK), 2. 5. 31 1 ♀ am Köder Belgershain (WEYGAND). Raupe an *Populus nigra* und *tremula*.

ocularis L. (octogesima Hb.) Überall, im April/Mai vereinzelt. 1930 am Bienitz 2 ♀ (WEYGAND). 1937, 3 Ex. am Licht Borsdorf (BECK) Raupe im September auf *Populus*.

duplaris L. April bis Juni und Juli/August, nicht häufig. 8. 8. 36 2 Exemplare am Licht Borsdorf (BECK). Raupe Juni und September an *Betula*, *Alnus*, *Populus nigra*.

fluctuosa Hb. Mai bis August zerstreut und selten. Leina, Kohlenberg, Oberholz. Raupe im Herbst an *Betula*.

Polyploca Hb. (Asphalia Hb.)

ridens F. April/Mai, überall, nicht häufig. Raupe Ende Mai bis Juni auf *Quercus*. Mordraupe. 27. 5. 37 Raupen in Anzahl geklopft. Drese (BECK, FIEDLER).

diluta F. Im August/September, selten. Letztmalig am 10. 9. 04 bei Lindenthal am Köder gefangen.

Brephidae H.-S.***Brephos O.***

parthenias L. März/April, überall, häufig. Raupe Mai/Juni, auf *Betula*, auch *Fagus*.

nothum Hb. März/April, überall, jedoch selten. Raupe im Mai Juni auf *Populus tremulus* und *Salix*-Arten.

Literatur.

Die Angaben, die sich auf die Zeit vor 1900 beziehen, wurden dem Buch: Die Großschmetterlinge des Leipziger Gebietes, herausgegeben vom Entomologischen Verein Fauna, Leipzig 1900 entnommen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Beck Herbert

Artikel/Article: [Die Noctuiden-Fauna der Leipziger Tieflandsbucht. \(Schluß.\) 154-157](#)