

Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark.

(Schleswig-Holsteins, Lübecks und Lauenburg, einschließlich der
nordelbischen Gebietsteile Hamburgs).

Als Vorläufer zu einer Fauna
der Großschmetterlinge der Nordmark.

Von G. Warnecke, Kiel.

(Fortsetzung.)

- | | |
|--|---|
| 323. <i>Euplexia lucipara</i> L. | 349. <i>Leuc. impura</i> Hb. |
| 324. <i>Brotolomia meticulosa</i> L. | 350. <i>Leuc. favicolor</i> Barr. (nordfriesische Inseln). |
| 324 a. <i>Mania maura</i> L. (Lübeck, einmal). | 351. <i>Leuc. pallens</i> L. |
| 325. <i>Naenia typica</i> L. | 352. <i>Leuc. obsoleta</i> Hb. |
| 326. <i>Helotropha leucostigma</i> Hb. | 353. <i>Leuc. straminea</i> Tr. (noch nicht in Schleswig gefang.) |
| 327. <i>Hydroecia oculatea</i> L. (nictitans Bkh.). | 354. <i>Leuc. comma</i> L. |
| 328. <i>Hydr. fucosa</i> Frr. (chryso-grapha Hb., paludis Tutt.). | 355. <i>Leuc. l-album</i> L. (Holstein). |
| 329. <i>Hydr. lucens</i> Frr. | 356. <i>Leuc. littoralis</i> Curt. (Küsten). |
| 330. <i>Hydr. micacea</i> Esp. | 357. <i>Leuc. conigera</i> F. |
| 331. <i>Gortyna ochracea</i> Hb. | 358. <i>Leuc. albipuncta</i> F. (Holstein). |
| 332. <i>Nonagria nexa</i> Hb. (Hamburg, Holstein). | 359. <i>Leuc. lythargyrea</i> Esp. |
| 333. <i>Non. cannae</i> O. | 360. <i>Leuc. turca</i> L. (noch nicht in Schleswig gefangen). |
| 334. <i>Non. sparganii</i> Esp. | 361. <i>Grammesiatrigrammica</i> Hfn. |
| 335. <i>Non. typhae</i> Thnbg. | 362. <i>Caradrina quadri-punctata</i> F. |
| 336. <i>Non. geminipuncta</i> Hatch. (Hamburg, Lauenburg, Holstein). | 363. <i>Car. selini</i> B. (Hamburg, Lauenburg). |
| 337. <i>Non. neurica</i> Hb. | 364. <i>Car. respersa</i> Hb. (Lauenburg). |
| 338. <i>Non. dissoluta</i> Tr. (Hamburg, Holstein). | 365. <i>Car. mropheus</i> Hfn. |
| 339. <i>Coenobia rufa</i> Hw. (Lauenburg). | 366. <i>Car. alsines</i> Brahm. |
| 340. <i>Senta maritima</i> Tausch. | 367. <i>Car. taraxaci</i> Hb. |
| 341. <i>Meliana flammea</i> Curt. | 368. <i>Hydrilla palustris</i> Hb. (Hamburg, Lübeck). |
| 342. <i>Tapinostola elymi</i> Tr. (Küsten). | 369. <i>Petilampa arcuosa</i> Hw. |
| 343. <i>Tap. hellmanni</i> Ev. | 370. <i>Rusina umbratica</i> Goeze. |
| 344. <i>Tap. fulva</i> Hb. | 371. <i>Amphipyra tragopoginis</i> L. |
| 345. <i>Luceria virens</i> L. | 372. <i>Amph. perflua</i> F. (Hamburg früher, Rendsburg). |
| 346. <i>Calamia lutosa</i> Hb. | 373. <i>Amph. pyramidea</i> L. |
| 347. <i>Cal. phragmitidis</i> Hb. | 374. <i>Taeniocampa gothica</i> L. |
| 348. <i>Leucania impudens</i> Hb. | 375. <i>Taen. miniosa</i> F. |

376. *Taen. pulverulenta* Esp.
 377. *Taen. populeti* Tr.
 378. *Taen. stabilis* View.
 379. *Taen. incerta* Hfn.
 380. *Taen. opima* Hb.
 381. *Taen. gracilis* F.
 382. *Taen. munda* Esp.
 383. *Panolis griseovariegata* /
 Goeze.
 384. *Dicycla oo* L. (Lauenburg).
 385. *Calymnia pyralina* View.
 386. *Cal. affinis* L. (Hamburg,
 Insel Föhr).
 387. *Cal. trapezina* L.
 388. *Cosmia paleacea* Esp.
 389. *Dyschorista suspecta* Hb.
 390. *Dysch. fissipuncta* Hw.
 391. *Plastenis retusa* L.
 392. *Plast. subtusa* F.
 393. *Orthosia rutilicilla* Esp. (bis
 zum südlichen Schleswig).
 394. *Orth. lota* Cl.
 395. *Orth. macilenta* Hb.
 396. *Orth. circellaris* Hfn.
 397. *Orth. helvola* L.
 398. *Orth. pistacina* F.
 399. *Orth. nitida* F.
 400. *Orth. litura* L.
 401. *Xanthia citrigo* L.
 402. *X. aurago* F.
 403. *X. lutea* Ström.
 404. *X. fulvago* L.
 405. *X. gilvago* Esp.
 406. *X. ocellaris* Bkh. (Lauen-
 burg).
 407. *Hoporina croceago* F. (früher
 auch nördlich der Elbe bei
 Hamburg).
 408. *Orrhodia erythrocephala* F.
 (Hamburg, Lauenburg,
 Kiel).
 409. *Orrh. vau-punctatum* Esp.
 (Lauenburg).
 410. *Orrh. vaccinii* L.
 411. *Orrh. ligula* Esp. (Hamburg,
 Lauenburg).
 412. *Orrh. rubiginea* F. (Ham-
 burg, Lauenburg, bis ins
 südliche Schleswig).
 413. *Scopelosoma satellitia* L.
 414. *Xylina semibrunnea* Hw.
 (bis ins westliche Mittel-
 schleswig).
 415. *Xyl. socia* Rott. (Hamburg,
 Lauenburg).
 416. *Xyl. furcifera* Hfn.
 417. *Xyl. lambda* F. subsp.
zinckenii Tr. (Holstein).
 418. *Xyl. ornithopus* Rott. (Ham-
 burg, Rendsburg).
 419. *Calocampa vetusta* Hb.
 420. *Cal. exoleta* L.
 421. *Cal. solidaginis* Hb. (Lauen-
 burg, Hamburg).
 422. *Xylocampa areola* Esp.
 423. *Cucullia verbasci* L.
 424. *Cuc. scrophulariae* Cap.
 425. *Cuc. lychnitis* Rbr. (Lübeck).
 426. *Cuc. asteris* Schiff.
 427. *Cuc. tanacetii* Schiff. (Hol-
 stein, Hamburg).
 428. *Cuc. umbratica* L.
 429. *Cuc. lactucae* Esp. (früher
 bei Hamburg).
 430. *Cuc. chamomillae* Schiff.
 431. *Cuc. artemisiae* Hfn.
 432. *Cuc. absinthii* L. (Hamburg,
 Holstein, Lauenburg).
 433. *Cuc. argentea* Hfn. (Lauen-
 burg, Holstein).
 434. *Anarta myrtilli* L.
 435. *An. cordigera* Thnb. (Lauen-
 burg, Lübeck).
 436. *Heliaca tenebrata* Sc.
 437. *Heliothis dipsacea* L.
 438. *Hel. maritima* Grasl. subsp.
septentrionalis Hoffmeyer.
 439. *Hel. scutosus* Schiff. (Ham-
 burg 1879, 1907, Zuwande-
 rer).
 440. *Hel. armigera* Hb. (Ham-
 burg, Zuwanderer).
 441. *Pyrrhia umbra* Hfn.
 442. *Thalpochares pannonica*
 Frr. (Lübeck 1916, einge-
 schleppt).

443. *Thalp. paula* Hb. (Lauenburg, Hamburg, Holstein).
 444. *Erastria uncula* Cl.
 445. *Er. venustula* Hb. (Hamburg).
 446. *Er. pusilla* View.
 447. *Er. deceptoria* Sc. (Hamburg, Lauenburg, Holstein).
 448. *Er. fasciana* L.
 449. *Rivula sericealis* Sc.
 450. *Prothymnia viridaria* Cl.
 451. *Emmelia trabealis* Sc. (noch nicht in Schleswig gefang.).
 452. *Scoliopteryx libatrix* L.
 453. *Abrostola triplasia* L.
 454. *Abr. tripartita* Hfn.
 455. *Plusia moneta* F.
 456. *Pl. variabilis* Piller (Irrgast).
 457. *Pl. chrysitis* L.
 458. *Pl. festucae* L.
 459. *Pl. pulchrina* Hw.
 460. *Pl. jota* L.
 461. *Pl. gamma* L.
 462. *Pl. interrogationis* L. (Holstein).
 463. *Euclidia mi* L.
 464. *Euclidia glyphica* L.
 465. *Pseudophia lunaris* Schiff. (Lauenburg, Mittel-Holstein).
 466. *Catephia alchymista* Schiff. (Lauenburg, Holstein, Lübeck).
 467. *Catocala fraxini* L.
 468. *Cat. nupta* L.
 469. *Cat. sponsa* L.
 470. *Cat. promissa* Esp.
 471. *Cat. pacta* L. (früher in Mittel-Holstein, Raupen häufig).
 472. *Cat. fulminea* Sc. (Flensburg 1904, eingeschleppt).
 473. *Toxocampa pastinum* Tr..
 474. *Laspeyria flexula* Schiff.
 475. *Parascotia fuliginaria* L.
 476. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr.
 477. *Zancl. grisealis* Hb.
 478. *Zancl. tarsicristalis* H. S. (Hamburg, ? verschleppt).
 479. *Zancl. emortualis* Schiff.
 480. *Madopa salicalis* Schiff. (Hamburg).
 481. *Herminia cribrumalis* Hb. (noch nicht in Schleswig gefangen).
 482. *Herm. tentacularia* L.
 483. *Pechipogon barbalis* Cl.
 484. *Bomolocha fontis* Thnbg.
 485. *Hypena proboscidalis* L.
 486. *Hyp. rostralis* L.
 487. *Hypaenodes taenialis* Hb.
 488. *Hyp. costaestrigalis* Sph. (Rendsburg).
 489. *Tholomiges turfosalis* Wocke.

**Beitrag zur Kenntnis der alpinen Formen von
Lycaeides idas L. (= *argyrognomon auct. nec Bergstr.*)
 (Lepidoptera, Lycaenidae).**

Von *Henry Beuret*, Neuwelt (Schweiz).
 (Fortsetzung.)

Auf der französischen Seite gehören, wie erwähnt, Stücke vom Col du Lautaret, Col de Larche noch zu *calliopes*, wenn auch die dortigen Populationen mitunter etwas hellere Stücke aufweisen. Je mehr man sich aber von der italienischen Einflußzone entfernt, desto häufiger treten in den *calliopes*-Populationen hellere Stücke

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Warnecke Georg Heinrich Gerhard

Artikel/Article: [Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark. \(Schleswig-Holsteins, Lübecks und Lauenburg, einschließlich der nordelbischen Gebietsteile Hamburgs\). Als Vorläufer zu einer Fauna der Großschmetterlinge der Nordmark. \(Fortsetzung.\) 203-205](#)