

Punkte. Der Ausschnitt über dem Schildchen ist ebenso flach, wie bei *labecula*. Das Schildchen ist unpunktiert und an der stumpfen Spitze mit einem kleinen gelben Pünktchen geschmückt. Die Skulptur der Flügeldecken und Anordnung der Tomentflecken ist dieselbe wie bei *labecula*. Auch das Pygidium ist das gleiche. Der Brustfortsatz ist ebenfalls, wie bei *labecula*, nach vorn nur wenig erweitert, länger als breit. Unterschiedlich bei der Salejerrasse ist auch hier wieder, wie schon bei *celebensis* und *regalis*, die Tomentierung der Brust und des Abdomens. Während *labecula* auf der glänzend schwarzen Unterseite größtenteils mit dichtem, orangefarbenem Toment bedeckt ist, findet sich dieses bei der *nigroviridana* nur als kleiner Fleck an der Seite der Mittelbrust und als spärlicher seitlicher Hinterrandsaum der Abdominalsegmente, mit Ausnahme der beiden letzten, die ganz ohne Toment sind. Die Beine sind ebenfalls schwarz wie bei *labecula* und tragen gelbe Kniemakel. 17 mm. Typus: *Coll. KALIS*. Cotypen: *Coll. mea*.

Glycyphana saleyeri Rits.

Sie ist der *G. cuculus* Burm. und *G. Möllendorfi* Flach ähnlich. Vgl. Rits. Not. Leyden Mus. 1884 p. 3.

Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark

(Schleswig-Holsteins, Lübecks und Lauenburg, einschließlich der nordelbischen Gebietsteile Hamburgs).

Als Vorläufer zu einer Fauna
der Großschmetterlinge der Nordmark.

Von G. Warnecke, Kiel.

(Fortsetzung.)

- | | |
|--|---|
| 490. <i>Habrosyne derasa</i> L. | 495. <i>Cym. duplaris</i> L. |
| 491. <i>Thyatira batis</i> L. | 496. <i>Polyplocia diluta</i> F. subsp. |
| 492. <i>Cymatophora or</i> F. | <i>hartwiegi</i> Reißer. |
| 493. <i>Cym. octogesima</i> Hb. (Hamburg). | 497. <i>Pol. flavicornis</i> L. |
| | 498. <i>Pol. ridens</i> F. |
| 494. <i>Cym. fluctuosa</i> Hb. (Lauenburg, Hamburg, Lübeck). | 499. <i>Brephos parthenias</i> L. |
| | 500. <i>Br. nothum</i> Hb. |

Geometridae.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 501. <i>Pseudoterpna pruinata</i> Hfn. | 505. <i>Thalera fimbrialis</i> Sc. |
| 502. <i>Geometra papilionaria</i> L. | 506. <i>Th. putata</i> L. |
| 503. <i>Euchloris pustulata</i> Hfn. | 507. <i>Th. lactearia</i> L. |
| 504. <i>Nemoria viridata</i> L. | 508. <i>Hemithea strigata</i> Müll. |

509. *Acidalia similata* Thnbg.
 510. *Ac. muricata* Hfn.
 511. *Ac. dimidiata* Hfn.
 512. *Ac. virgularia* Hb.
 513. *Ac. pallidata* Bkh. (Hamburg, Lübeck).
 514. *Ac. straminata* Tr.
 515. *Ac. bisetata* Hfn.
 516. *Ac. interjectaria* B.
 517. *Ac. humiliata* Hfn. (Lübeck sicher!).
 518. *Ac. inornata* Hw. (Hamburg, Holstein).
 519. *Ac. aversata* L.
 520. *Ac. emarginata* L.
 521. *Ac. immorata* L.
 522. *Ac. rubiginata* Hfn.
 523. *Ac. fumata* Stph.
 524. *Ac. remutaria* Hb.
 525. *Ac. nemoraria* Hb. (Sachsenwald, früher).
 526. *Ac. immutata* L.
 527. *Ac. strigilaria* Hb.
 528. *Ac. ornata* Sc.
 529. *Ac. violata* Thnbg. subsp. *decorata* Hb. (Sachsenwald, früher).
 530. *Ac. emutaria* Hb. (Sylt).
 531. *Ephyra pendularia* Cl.
 532. *Eph. annulata* Schulze (Ostholstein).
 533. *Eph. porata* F. (noch nicht in Schleswig).
 534. *Eph. quercimontaria* Bast. (noch nicht in Schleswig).
 535. *Eph. punctaria* L.
 536. *Eph. linearia* Hb.
 537. *Rhodostrophia vibicaria* Cl.
 538. *Timandra amata* L.
 539. *Lythria purpurata* L.
 540. *Lythr. purpuraria* L. (Lauenburg).
 541. *Ortholitha coarctata* F. (Hamburg, Sylt, Angeln).
 542. *Orth. plumbaria* F.
 543. *Orth. cervinata* Schiff. (Lauenburg, östl. Holstein).
 544. *Orth. limitata* Sc.
 545. *Orth. moeniata* Sc.
 546. *Mesotype virgata* Rott. (bevorzugt die Küsten).
 547. *Odezia atrata* L. (Lauenburg, Lübecker Bucht, Flensburg).
 548. *Lithostege farinata* Hfn. (Hamburg, Lübeck).
 549. *Anaitis efformata* Gn.
 550. *An. paludata* Thnbg. subsp. *imbutata* Hb. (Flensburg).
 551. *Chesias spartiata* Fuessl.
 552. *Ches. rufata* F.
 553. *Lobophora sertata* Hb.
 554. *Lob. carpinata* Bkh.
 555. *Lob. halterata* Hfn.
 556. *Lob. sexualisata* Hb.
 557. *Lob. viretata* Hb.
 558. *Cheimatobia boreata* Hb.
 559. *Cheim. brumata* L.
 560. *Triphosa dubitata* L.
 561. *Eucosmia certata* Hb.
 562. *Euc. undulata* L.
 563. *Scotosia vetulata* Schiff.
 564. *Scot. rhamnata* Schiff.
 565. *Lygris reticulata* Thnbg.
 566. *L. prunata* L.
 567. *L. testata* L.
 568. *L. populata* L.
 569. *L. associata* Bkh.
 570. *Larentia dotata* L.
 571. *Lar. fulvata* Forst.
 572. *Lar. ocellata* L.
 573. *Lar. bicolorata* Hfn.
 574. *Lar. variata* Schiff.
 575. *Lar. obeliscata* Hb.
 576. *Lar. juniperata* L.
 577. *Lar. siterata* Hfn.
 578. *Lar. miata* Hb. (Lübeck, Sylt).
 579. *Lar. truncata* Hfn.
 580. *Lar. immanata* Hw.
 581. *Lar. firmata* Hb. (noch nicht in Schleswig).
 582. *Lar. olivata* Bkh. (in den östlichen Gebietsteilen).
 583. *Lar. viridaria* F.
 584. *Lar. fluctuata* L.

585. *Lar. didymata* L.
 586. *Lar. vespertaria* Bkh.
 587. *Lar. montanata* Schiff.
 588. *Lar. suffumata* Hb.
 589. *Lar. quadrifasciaria* Cl.
 590. *Lar. spadicearia* Bkh.
 591. *Lar. ferrugata* Cl.
 592. *Lar. pomoeriaria* Ev.
 593. *Lar. designata* Rott.
 594. *Lar. vittata* Bkh.
 595. *Lar. dilutata* Bkh.
 596. *Lar. autumnata* Bkh.
 597. *Lar. christyi* Prout.
 598. *Lar. cucullata* Hfn. (noch nicht in Schleswig).
 599. *Lar. galiata* Hb. (Hamburg, früher einmal).
 600. *Lar. rivata* Hb.
 601. *Lar. sociata* Bkh.
 602. *Lar. unangulata* Hw.
 603. *Lar. picata* Hb.
 604. *Lar. albicillata* L.
 605. *Lar. lugubrata* Stgr. (Lauenburg).
 606. *Lar. hastata* L.
 607. *Lar. tristata* L.
 608. *Lar. affinitata* Stph.
 609. *Lar. alchemillata* L.
 610. *Lar. adaequata* Bkh. (Hamburg, Sachsenwald, Glücksburg).
 611. *Lar. albulata* Schiff.
 612. *Lar. testacea* Don.
 613. *Lar. oblitterata* Hfn.
 614. *Lar. luteata* Schiff.
 615. *Lar. flavofasciata* Thnbg.
 616. *Lar. bilineata* L.
 617. *Lar. sordidata* F.
 618. *Lar. autumnalis* Ström.
 619. *Lar. ruberata* Frr. (Schleswig).
 620. *Lar. capitata* H. S.
 621. *Lar. silacea* Hb.
 622. *Lar. corylata* Thnbg.
 623. *Lar. badiata* Hb.
 624. *Lar. berberata* Schiff. (Hamburg).
 625. *Lar. nigrofasciaria* Goeze.
 626. *Lar. rubidata* F.
 627. *Lar. comitata* L.
 628. *Lar. sagittata* F. (früher im Sachsenwald).
 629. *Asthena candidata* Schiff.
 630. *Tephroclystia oblongata* Thnbg.
 631. *T. linariata* F.
 632. *T. irriguata* Hb.
 633. *T. pusillata* F.
 634. *T. indigata* Hb.
 635. *T. abietaria* Goeze.
 636. *T. togata* Hb.
 637. *T. venosata* F.
 638. *T. pimpinellata* Hb.
 639. *T. distinctaria* H. S. (Lauenburg).
 640. *T. assimidata* Gn. (Holstein).
 641. *T. asinthiata* Cl.
 642. *T. goossensata* Mab.
 643. *T. denotata* Hb. (Holstein).
 644. *T. actaeata* Wald. (holstein. Seenplatte).
 645. *T. albipunctata* Hw.
 646. *T. vulgata* Hw.
 647. *T. trisignaria* H. S.
 648. *T. lariciata* Frr.
 649. *T. castigata* Hb.
 650. *T. subnotata* Hb.
 651. *T. helveticaria* B. subsp. *arceuthata* Frr.
 652. *T. satyrata* Hb.
 653. *T. succenturiata* L.
 654. *T. subfulvata* Hw.
 655. *T. scabiosata* Bkh.
 656. *T. plumbeolata* Hw.
 657. *T. isogrammaria* H. S.
 658. *T. valerianata* Hb. (Lauenburg, Holstein, Lübeck).
 659. *T. pygmaeata* Hb.
 660. *T. tenuiata* Hb.
 661. *T. nanata* Hb.
 662. *T. hyperboreata* Stgr. (Lauenburg, bisher nur Raupen).
 663. *T. innotata* Hfn.
 664. *T. abbreviata* Stph.
 665. *T. dodoneata* Gn. (Lauenburg, Hamburg, Kiel).

666. *T. exigua* Hb.
 667. *T. lanceata* Hb.
 668. *T. sobrinata* Hb. (noch nicht in Schleswig).
 669. *T. pumilata* Hb.
 670. *Chloroclystis rectangulata* L.
 671. *Chlor. debiliata* Hb.
 672. *Chlor. chloerata* Maß. (Kiel).
 673. *Collix sparsata* Tr.
 674. *Phibalapteryx polygrammata* Bkh. (Flensburg, Neumünster).
 675. *Phib. aquata* Hb. (Hamburg, Lübecker Bucht).
 676. *Arichanna melanaria* L. (Lauenburg, Ostholstein).
 677. *Abraxas grossulariata* L.
 678. *Abr. sylvata* Sc.
 679. *Abr. marginata* L.
 680. *Abr. adustata* Schiff.
 681. *Bapta pictaria* Curt. (Lübeck, einmal).
 682. *Bapta bimaculata* F.
 683. *B. temerata* Hb.
 684. *Deilinia pusaria* L.
 685. *Deil. exanthemata* Sc.
 686. *Numeria pulveraria* L.
 687. *Ellopija prosapiaria* L.
 688. *Metrocampa margaritata* L.
 689. *Ennomos autumnaria* Wernb.
 690. *En. quercinaria* Hfn.
 691. *En. alniaria* L.
 692. *En. fuscantaria* Hw.
 693. *En. erosaria* Hb.
 694. *Selenia bilunaria* Esp.
 695. *Sel. lunaria* Schiff.
 696. *Sel. tetralunaria* Hfn.
 697. *Hygrochroa syringaria* L.
 698. *Gonodontis bidentata* Cl.
 699. *Himera pennaria* L.
 700. *Crocallis elinguaris* L.
 701. *Angerona prunaria* L.
 702. *Urapteryx sambucaria* L.
 703. *Eurymene dolabraria* L.
 704. *Opisthograptis luteolata* L.
 705. *Epione apiciaria* Schiff.
 706. *Ep. parallelaria* Schiff.
 707. *Ep. advenaria* Hb.
 708. *Venilia macularia* L.
 709. *Semiothisa notata* L.
 710. *Sem. alternaria* Hb.
 711. *Sem. signaria* Hb.
 712. *Sem. liturata* Cl.
 713. *Hibernia rupicapraris* Hb.
 714. *Hib. leucophaearia* Schiff.
 715. *Hib. aurantiaria* Esp.
 716. *Hib. marginaria* Bkh.
 717. *Hib. defoliaria* Cl.
 718. *Anisopteryx aceraria* Schiff. (Lauenburg, Hamburg, Lübeck).
 719. *An. aescularia* Schiff.
 720. *Phigalia pedaria* F.
 721. *Biston hispidarius* F.
 722. *B. zonarius* Schiff.
 723. *B. hirtarius* Cl.
 724. *B. stratarsius* Hfn.
 725. *B. pomonarius* Hb. (Hamburg, 1932, 1 Stück, wohl eingeschleppt).
 726. *Amphidasys betularius* L.
 (Fortsetzung folgt.)

»Mangelnde Literaturkenntnis.«

In Nr. 21 der »Entomologischen Rundschau« vom 1. 6. 39, Jahrgang 56, wird auf Seite 231 ein Nachlaßartikel von PETRY zitiert.

Da unterlassen wurde, meine Antwort auf diesen Artikel anzuführen, gestatte ich mir, alle diejenigen, denen es auf eine gerechte Urteilsbildung ankommt, darauf aufmerksam zu machen, daß meine Erwiderung in Int. Ent. Z. Guben, 28. Jahrg., 1934/35, S. 573 ff. erschienen ist.

Sonderdrucke stehen allen Interessenten gerne zur Verfügung.

Dr. V. Schultz, Müssen, Post Lage (Lippe).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Warnecke Georg Heinrich Gerhard

Artikel/Article: [Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark \(Schleswig-Holsteins, Lübecks und Lauenburg, einschließlich der nordelbischen Gebietsteile Hamburgs\). Als Vorläufer zu einer Fauna der Großschmetterlinge der Nordmark. \(Fortsetzung.\) 277-280](#)