

- Attica, Thessalien *Helleri* Reitt.
 11' Halsschild sehr fein und dicht punktiert usw. Long. 3 bis 3,5 mm.
- Griechenland, Kreta, Ägypten *indutus* Kiesw.
 c' Körper länglich oval, *Barypithes*-ähnlich usw.
 1'' Halsschild undeutlich oder schwach quer usw.
 2'' Oberseite mit feiner, anliegender Grundbehaarung.
 3'' Kopf und Halsschild fein und gedrängt, gleichartig punktiert . . . Oberseite dicht, gelblich behaart . . . Augen beim ♀ kaum, beim ♂ wenig vorstehend . . . Schenkel des ♂ stärker verdickt usw. Long. 3,5 mm.
- Griechenland *Krüperi* Strl.
 3' Kopf feiner als der Thorax punktiert, Stirne zwischen den Augen mit kräftigen Punktgrübchen usw. Long. 2,8—3 mm.
- Algier: Bône *subplumbeus* Desbr..
 2' Oberseite kahl erscheinend oder mit rauher, spärlicher, längerer, vom Körper abgeneigter Behaarung.
 4''' Körper kahl, schwarz usw. Halsschild kugelig, gedrängt grob punktiert, mit scharf gerandeter Basis. Long. 2,6 mm.
- Griechenland: Parnass *Oertzeni* Stierl.
 4''' Körper mit rauher, schütterer, längerer, vom Körper abgeneigter Behaarung; Halsschild länglich, gewölbt, Basis nicht gerandet, mit angedeutetem Mittellängskiele; Flügeldecken länger oval. Long. 3 mm.
- Morea: Chelmos *chelmosensis* n. sp.
 4'' Körper größer mit Erzschein; Halsschild breiter, ohne Spur eines Mittellängskieles. Long. 3,5 mm.
- Morea: Chelmos *similis* n. sp.
 4' Körper mit längerer, wenig dichter, greiser, nicht anliegender Behaarung usw. Long. 2—2,5 mm.
- Algier: St. Charles *Desbrochersi* Reitt.

2. Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Ostholsteins.

Von Dr. *Herbert Sick*, Eutin-Fissau.

(Fortsetzung.)

Drepanidae.

Unterfamilie: *Drepaniae.*

9. Gattung: *Drepana* Schrk.

194. *D. falcataria* L. ist im ganzen Gebiet wie in allen Nbf. h. † in 2 Gen.
195. *D. curvatula* Bkh. ist nicht so h. wie die vorige Art, fliegt aber ebenfalls in 2 Gen. im V.—VI. und VII.—VIII.

196. *D. lacertinaria* L. habe ich bislang nur s. s. in F. a. L. im August 1934 gefangen. In den Nbf. n. h.—h.
 197. *D. cultraria* F. ist in 2 Gen. h. und verbreitet in Buchenwäldern im V.—VI. und VIII. bis Anfang IX. In allen Nbf. h.

13. Gattung: *Cilix* Leach.

198. *C. glaucata* Scop. fliegt in 2 Gen. im V.—VI. und VII. bis VIII. h.—s. h. besonders in F. a. L. Nach A. bei Gbg. h. In den Nbf. z. h.—h.

Unterfamilie: *Cymatophorinae*.

3. Gattung: *Habrosyne* Hbn.

199. *H. derasa* L. ist im ganzen Gebiet, wie in den Nbf., am Köder und am Licht h.

4. Gattung: *Thyatira* Hbn.

200. *T. batis* L. ist im VII.—VIII. am Licht und am Köder h. wie die vorige Art.

6. Gattung: *Palimpsestis* Hbn.

201. *P. duplaris* L. ist im ganzen Gebiet meist n. s. im VI.—VII. wie in den Nbf.

202. *P. or* F. ist die häufigste Art dieser Gattung und fliegt gern ans Licht im VI. bis Anfang VIII.

9. Gattung: *Polyplocia* Hbn.

203. *P. diluta* F. fing SEMPER 1 Ex. bei Niendorf am Köder. Ich fing bislang 2 Ex. im September am Licht. In den Nbf. s.—n. h.

- *204. *P. flavicornis* L. fing ich bislang nur 2 Ex. im III. 1931 im Sibbersdorfer Moor. In den Nbf. n. s.—h.

Geometridae.

I. Unterfamilie: *Brephinae*.

1. Gattung: *Brephos* Zinck.

205. *B. parthenias* L. fing DAHL s. Ich fand den Falter einige Male in den Birkenbeständen des Kasseedorfers Gehege im IV. In den Nbf. n. s.

II. Unterfamilie: *Oenochrominae*.

1. Gattung: *Alsophila* Hbn.

206. *A. aescularia* Schiff. ist überall im Gebiet verbr. und h. wie auch in den Nbf. Diese Art ist sicher von den früheren Sammlern übersehen worden und nur von DAHL z. h. gefangen.

III. Unterfamilie: *Hemitheinae*.7. Gattung: *Pseudoterpna* Hbn.

207. *P. pruvinata* Hufn. fing ich selten am Ochsenhals und im Kasseedorfer Gehege im VII.—VIII. In den Nbf. n. s.—h.

13. Gattung: *Hipparchus* Leach.

208. *H. papilionaria* L. ist im ganzen Gebiet verbr. und z. h. Ich fing die Art h. in F. a. L. In den Nbf. z. s.—z. h.

18. Gattung: *Comibaena* Hbn.

- *209. *C. pustulata* Hufn. ist in ganz Schleswig-Holstein s. s. 1936 fing ich in F. a. L. am 11. VII. 5 Ex. und Dr. FRITZ SICK in Schwartau am Licht am 12. VII. 4 Ex.

22. Gattung: *Hemithea* Dup.

- *210. *H. aestivaria* Hbn. ist von mir besonders in F. a. L. oft in z. g. Anzahl im VI. und VIII. gefangen. Ist wohl bisher nur übersehen. Bei Lü. und Gbg. verbr. und n. s., fehlt bei Kiel?

34. Gattung: *Iodis* Hbn.

211. *I. putata* L. ist verbr. und n. s. im V.—VI. im ganzen Gebiet wie in den Nbf.

IV. Unterfamilie: *Acidaliinae*.12. Gattung: *Acidalia* Tr.

- *212. *A. ternata* Schrank ist s. von mir im VI. im Kasseedorfer Gehege gefangen. In den Nbf. n. s.—z. h.

213. *A. rubiginata* Hufn. ist bislang nur von SEMPER im VIII. bei Niendorf gefunden. Ich fing in F. a. L. am 1. VIII. 36 und Pönitz a. L. am 8. VIII. 37 je 1 Ex. In allen Nbf. n. s.—z. h.

- *214. *A. floslactata* Haw. fing ich wenige Ex. im Sibbersdorfer Moor im V.—VI., sonst noch nicht beobachtet. Lü. h., Hbg. n. h.

215. *A. nigropunctata* Hufn. Wurde schon von DAHL bei Eutin und von SEMPER bei Niendorf gefangen. Ich fing bislang nur 1 Ex. am 14. VII. 37 in F. a. L. Lü. s., Hbg. z. s.

216. *A. ornata* Scop. ist in Ostholstein bei weitem nicht so h. wie etwa bei Lü. und Hbg. Nach DAHL s. bei E., SEMPER fand die Art bei Niendorf, HASEBROEK bei E., ALBERS bei Gbg. am 9. VIII. 17 und 4. VIII. 21 je 1 Ex. und ich F. a. L. einzeln.

20. Gattung: *Ptychopoda* Curt.

- *217. *P. muricata* Hufn. fing ich am 25. VII. 34. 1 Ex. am Ochsenhals Lü. und Hbg. n. s.—h., k. einzeln.

218. *P. dimidiata* Hufn. ist n. s. im VII. in F. a. L. und in Wäldern.

219. *P. seriata* Schrk. fing ich von VI.—VIII. in F. a. L. und am Köder z. h.

220. *P. biselata* Hufn. ist vom VII.—VIII. h. wie in allen Nbf.

*221. *P. emarginata* L. fing ich in F. a. L. n. s., ebenfalls im Prinzenholz und auf dem Sandfeld. In den Nbf. verbr., aber n. h.

23. Gattung: *Cosymbia* Hbn.

222. *C. pendularia* Cl. Die Arten dieser Gattung sind nur von SEMPER in Ostholstein häufiger gefangen; *pendularia* fing ich vereinzelt in F. a. L. Bei Lü. und Hbg. h.

223. *C. porata* L. fing ich s. in F. a. L., ist auch in den Nbf. seltener als *pendularia*.

224. *C. punctaria* L. ist häufiger als die vorige und auch von A. bei Gbg. im V.—VII. gefangen. Bei Lü. z. h., Hbg. n. s., K. s. s.

225. *C. linearia* Hbn. ist nach den bisherigen Beobachtungen die häufigste Art und wurde von mir im Kasseedorfer Gehege, Sandfeldgehege und in F. a. L. gefangen von V.—VII. In den Nbf. z. h.—h.

V. Unterfamilie: *Larentiinae*.

6. Gattung: *Ortholitha* Hbn.

226. *O. mucronata* Scop. fing ich besonders im Kasseedorfer Gehege im VII.—VIII. n. s. In den Nbf. n. s.—z. h.

227. *O. chenopodiata* L. ist im ganzen Gebiet verbr. und n. s. wie auch in den Nbf.

19. Gattung: *Anaitis* Dup.

228. *A. efformata* Guen. fand die Art bei Gbg. und ich im Kasseedorfer Gehege nur s. In den Nbf. z. s.—z. h.

21. Gattung: *Chesias* Tr.

*229. *C. legatella* Schiff. A. fand nur 1 Ex. bei Gbg. Ich fand die Art alljährlich in großer Anzahl an den Sarothamnusbeständen des Kasseedorfer Geheges, des Prinzenholzes und bei Schürsdorf von Ende IX.—XI. In den Nbf. n. s.—h.

23. Gattung: *Acasis* Dup.

230. *A. viretata* Hbn. fand A. am 23. VI. 30. 1 Ex. bei Gbg. und ich am 26. V. 34 1 Ex. in F. a. L. Auch von DAHL nur s. gefangen in den Nbf. s. —n. s.

25. Gattung: *Nothopteryx* Prout.

*231. *N. carpinata* Bkh. fand ich mit *Taeniocampa*-Arten zusammen s. an Weidenkätzchen. In allen Nbf. meist z. s.

27. Gattung: *Mysticoptera* Meyr.

232. *N. sexalata* Retz. Wurde s. von DAHL bei E. gefangen. A. fand 1 Ex. am 8. VI. 24 bei Gbg. und ich in F. a. L. am 2. VII. 37 1 Ex. und 7. VII. 37 2 Ex., Lü. einzeln, Hbg. s. s.

43. Gattung: *Operophtera* Hbn.

- *233. *O. boreata* Hbn. ist im Gegensatz zu *brumata* L. s. Ich fand nur wenige Ex. im X.—XI. in F. a. L. In den Nbf. n. h.

44. Gattung: *Oporinia* Hbn.

234. *O. dilutata* Schiff. Diese und die folgende Art lassen sich sicher nur durch Untersuchungen der Genitalorgane unterscheiden. Wie in den Nbf. sind beide Arten h.—s. h.
235. *O. christyi* Prt. siehe vorige Art.

46. Gattung: *Calocalpe* Hbn.

236. *C. undulata* L. fing SEMPER einzeln bei Niendorf, A. s. bei Gbg. und ich in F. a. L. am 11. VII. 36, 7. VII. 37 und 14. VII. 37 je 1 Ex. In den Nbf. n. h.—n. s.

49. Gattung: *Philereme* Hbn.

237. *Ph. vetulata* Schiff. fand SEMPER einzeln bei Niendorf und ich im ganzen Gebiet z. s., so im Kasseedorfer Gehege, Prinzenholz und bei Pönitz gefangen. Lü. und Hbg. meist s.
238. *Ph. transversata* Hufn. wurde schon von DAHL und SEMPER gefunden. Von dieser Art, die bei Lü. noch nicht festgestellt ist, fing ich am 6. VII. 36 und 24. VII. 37 je 1 Ex. in F. a. L. Hbg. s., K. n. s.

53. Gattung: *Eustroma* Hbn.

239. *E. reticulata* Schiff. ist von DAHL schon bei E. gefangen. A. fand am 19. VII. 18, 24. VII. 21 und 17. VII. 28 bei Gbg. und ich am 1. VIII. 34 in F. a. L. je 1 Ex. In den Nbf. meist s.

57. Gattung: *Lygris* Hbn.

240. *L. testata* L. schon von DAHL gefangen. A. und ich fanden die Art bei Gbg. und F. n. s. In den Nbf. meist n. h.
241. *L. populata* L. ist bei E. n. s.—z. h. von Ende VII.—VIII. in F. a. L. In den Nbf. n. s.

59. Gattung: *Cidaria* Tr.

242. *C. fulvata* Forst. ist, wie in den Nbf., im ganzen Gebiet verbr. und. n. s.
243. *C. ocellata* L. überall verbreitet und besonders in F. a. L. z. h. im VII.—VIII. In allen Nbf. n. s.—z. h.
244. *C. bicolorata* Hufn. ist im VII.—VIII. in F. a. L. n. s. In den Nbf. n. s.—z. h.
245. *C. variata* Schiff. ist alljährlich im ganzen Gebiet z. h., wie auch in den Nbf. Lü. und Hbg., K. s.
246. *C. truncata* Hufn. ist im ganzen Gebiet verbr. und n. s. wohl in 2 Gen. im VI. und von VIII.—IX. Hbg. s. Lü. und K. n. s.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Sick Herbert

Artikel/Article: [2. Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Ostholsteins. \(Fortsetzung.\) 346-350](#)