

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.

Central-Organ des
Entomologischen
Internationalen
Vereins.

Herausgegeben

unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint monatlich zwei Mal. Insertionspreis pro dreigespaltene Petit-Zeile oder deren Raum 25 Pf. — Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vereinsjahre 100 Zeilen Inserate frei.

Inhalt: Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. Fortsetzng. — Massenhaftes Auftreten von Insekten. — Ueber *Zygaena* var. *peucedani*. — Kleine Mittheilungen. — Neue Mitglieder.

— Jeder Nachdruck ohne Erlaubniss ist untersagt. —

Beiträge zur Lepidopteren-Fauna

der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Von *Adalbert von Viertl* in Fünfkirchen, Ungarn.
(Fortsetzung.)

Nemobius lucina L. I. F. 13/4.—29/5., II. F. 16/7.—31/7. Bd. Br. F. M.

Libythea celtis Esp. F. ab 5/6. M. Hauptflug war um den 20/6. 1876.

△ *Apatura iris* L. F. 5/7.—3/8. Br. F. ilia Schiff: F. 25/6.—21/7. Br. F. S. Um Solotwina in den Karpathen (Galizien) F. 13/8. 1868.

v. clytie Schiff Br. S. F.

Limenitis populi L. F. 15/5.—14/7. Br. M.

ab. ♂ tremulae Esp. Br. M.

camilla Schiff. R. 17/6.—15/7., F. 18/6.—29/9. F.

sibilla L. F. 31/5.—14/7. M. Im Badeorte Harkany bei Sziklos 13/6 1877 schon def.

lucilla F. F. 6/7.—19/7. M. In den Karpathen an der Pleiska-, Turbat- und Tissa-Klause, bei Körösmező und Delatin 17., 18. und 19./7. 1868.

Neptis aceris Lepech. I. F. 21/4.—15/6., R. noch 23/7. und mitunter klein, II. F. 12/7.—20/8. Br. F. M. S.

Vanessa levana L. I. F. 17/3.—19/4., R. 5., II. F. 25/6.—13/8., R. bis 1/10. By. F. T.

v. II. prorsa L. By. F. T.

△ c-album L. I. F. 27/2.—6/5., R. 2/6., II. F. 24/6.—16/7., R. 16/9 und noch 4/10., III. F. 3/10.—28/11. Ü.

polychoros L. R. bis 18/5., F. ab 2/6. Ü.

xanthomelas Esp. R. bis 5., F. ab 3/6. Br. M.

△ l-album Esp. F. ab 22/6. Bd. Br. F. M.

△ urticae L. R. bis 28/5., F. ab 12/6. Ü.

v. polaris Stdgr. T.

△ io L. R. bis 31/5, F. ab 20/6. Ü.

△ antiopa L. R. 24/6.—12/7., F. ab 22/6. Ü.

△ atalanta L. I. F. 20/5.—15/6., R. 6, II. F. ab 14/7.,

R. 20/9.—1/10., III. F. 2/10.—28/10. Ü.

cardui L. I. F. 20/5.—15/6., R. 10/6.—8/7., II. 14/7., R. 28/8 und ob III. ? F. 2/10. Bd. Br. By. F. T. Die Raupe hier häufig an Echinops sphaerocephalum.

Melitaea maturna L. R. bis 5, F. 25/5.—1/7. Br. M. S.

aurinia Rott. F. 17/6. S.

cinxia L. R. bis 8/5. F. 24/4.—26/6. Bd. Br. By. F. M.

phoebe Knoch. I. R. bis 16/5. F. 19/5.—11/7., II. R. 5/7.—5/8., F. 16/7.—28/8. Bd. Br. By. F. M.

trivia Schiff. I. R. bis 9/6., F. 28/5.—21/6., II. R. 15/7.—2/8., F. 29/7.—21/8. F.

didyma O. I. R. 21/5.—24/6., F. 11/6.—16/7., II. R. 18/6.—24/7., F. 11/7.—21/8. und noch 19/9. 1874. Bd. Br. By. F. M.

v. alpina Stdgr. M.

dictynna Esp. F. 6. By. auch um Tinischt in Böhmen 25/6. 1866.

athalia Rott. R. bis 28/5., F. 26/4.—14/7. Ü. 27/8. 1895 noch ♀ e. l. gefangen.

ab. navarina Selys-L. M. 2 und S. 1 Stück gefangen.

aurelia Nick. F. 6.—7/7. F.

v. britomartis Assm. F. 12/6.—19/6. M. S.

parthenie Bkh. F. 7 Bd. Br.

Argynnis selene Schiff. I. F. 26/5.—15/6., II. F. ab 26/7. Br. By. F. S.

cuphrosyne L. I. F. 24/4.—2/6., II. F. ab 31/7. Ü.

pales v. arsilache Esp. By.

dia L. I. F. 23/3.—2/6., II. F. 25/6.—26/8. Bd. Br. By. F. S. In Szigethvár noch 19/9. 1866 e. l.

daphne Schiff. R. bis 5., F. 31/5.—3/7. def. F. M.

ino Esp. F. 17/7. 1868 am Berge Sewula und an der Pleiska-Klause in den Karpathen.

hecate Esp. F. 18/6.—1/7. def. F.
 lathonia L. I. F. 2/4.—24/6., II. F. 16/7. ab Ü.
 aglaja L. F. 6/6.—5/8. Bd. Br. By. F. S.
 niobe L. F. 16/6.—1/7. Bd. Br. By.
 ab. eris Meig. Bd. Br. By. auch um Solotwina in den
 Karpathen 13/7. 1868.
 adippe L. F. 12/5. und ♀♀ noch bis 19/9. Ü.
 ab. cleodoxa O. Ü.
 laodice Pall. F. 6 und 7 Winiki bei Lemberg.
 paphia L. F. 18/6. und ♀♀ noch 19/9. Bd. Br. By.
 F. M. S.
 ab. ♀ valesina Esp. F.
 pandora Schiff. F. ab 4/6. und def. noch 30/10. be-
 obachtet. F. M.

Melanargia galathea L. R. bis 6, F. 8/6.—28/7. Ü
 ab. ♀ leucomelas Esp. Bd. By. F. M. S.
 ab. galene O. 14/7. 1887 ein Stück gefangen. F.
 v. procida Hbst. M. und Orsowa sehr dunkle Exemplare.
 ab? Der schwarze Aussenrand auf der Oberseite der
 Hinterflügel ist sehr breit, ohne weisse Punkte und
 Dreiecke, d. i. einfach schwarz. 7/7. 1882.

Erebia melampus Fuessl. F. 18/7. 1868 def. Tissa-
 Klause in den Karpathen.
 medusa F. F. 16/5.—3/6. Br. By. M. S.
 v. psodea Hb. M. am Berge Domuglet, Hunka-ka-
 mena etc.
 v. hypomedusa O. Br.
 melas Hbst. F. 17/7.—25/7. M. am Berge Domuglet.
 lappona Esp. F. 19/7. schon def. M. am Berge
 Vurwu-zlywur.

tyndarus Esp. F. 19/7. schon def. M. am Berge
 Vurwu-zlywur.

aethiops Esp. F. 15/6.—2/8. Br. M. auch um die
 Burgruine Trentschin a/Waag 17/8. 1866.

ligea L. F. 6/7.—15/7. M., ab. adyte Hb. M.,
 euryale Esp. F. 16/6.—18/7. M. Am ganzen Weg der
 Excursion über die Karpathen von Solotwina über Huta,
 Berg Sewula zur Bistra-, Pleiska-, Turbat- und Tissa-Klause
 nach Körösmőző und bis Delatin in Galizien 14/7.—19/7. 1868.

△ *Satyrus hermione* L. R. bis 6. F. 31/5.—21/8. und
 def. noch 16 9. Bd. Br. F. M. und auch um Orsowa.

alcyone Schiff. F. 1/7.—8/8. By.

△ *circe* F. R. bis 6, F. 18/6.—21/8. def. Bd. Br.
 F. M. auch um Orsowa.

briseis L. F. 7—8. Bd. Br. auch um Weisskirchen
 in Mähren am Hleisser Berg.

△ *semele* L. F. 12/6.—10/7. Ü.

△ *arethusa* Esp. R. bis 22/7., F. 22/7.—4/9. Br. F.

△ *dryas* Sc. R. bis 7., F. 16/7. 11/8. Bd. Br. By.
 F. auch um Budweis in Böhmen.

Pararge roxelana Cr. F. 13/6.—27/7. M. häufiger
 aber am Allion-Berge bei Orsowa.

clymene Esp. F. 19/6.—25/7. M. und häufig am
 Allion-Berge bei Orsowa, ist aber im Gestrüpp umher-
 fliegend gleich zerrissen und abgeflogen.

maera L. F. I. 27/4.—18/6., II. 20/7.—15/8. Br.
 By. F.

megaera L. F. I. 5/5.—3/6., II. 4/7.—22/9. Bd. Br.
 By. F. S. T.

aegeria v. egerides Stdgr. F. I. 23/3.—24/5., F. II.
 3/6.—5/8. Bd. Br. F. M. auch Dornbach bei Wien.

Epinephela lyacon Rott. F. 2/7.—3/8. Bd. Br. By.

janira L. R. bis 5. F. 12/5.—28/7. Ü.
 tithonus L. F. 15/7.—6/8. F. auch um Szigethvár.
 hyperanthus L. F. 15/6.—24/7. Ü.
Coenonympha leander Esp. F. 16/5.—15/6. doch ♂♂
 schon def. M. am Berge Domuglet.
 iphis Schiff. I. F. 16/5.—17/6., II. F. 31/7.—21/8. Ü.
 △ *arcania* L. F. 5/5.—1/7. Ü.
 pamphilus L. I. F. 26/4.—27/5., II. F. 18/6.—21/8. Ü.
 tiphon Rott. By.
Spilothyrus alceae Esp. I. F. 19/4.—20/5., II. F. ab
 7/7. Bd. Br. F. T. S.
 altheae Hb. F. 27/6.—1/8. By. F. S.
 lavatherae Esp. F. 3/6. M.
Syrichthus sidae Esp. Allion-Berg bei Orsowa.
 carthami H. F. 12/5.—11/6. Bd. Br. By. F. T.
 alveus Hb. F. 20/5. By.
 malvae L. I. F. 23/3.—18/6., II. F. ab 11/7. Ü.
 ab. taras Meig. F.
 orbifer Hb. F. 29/5.—3/7. F.
Nisoniades tages L. I. F. 5/4.—22/5., II. F. 7/7. Ü.
Hesperia thaumas Hufn. F. 18/6.—31/7. Bd. Br.
 By. F. S.
 lincola O. F. 11/6.—20/7. Bd. Br. By. F. S.
 acteon Esp. F. 20/6. M.
 sylvanus Esp. F. 7/6.—21/8. def. Bd. Br. By. F. S.
 comma L. F. 18/6.—31/7. Bd. Br. By. F. S.
Cyclopides morpheus Pall. F. 29/6.—29/7. def. F.
Carterocephalus palaemon Pall. F. 1/5.—28/5. M.

Heterocera.

A. Sphinges.

Acherontia atropos L. R. 21/6.—29 9., F. 19/7.—25 9.
 Br. By. F. S. 24/7. 1882 im Badeorte Harkany, mit heissen
 Schwefel-Thermen, auf einer als Zierpflanze exot. *Datura*.
 2 St. schwarze Raupen gefunden, aus welchen am 15/9.
 ganz normal gefärbte Falter schlüpfen.

Sphinx convolvuli L. F. 8/7.—28/8., R. 10/7.—2/10
 Bd. Br. F.

ligustri L. I. F. 29/4.—25/6., R. 17/6.—27/6., II. F. 7/7.—
 27/7., R. 11/8.—5/10. mitunter noch klein. Bd. Br. F.
 5/10. 1874. Die Raupen auch auf *Prunus domestica*
 gefunden und erzogen.

pinastri L. F. 20/5.—24/7., R. 14/9.—14/10. Bd.
 Br. By. F.

Deilephila euphorbiae L. I. F. 26/5.—18/6. ab, II.
 F. 18/6.—22/7., R. bis 2/10. Bd. Br. By. F. T.

celeio L. F. auf Petunien saugend in der Dämmerung
 1861 beobachtet. Wohl nur ein Zugvogel.

(Schluss folgt.)

Massenhaftes Auftreten von Insekten.

Im Mai dieses Jahres stellten sich in unserer Gegend
 unabsehbare Scharen von Kriebelmücken, hauptsächlich
Simulia reptans L., ein, welche den ganzen Juni hindurch
 nicht wieder verschwanden. Ihnen gesellten sich Stech-
 mücken bei, so dass bald von einer Landplage geredet
 werden konnte. Ueberall wurde man von den Plage-
 geistern heimgesucht, an ein ruhiges Sitzen im Freien
 war nicht zu denken, und beständig sah man wedelnde
 Tücher und Fächer, um sich der Mücken zu erwehren.
 Wer nicht, wie ich, gegen Insektengift gefeit war, kam
 bald mit Beulen bedeckt nach Hause, die besonders in
 diesem Jahre recht schmerzhaft gewesen sein sollen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Viertl Adalbert

Artikel/Article: [Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie - Fortsetzung 77-78](#)