

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.

Central-Organ des Entomologischen Internationalen Vereins.

Herausgegeben
unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint monatlich zwei Mal. Insertionspreis pro dreigespaltene Petit-Zeile oder deren Raum 25 Pf. — Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vereinsjahre 100 Zeilen Inserate frei.

Inhalt: Beiträge zur Coleopterenfauna der Fränkischen Schweiz. — Quittungen. — Neue Mitglieder. — Briefkasten.

— Jeder Nachdruck ohne Erlaubniss ist untersagt. —

Beiträge zur Coleopterenfauna der Fränkischen Schweiz von H. Krauss, Nürnberg.

(Fortsetzung.)

Die Buprestiden stellen zwar kein grosses Contingent, aber immerhin einige recht hübsche Arten. Ich führe von dieser so begehrten Familie ausnahmsweise alle beobachteten Species auf. *Chalcophora mariana* Lap. Altenhof, *Poecilinata rutilans* F. (nach Rosenh.) an Linden; *Buprestis rustica* L. Greifenstein, G., *Melanophila acuminata* Deg. P.-T. (bei M. n. Rosenh.); *Phaenops cyanea* F. bei S. A. (in Obstbäumen); *Anthaxia candens* Panz. (Rosenh.), *salicis* F. E. (Hammon!), *nitidula* L. in den Thälern auf Blüthen nicht selten; *morio* F. bei Sachsenmühle; *4-punctata* L. auf *Taraxacum* gemein; *fulgurans* Schrank. bei M., Greifenstein. *Chrysobothris chrysostigma* L. Sponakles (Ahornthal), *affinis* F. E. (Zaunsbach). *Coroebus undatus* T.-T., *fasciatus* Villers. (? Dr. Velath), *Agrilus subauratus* Geb. Toos; *viridis* L. P.-T., M., G., Greifenstein häufig; var. *fagi* Ratzeb. P.-T., *coeruleus* Rossi S., *laticornis* Illig. E. (Hammon), *elongatus* Herbst. G. und am Wachsenstein; *Aphanisticus pusillus* Oliv. W.-T. auf *Taraxacum*, *emarginatus* F., bei S. (Hammon) *Cylindromorphus filum* Gyll. bei Mandlau ein Mal. *Trachys minuta* L. überall nicht selten; *pumila* Ill. Sachsenmühle, P.-T. gestreift; *troglodytes* Gyll. S. (Rosenh.). Von Anthaxien hätte ich noch vier Species anführen können; da dieselben mir mehr denn zweifelhaft erscheinen und auch die Berichterstatter nicht massgebend sind, so habe ich, um Verwirrungen zu vermeiden, dies füglich unterlassen.

Eucnemidae und Elateridae: Nach Rosenhauer's Notizen findet sich *Eucnemis capucina* Ahr.; es ist mir noch nicht gelungen, dieses Thier zu bekommen, wenn es noch vorhanden. — Dagegen ist *Melasis buprestoides* L. bei E. gefangen worden. *Throscus dermestoides* L. Mittelmühle, W.-T. gestreift; *elateroides* Heer, Tüchersfeld; *obtusum* Curt. T.-T., B. gestreift mit dem Netz. Die

Schnellkäfer sind reich vertreten und zeichnen sich durch viele bessere Species aus. *Adelocera punctata* Hbst. Greifenstein. *Elater sanguineus* L. P.-T. M., E. etc. etc., *praeustus* F. häufig in den Thälern auf *Spiraea ulmaria*, *sanguinolentus* Schrk. Altenhof, B., *balteatus* L. P.-T. bei G. B. auf *Galium* häufig; *crocatus* Lac. M., Rabenstein; *nigerrimus* L. bei Greifenstein; *Megapenthes lugens* Redt. Kühlenfels. *Hypnoidus* F. *riparius* nicht selten am Ufer des Haselbrunnens; *pulchellus* L. bei Unterleinleiter, Pinzberg; *4-guttatus* Lap. bei Püttlach an der Püttlach; *minutissimus* Germ. Rabeneck (durch Bekannte gesammelt) B. *Cardiophorus musculus* Er. vereinzelt nur bei M., Greifenstein, *cinereus* Hbst. P.-T., W.-T., auf *Galium*; var. *testaceus* G. B., *equiseti* Hbst. auf Thalwiesen geschöpft. T.-T. Heiligenstadt, M., *Melanotus castanipes* Payk. und *rufipes* Hbst. verstreut durchs ganze Gebiet; *crassicornis* Er. Altenhof u. Greifenstein. *Limonium violaceum* Müll. E. (Hammon.) *Athous vittatus* F. häufig überall; *longicornis* Oliv. bes. bei B. G. an Abhängen häufig; *rufus* Deg. Altenhof in Fichtenstöcken (Dürbeck), *mutilatus* Rosenh. Diese für die Umgebung von Erlangen typische Form hat sich auch bei Kirchheimbach hinter dem Walberla gefunden; *zebei* Bach. bei E. (Dr. Velath) dürfte vielleicht doch ein Irrthum sein! — *Ludius pectinicornis* L. Waldwiesen häufig; *heyeri* Lax. Unterleinleiter (Schlosspark), *cupreus* var. *aeruginosus* F. Prüllsbirkig, Wachsenstein; *castaneus* L. zwischen G. und M. in einem Jahrgange mit *purpureus* Pod. zusammen sehr häufig auf *Cornus* etc. etc., *sulfuripennis* Germ. E., *quercus* Gyll. P.-T. Greifenstein häufig; *nigricornis* Panz. verstreut im Gebiet; von *aeneus* ist die schöne var. *coeruleus* Schilsky häufig; *latus* F. Greifenstein; *cruciatus* L. E. S., *bipustulatus* L. Tooser Thal. *Agriotes aterrimus* L. T.-T., Rabenstein; *pilosus* Panz. häufig; *sobrinus* Kiesw. Abends auf den Thalwiesen gestreift. *Sericus subaeneus* L. Altenhof, P.-T., *Adrastus axillaris* Er. W.-T. A.; *humilis* Er. nur einmal gestreift bei Schottermühle. *Denticollis linearis* L.

Oberailsfeld. — Von den Dascilliden dürften nur *Priococyphon serricornis* Müll., *Hydrocyphon deflexicollis* Müll. und *Scirtes hemisphaericus* L. Erwähnung finden, welche sämtlich in den Thälern auf feuchten Wiesen gestreift wurden.

V.

Cantharidae. Die Unterabtheilung der Lycinen umfasst eine Serie hübscher Species, welche vorwiegend auf Waldwiesen und mehr an düstern Orten gestreift werden; manche Thiere erscheinen bei Sonnenuntergang auf den Spitzen langer Gräser; davon sind constatirt: *Homalilus fontisbellaquei* Fourcr. M. Pretzfeld; *Dictyopterus aurora* Hbst. Pegnitz (Schlossbg.) Toos; *rubens* Gyll. Altenhof, Prüllsbirkig; (Lerchenallee!) *Platycis minuta* F. B. Eichenbirkig. Von der grossen Anzahl der Leuchtkäfer (Lampyridini) sind nur 2 gefunden: *Lampyrhiza splendidula* L., nur in manchen Jahren häufig, dann aber in Massen, z. B. in diesem Sommer 98 trotz der kalten Abende im Juni und Juli beleuchteten sie das Tüchersfelder Thal wunderbar. *Lampyrus noctiluca* L. mehr an bestimmte Oertlichkeit gebunden, so G., Stempferrmühle, Nankendorf, Tooser Thal, nie in solchen Mengen, wie vorhergehende. *Podabrus alpinus* Payk. auf den Höhen von S. M., doch auch G., Rackersberg. *Cantharis abdominalis* F. Hohenmirsb., *erichsoni* Bach. überall auf Doldenblumen, in den Thälern. *Methacantharis discoidea* Ahr. bei Wachsenstein, P.-T., *Rhagonycha pilosa* Payk. Regenthal, Pretzfeld; *elongata* F. W.-T. gestreift; *Silis nitidula* F. Prüllsbirkig; *ruficollis* F. Ahornthal; (Sponakles) *Malthinus biguttulus* Payk. Prüllsbirkig (Lerchenallee) T.-T. *frontalis* Marsh. Altenhof. *Malthodes marginatus* Latr. A.; B., *profanus* Kiesw. (n. Rosenh.) M. S. *spathifer* Kiesw. B.; *Charopus concolor* F. Kühlenfels W.-T. geschöpft; *plumbeomicans* Goeze bei B. häufig; *pallipes* Ol. Greifenstein, Prüllsbirkig. *Hypebaeus flavipes* F. E.-S. *Ebaeus pedicularius* Schrk. auf *Anthemis tinctoria* P.-T., Rabenstein. *Axinotarsus ruficollis* Oliv. P.-T., Altenhof, *pulicarius* F. Höhen bei M. häufig. *Malachius rubidus* Er., B., Sachsenmühle. *Dasytes bipustulatus* F. bei Zauppenberg; *obscurus* Gyll. verstreut im Gebiet. *Haplocnemus virens* P.-T. einige Male; *Danaeaca nigritarsis* Küst. Ebermannstadt. —

Cleridae. *Tillus clongatus* L. Neumühle; *unifasciatus* F. Kirchenbirkig (nur einmal!). *Opilo mollis* L. P. *Clerus 4-maculatus* Schall. (nach Rosenh.) *mutillarius* F. Altenhof; *Trichodes alvearius* A., Greifenstein S. nicht selten. *Corynetes ruficornis* Sturm. E. G. — *Hylecoetes dermestoides* L. Altenhof; Neumühle.

Bruchidae (Ptinidae auct. olim) u. **Byrrhidae** (Anobiidae olim), hiervon ist nicht viel zu verzeichnen; *Mezium affine* Boield. M. (?) (Hammon.) *Bruchus dubius* Sturm, P., *raptor* Sturm E., Haselbrunn. *Priobium castaneum* F. Altenhof, *Dryophilus pusillus* Gyll. Prüllsbirkig (häufig) *Byrrhus pertinax* L. Altenhof, häufig. *Hestobium plumbeum* Ill. Greifenstein; *Hedobia imperialis* L. A. (Hammon), *pubescens* F. Rabenstein, *Einobius lucidus* Muls. Rabenstein, *Oligomerus brunneus* Sturm Klumpermühle (angeflogen). *Xyletinus ater* Panz. Sachsenmühle. *Dorcatoma serra* Panz. Burggailenrent (Schloss), *chryso-melina* Sturm. Greifenstein; *Coenocara bovistae* Hoffm. bei Sachsenhof einmal. Von **Lyctidae** u. **Bostrychidae**; *Lyctus pubescens* Panz. B., Greifenstein; *Bostrychus ca-*

pucinus L. E., Altenhof. *Hendecatomus reticulatus* Hbst. bei Toos einmal!

Ciidae meistens von mir aus Baumschwämmen gezüchtete Thiere; *Cis micans* Hbst. (Eichen) P.-T. *hispidus* Gyll. überall häufig; *comptus* Gyll. E. A. (Buchen) *bidentatus* Oliv. P.-T., Sponakles (Eichen). *Rhopalodontus perforatus* Gyll. bei Oberailsfeld; *fronticornis* P.-T. Hollenberg. *Ennearthron affine* Müll. verstreut im Gebiet; *cornutum* Gyll. Greifenstein (Buchen). *Octotemnus mandibularis* Gyll. (Buchen) verstreut T.-T. Altenhof, M. — Aus der grossen Gruppe der **Tenebrioniden** habe ich sehr wenig aufzuführen; wir sind ja in Deutschland überhaupt mit dieser Familie nur schwach bestellt: *Blaps mucronata* Latr. P. (mehrere Exemplare in einem Lagerkeller); *mortisaga* L. hier und da in Häusern; *Microzoum tibiale* F. verstreut im Gebiet, in Sandgräben. *Eledona agaricola* Hbst. in Baumschwämmen (an Erlen) b. Neumühle. *Diaperis boleti* L. im ganzen Gebiet, A. B.; Tooser Thal. *Platydema violacea* F. bei Moggast. *Hypophloeus (Corticus) rufulus* Rosenh. M., *fasciatus* F. P.-T. *Tenebrio opacus* Duft. bei Leutzdorf, *obscurus* F. unter morscher Baumrinde. Altenhof, G. Anlagen, E. P. *Bius thoracicus* F. als am Quakenschlösschen gefangen (zweifelhaft!) *Eryx ater* F. bei Kühlenfels. *Gonodera ceramboides* L. Pegnitz (Schlossbg.) *Mycetochara bipustulata* Ill. E., B. nicht selten in Baumschwämmen an Eiche, *flavipes* F. bei M. nur an Nussbäumen.

Melandryidae: *Tetratoma fungorum* F. P.-T.; *Eustrophus dermestoides* F. unter Buchenrinde M. S. (nach Rosenh.) *Hallomenus fuscus* Gyll. bei Pfaffenberg auf Syngenisten. *Orchesia micans* Panz. in Buchenschwämmen bei Schottermühle, *fasciata* Payk. 1 Exemplar in Erlen-schwamm, ein anderes nahe daran auf Umbelliferen: Neumühle. Fortsetzung folgt.

Quittungen.

Für das Vereinsjahr 1898/99 gingen ferner bis heut noch folgende Beträge ein:

Der Jahresbeitrag mit 5 M. von No. 27 49 79 167 182 251
358 382 437 505 528 555 597 646 657 683 694 721 761 873
1101 1192 1265 1365 1379 1434 1440 1496 1521 1531 1561
1616 1672 1679 1729 1768 1846 1875 1897 1941 1959 1990
1995 2012 2112 2134 2196 2251 2266 2272 2278 2316 2327
2333 2337 2341 2357 2362 2375 2455 2456 2458 2459 2460
2461 2463 2464 2465 2466 2467 2469 2474 2476 2477 2480
2481 2483 2487 2489 2490 2491 2494 2495 2498 2499 2500
2501 und 2502.

Der Beitrag für das 1. Halbjahr mit 2,50 M. von 217 497
549 828 1148 1307 1453 1610 1664 1667 1670 1769 1861 2003
2050 2068 2197 2299 2387 2457 2462 2468 2470 2471 2475
2478 2479 2482 2485 2486 2488 und 2493.

Der Beitrag für das 2. Halbjahr mit 2,50 M. von No. 366
666 850 898 899 966 1024 1130 1146 1177 1286 1336 1401
1416 1433 1490 1580 1646 1683 1689 1751 1757 1762 1783
1785 1788 1858 1905 1911 1950 1974 1999 2047 2068 2103
2115 2116 2153 2170 2173 2187 2189 2205 2229 2231 2274
2292 2294 2297 2307 2370 2437 2443 2447 2453 2468 2482
2497 2505 2506 2510 und 2511.

Der Beitrag für das 2. bis 4. Vierteljahr mit 3,75 M. von
No. 1498 2484 2496 und 2504.

Das Eintrittsgeld mit 1 M. von No. 2341 2455 2456 2457
2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468
2469 2470 2471 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481
2482 2483 2484 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2493 2494
2495 2496 2497 2498 2499 2500 2502 2503 2504 2505 2506
2510 und 2511.

Guben, Pförtenerstrasse 3,
den 23. October 1898.

Der Kassirer
Paul Hoffmann.

Quittungsleistung über die mir zugeführten Beiträge in No. 16.
H. Redlich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Krauss H.

Artikel/Article: [Beiträge zur Coleopterenfauna der Fränkischen Schweiz -
Fortsetzung 107-108](#)