© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalts-Verzeichnis.

I. Original-Arbeiten.

Seite

Aigner-Abafi, L. v.: Neue Falterformen aus Ungarn 207
Andreas, Karl: Beiträge zur Lebensweise von Teracolus daira Klug v. nouna Luc. . . 141
Arntz, J.: Deilephila euphorbiae L. ab. . . 99
Austaut, Jules Léon: Notice sur une nouvelle espèce du genre Satyrus, ainsi que sur deux genres nouveaux de la famille des Sphingides . 29
— Notice sur le Chaerocampa boisduvalii Bugnion 180

Bartel, Max: Eine neue Sesia-Art aus der Schweiz 190
Bastelberger, Dr.: Neue Geometriden aus meiner Sammlung 5
— Beschreibung neuer und Besprechung weniger bekannter Geometriden aus meiner Sammlung 22, 76
— Zwei auffallende Aberrationen aus meiner Sammlung 85
Bickhardt, H.: Cerambycidenfang . . . 167
Böttcher, Ernst A.: Neue und wenig bekannte Arctiiden aus Turkestan 53
Bohatschek, Leopold: Beitrag zur Zucht von Stauropus fagi L. aus dem Ei . . . 172
— Beitrag zur Zucht der Catocalen . . 216
Bretschneider, J. B. R.: Seltene Insekten im Erzgebirge 17
— Mitteilungen über eine Zucht von Lemonia dumi L 197

Creutzmann: Acronicta menyanthidis View. . 132

le Doux, Dr. med. Charles: Ueber entomologische Lupen 166
Dzierzynski: Zygaena. Ein Vorschlag für eine neue Zusammenstellung der Zygaenen-Arten des europäischen Faunengebietes . 184

Fischer, Prof. H.: Mitteilungen 40
Fischer, Dr. E.: Ueber Parasitismus bei der Papilio machaon-Puppe 186
Fruhstorfer, H.: Neue Rhopaloceren aus dem Indo-Australischen Gebiet 45
— Neue Pieriden 75
— Neue Neptis (Phaedyma) - Lokalrassen . 89
— Neue Cethosia-Formen 105
— Neue Morphiden 113
— Historisches über Caligo martia Godt. . 136
— Neue Rhopaloceren 215
Fuchs, Ferdinand: Einige bemerkenswerte Lepidopterenformen 172

Gauckler, H.: Melolontha vulgaris var. lugubris und var. nigra bezw. ab. nigritarsis . . 67
Gillmer, M.: V. Die menyanthidis-Raupe in ihren einzelnen Stadien 2, 6, 11, 19
— Lücken in unseren Kenntnissen von der Naturgeschichte gewisser Tagfalterarten . 7
— Das Ei von Polia polymita L. . . . 17
— VI. Die Verpuppung und Puppe von menyanthidis 23
— VII. Einige Angaben über die Zucht von menyanthidis 24
— Lücken und Errungenschaften in unseren Kenntnissen der Gruppe der Federmotten im Jahre 1904 32
Gillmer, M.: VIII. Tabellarische Zusammenstellung der Maße und Entwickelungszeiten des Eies, der Raupe und Puppe von menyanthidis 30
— IX. Die beiden Generationen des menyanthidis-Falters und der menyanthidis-Raupe 30, 42
— X. Die Verbreitung von menyanthidis in Europa 42
— Die Typen der Agdistiden-, Alucitiden- u. Orneodideu-Genera (Federmotten) . . 49
— Einige Abarten und Abnormitäten von Nikolsburg (Mähren) 65
— Aberrationen von Herrn Bunge-Billwärder (Hamburg) 90
— Neueste Bestrebungen auf dem Gebiete der lepidopterologischen Literatur . . 92
— Zur Biologie einiger Tagfalter . . . 107
— Zwei aberrative Bläulingsarten . . . 151
— Aberrationen aus der Sammlung des Herrn Rich. Dieroff, Zwötzen a. d. Elster . . 157
— Kurzes Referat über die Practical Hints for the Field Lepidopterist von J. W. Tutt. Teil I (1901), Teil II (1902), Teil III (1905) 191
— Das Ei und die ersten Raupenstadien von Agrotis interjecta Hübn. 200
— Eine interessante melanistische Form von Acronicta leporina L. aus England . . 217
Grund, Arnost: Leptidia sinapis L. in der Umgebung Agrams (Kroatien) mit drei neuen Formen 145

Hader, W.: Schnelle Entwickelung von Smerinthus ocellata L. 203
Hesse, Willy: Cerura bifida Hb. . . . 118
Heyn, Karl: Eine neue Deilemera (Nyctemera) . 213
Hiller, R.: Zweite Generation von Deilephila gallii Rott. 179
— Zur Zucht von Selenephera lunigera Esp. und ab. lobulina Esp. 200
Hinderer, W.: Ein eigentümlicher Fall von Ueberliegen 218

Krähe, C.: Zur Zucht von Lemonia dumi L. . 206
Krodel, Ernst: Callimorpha dominula L. . . 10

Lange, C. F.: Entomologisches aus dem sächsischen Erzgebirge 166
Lorenz: Plusia bractea F. 109

Matthes, R. A.: Ueber die Dauer der Entwickelung von Acherontia atropos L. . . 41
Mayer, Georg: Acherontia atropos L. . . 109
Müller, Fr.: Zur Zucht von Arctia villica v. konewkai Frr. 25

Pax, Ferdinand: Massenhaftes Auftreten der Raupen von Orgyia antiqua L. auf ausländischen Pflanzen 159
Petersen, Wilhelm: Zur Frage der „Geschlechtswitterung" bei Raupen 22
Pfannenberg, Georg: Ein Nigrino von Melolontha vulgaris 44
Prochnow, O.: Eine neue Methode der Raupenpräparation 3
— Beiträge zur Morphologie und Biologie der Lepidoptera 68, 91, 97
— Lichtstärke von Lampyris noctiluca L. . 173

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Prochnow, O.; Entomologie und Meteorologie. Ein Beitrag zur Biologie der Insekten . 165
— Einige Bemerkungen zu meinem Aufsatze „Entomologie und Meteorologie." . . 210

Reinberger: Papilio machaon L. ab. . . . 87
Robitzsch, F.: Einiges über die Raupe des Wiener Nachtpfauenauges . . . 173
Rothenburg, Dr. v.: Praktische Erfahrungen beim Sammeln von Buprestiden . . 131
— Praktische coleopterologische Erfahrungen 149
— „Käfergräben" 193
Rudow, Dr.: Unsere Honigbienen . . . 6
— Einige Bemerkungen zu Schmarotzern in Schmetterlingen 69

Scholz, E.: Hymenopterologisches vom Sommer 1905 202
Schröder, H.: Das Ei von Ellopia prosapiaria L. ab. prasinaria Hb. 20
Schultz, Oskar: Ueber die Variabilität von Arctia flavia Fuessly 1, 9
— Zur Variabilität von Lycaena jolas Ochs. 18
— Beschreibung dreier gynandromorphen Exemplare von Apatura ilia Schiff. ab. clytie Schiff. 21
— Ueber eine monströse Bildung bei Argynnis paphia L. 40
— Ueber eine Zwergform von Pyrameis atalanta L. 67
— Ueber eine extrem verdunkelte Form von Heliaca tenebrata Sc. (ab. subtristis m.) . 82
— Ueber zwei seltene aberrative Formen von Plusia festucae L. 86
— Ueber die Variabilität von Aglia tau L. . 108, 115
— Plusia festucae L. ab. et v. coalescens Schultz 133
— Ueber einige durch Albinismus beeinflußte Schmetterlingsformen 150
— Ueber einige bemerkenswerte Aberrationen von Melitaea aurinia Rott. . . . 205
— Ueber einige Aberrationen aus der Gruppe der Lycaeniden II. 214
Seiler, Rob.: Smerinthus hybrid. leoniae Standf. 148
Stichel, H.: Zur Nomenklaturfrage . . . 189, 199

Torka, V.: Beiträge zur Biologie von Papilio machaon L. 14
Tränckler, K.: Offener Brief 202

Uffeln: Altes und Neues von Hybernia-Arten . 12, 18

Wedler, Wilhelm: Sonderbare Ergebnisse meiner diesjährigen Pericallia matronula-Zucht . 172

Zickert, Fritz: Einige neue in der Provinz Avellino erbeutete Zygaenen-Aberrationen 117

II. Sachregister.

Aberrationen von Acherontia atropos L. 90; von Acronicta leporina L. 217, rumicis L. 158; von Aglia tau L. 108, 115; von Aporia crataegi L. 208; von Arctia caja L. 209, erschoffi Alph. 61, 62, flavia Fuessly 1, 9, glaphyra Ev. 62, hebe L. 209, intercalaris Ev. 55, maculosa Gerning 55, villica L. 1. 2. 11, 25; von Argynnis dia L. 208; von Boarmia gemmaria Brahm 209, jubata Thbg. 134; von Callimorpha dominula L. 10, quadripunctaria Poda 85; von Calophasia casta Bkh. 209; von Chilades trochylus Frr. 209; von Dilina tiliae L. 91, 158; von Grammesia trigrammica Hufn. 158; von Heliaca tenebrata Sc. 82; von Hybernia leucophaearia Schiff. 12, marginaria Bkh. 14; von Hypogymna morio C. 209; von Lasiocampa quercus L. 99; von Leptidia sinapis L. 145; von Lycaena alcon F. 215, amandus Schn. 151, 214, arcas Rott. 215, baton Bergstr. 74, bellargus Rott. 74, 151, 209. 214, charybdis Stdgr. 214, coridon Poda 74, cyllarus Rott. 74, damon Schiff. 209, eros O. 214, euphemus Hb. 215, eversmanni Stdgr. 214, icarus Rott. 74, jolas Ochs. 18, meleager Esp. 214, miris Stdgr. 214; von Malacosoma neustria L. 209; von Melanargia galathea L. 208, japygia Hbst. 208; von Melitaea aurinia Rott. 205, cinxia L. 208, didyma O. 65, 66, 208, phoebe Knoch. 208; von Pieris napi L. 157; von Smerinthus populi L. 91, 158; von Thecla ilicis Esp. 209; von Zygaena carniolica Sc. 209, erythrus Hb. 117, oxytropis B. 117, scabiosae Scheven 117.
Abisara wallacei theodosia Fruhst. 215.
Abkühlungsversuche 10.
Abnormität von Melitaea aurelia Nick. 73.
Abraxas privata Bastelbg., aus Sumba 5.
Acherontia atropos L. Aberration 90; Dauer der Entwickelung 41; Ueberwinterung der Puppe im Freien 109.
Acherontia atropos L. ab. obsoleta Tutt 91.
Acronicta leporina L. v. melanocephala Mansbridge 217.
Acronicta menyanthidis View., Beschreibung der Raupe in ihren einzelnen Stadien 2, 6, 11, 19, 23; Verpuppung und Puppe 23; tabellarische Zusammenstellung der Maße und Entwickelungszeiten des Eies, der Raupe und der Puppe 30; die beiden Generationen der Raupe und des Falters 30, 42; Einwanderung in Europa 37; Verbreitung in Europa 42, 132.
Acronicta rumicis L. ab. salicis Curt. 158.
Agdistiden-Genera, ihre Typen 49.
Aglia tau L. typ. 108; ab. ♂ decolor Schultz 108; ab. ♀ roseotincta Schultz 109; ab. subcaeca Strand 115; ab. decaeruleata Schultz 115; ab. oblongomaculata Schultz 115; ab. flexilis Schultz 115; ab. confluens Schultz 115; ab. cerberus Schultz 115; ab. ferenigra Th.-Mieg. 131; ab. melaina Groß 137; ab. cupreola Werner 142; ab. privata Schultz 142; ab. caecata Schultz 142; ab. locuples Schultz 142; ab. quadrangularis Schultz 142; v. japonica Leech 149.
Agriotypus armatus Walk., Lebensweise 178.
Agrotis interjecta Hübn., Ei und erste Raupenstadien 200.
Albinismus bei Lycaena argyrognomon Bergstr. 73; bei Brephos nothum Hb. 85.
Albinistische Schmetterlingsformen 150.
Alucitiden-Genera, ihre Typen 49.
Amorpha (Smerinthus) populi L., Aberrationen 91, 158.
Amorpha (Smerinthus) populi L. ab. ferruginea-fasciata Gillmer 91; ab. rufescens Selys-Longch. 158.
Antheraea yamamai Guér., Ei 82; Entwickelungsstadien 82; Darstellung der Längenzunahme der Raupe 91.
Apatura ilia Schiff. ab. clytie Schiff., drei gynandromorphe Exemplare 21.
Apis mellifica L. 6; ihre tropischen Verwandten 7.
Aporia crataegi L. ab. koyi Aigner 208.
Apparat, neuer, zur Raupen-Präparation 3.
Arctia caja L. aus Turkestan 54; ab. flava Aigner 209.
Arctia erschoffi Alph. 61; v. ferghana Stdgr. 61; v. issyka Stdgr. 61; v. selmonsi Böttcher 62; ab. transversata Böttcher 62.
Arctia flavia Fuessly typ. 1; ab. rosea Lorez 1; ab. obscura Lorez 1; ab. flavoabdominalis Lorez 2; ab. atroabdominalis Lorez 2; ab. stygialis Schultz 2; ab. latefasciata Lorez 2; ab. latemarginata Schultz 2; ab. albimacula Lorez 2; ab. immaculata Lorez 9; ab. continua Schultz 9; v. sibirica Heyne 1, 9; v. uralensis Heyne 9; v. campestris Graeser 10.
Arctia glaphyra Ev. 62; v. manni Alph. 62; ab. amabilis Böttcher 63; ab. puengleri Böttcher 63; v. gratiosa Gr. Gr. 63.
Arctia hebe L. ab. wassi Aigner 209.
Arctia intercalaris Ev. 54; ab. ilithyia Böttcher 55; ab. suttadra Moore 55.
Arctia maculosa Gerning v. strigulosa Hmps. 55.
Arctia villica-Aberrationen 11.
Arctia villica L. v. fulminans Stdgr. 1; ab. brunnescens Schultz 2; ab. ursula Schultz 11.
Arctia villica L. ab. konewkai Frr., Zucht 25.
Arctiiden aus Turkestan 53.
Argynnis dia L. ab. hudáki Aigner 208.
Argynnis paphia L., monströse Bildung 40.
Attacus cynthia Drury, Raupe 86.

Bapta pictaria Curt. ab. contrastaria Fuchs 172.
Biologie: Acronicta menyanthidis View. 2, 6, 19, 23, 30, 42; Boarmia jubata Thbg. 98, 127; Papilio machaon L. 14.
Boarmia gemmaria Brahm ab. rebeli Aigner 209.
Boarmia jubata Thbg. Ei 98, Eiablage 98, Raupe 98, Puppenstadium 127, Beschreibung des Schmetterlings 130, Variation 134, Gewohnheiten, Aufenthalt, Erscheinungszeit und Verbreitung des Schmetterlings 136.
Boarmia jubata Thbg. ab. nigrocincta Fuchs 134; ab. obscura Fuchs 134.
Boarmia selenaria Hb., Ei 40.
Bockkäfer, Verhältniszahlen der ♂♂ und ♀♀ 149; Sammeln derselben 149, 167.
Borshomia Austaut, novum genus, errichtet für komarovi Christ. 30.
Brephos nothum Hb., Albino 85.
Bulonga trilineata Bastelberger, n. spec. aus Kinabalu 5.
Bupalus piniarius L., Schmarotzer 69.
Buprestiden, Sammeln derselben 131.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Caligo martia Godt., Historisches 136.
Caligula japonica Moore, Ei 83, Entwickelungsstadien der Raupe 83, Variation des Schmetterlings 84, Darstellung der Längenzunahme der Raupe 91.
Callimorpha dominula L., Kälte-Aberrationen 10.
Callimorpha dominula L. ab. marita Schultz 10, ab. paucimaculata Schultz 10, ab. radiata Krodel 11.
Callimorpha quadripunctaria Poda ab. perfusca Bastelberger 85.
Calophasia casta Bkh. ab. biröi Aigner 209.
Campylostira sinuata Först., Vorkommen im sächsischen Erzgebirge 178.
Catocala, zur Zucht von electa Bkh., nupta L., elocata Esp., fraxini L., sponsa L. und promissa Esp. 216, 217.
Cerambyciden, Sammeln derselben 149, 167; Verhältniszahlen der ♂♂ und ♀♀ 149; Ausbeute an Cerambyciden auf Korsika 167.
Cerura bifida Hb., Entwickelung des Schmetterlings ohne Ueberwinterung der Puppe 118.
Cethosia biblis alceste Fruhst. 106; biblis (?) atia Fruhst. 105.
Cethosia cydippe sangira Fruhst. 215.
Cethosia penthesilea exsanguis Fruhst. 105; penthesilea diffusa Fruhst. 105; penthesilea paksha Fruhst. 105.
Chaerocampa (Borshomia) komarovi Christ. 30.
Chaerocampa alecto L. 181; boisduvalii Bugnion 181; cretica ♀ B. synonym mit alecto L. 181; cretica ♂ B. synonym mit boisduvalii Bugnion 181; clotho Drury 182.
Cheimatobia brumata L. 70.
Chilades trochylus Fr. v. grisea Aigner 209.
Coleopteren auf Korsika 167; im sächsischen Erzgebirge 166; Fundorte für einige bessere Arten 160; Fang in „Käfergräben" 193.
Cucullia scrophulariae Capieux, eigentümliches Ueberliegen der Puppen 218.
Cyaniris puspa Horsf., Lokalrassen 64.
Cyaniris puspa hermione Fruhst. 64.
Cyanitia lepidea Moore, Lokalrassen 57.
Cyanitia lepidea flaminia Fruhst. 56; lepidea matala Fruhst. nom. nov. für Euthalia lepidea Distant var. 56.
Cynthia arsinoë rebeli Fruhst. 215; arsinoë meforica Fruhst. 216; arsinoë adina Fruhst. 216; arsinoë figalea Fruhst. 216.

Deilemera fatua Heyn 213.
Deilephila euphorbiae L. ab. 99; gallii Rott., zweite Generation 179.
Delias ninus alluviorum Fruhst. 75; aglaja goda Fruhst. 76; aglaja beata Fruhst. 76; aglaja parthenope Fruhst. 76; aglaja tonkiniana Fruhst. 76; bagoë nusana Fruhst. 89.
Dendrolimus pini L., Schmarotzer 69.
Depressaria lennigiella Fuchs 172.
Dilina tiliae L., Aberrationen 91, 158.
Dilina tiliae L. ab. centripuncta Clark 91; ab. pallida-centripuncta Tutt 158.
Dilophodes amplificata Bastelberger 22.
Dipteren, seltene, im sächsischen Erzgebirge 177; Dipteren am Köder 183.
Drypta dentata Rossi, Vorkommen im sächsischen Erzgebirge 177.

Ei von Agrotis interjecta Hübn. 200; Antheraea yamamai Guér. 82; Boarmia jubata Thbg. 97; Boarmia selenaria Hb. 40; Ellopia prosapiaria L. ab. prasinaria Hb. 20; Ennomos alniaria L. 40; Hybernia leucophaearia Schiff. 19; marginaria Bkh. 19; Metrocampa honoraria Schiff. 40; Metrocampa margaritata L. 40; Ortholitha plumbaria F. 40; Polia polymita L. 17; Psodos alpinata Sc. 40.
Eiablage bei Boarmia jubata Thbg. 97; bei Ennomos alniaria L. 40.
Einfluß der Feuchtigkeit auf die Boarmia jubata-Raupe 127; auf den Insektenflug 183.
Einfluß der Witterung auf das Insektenleben 128, 129, 165, 179.
Ellopia prosapiaria L. ab. prasinaria Hb., Ei 20.
Ennomos alniaria L., Ei und Eiablage 40.
Entwickelungsgeschichte von Acherontia atropos L. 41, 109; Acronicta menyanthidis View. 2, 6, 11, 19, 23, 30, 42; Agrotis interjecta Hb. 200; Antheraea yamamai Guér. 82, 91; Attacus cynthia Drury 86; Boarmia jubata Thbg. 97, 127; Caligula japonica Moore 83, 91; Cerura bifida Hb. 118; Cucullia scrophulariae Capieux 218; Deilephila gallii Rott. 179; Hyperchiria io Fabricius 85, 91; Lycaena coridon Poda 117; Papilio machaon L. 14, 186; Platysamia cecropia Hb. 91; Smerinthus ocellata L. 203.
Ergates faber L., Zucht 153.
Euthalia julii irma Fruhst. 46; julii indochinensis Fruhst. 51; jahnu jahnides Fruhst. 55; apicalis chula Fruhst. 56; apicalis lioneli Fruhst. 56; adonia pura Fruhst. 57; adonia beata Fruhst. 63.
Euthalia adonia Cramer, Lokalrassen 64.
Euthalia apicalis Vollenh., Lokalrassen 55.
Euthalia jahnu Moore, Lokalrassen 55.
Euthalia julii Bougainville, Lokalrassen 55.
Evetria (Retinia) buoliana Schiff. 69; resinella L. (resinana Fabr.) 69.

Färbung einiger Seidenspinnerraupen: ihr biologischer Wert 91.
Fang der Buprestiden 131, der Cerambyciden 149; der Coleopteren in Käfergräben 193, in eingegrabenen Töpfen 193.
Fang von Ludius serraticornis Payk. 166; von Pterolama forstroemi Gyllh. 166.
Faunistisches: Veränderungen in der Fauna der Großschmetterlinge von Chemnitz und Umgegend 180.
Federmotten, Lücken in unseren Kenntnissen dieser Gruppe 32; die Typen ihrer Genera 49.
Feuchtigkeit, ihr Einfluß auf die Boarmia jubata-Raupe 127; ihr Einfluß auf den Insektenflug 183.
Fliegen, seltene, im sächsischen Erzgebirge 177; Köderbesuch 183.
Fundorte für einige bessere Käferarten 160.
Futterpflanzen für Agrotis interjecta Hb. 201, 202; für Boarmia jubata Thbg. 127; für Catocala electa Bkh. 217, elocata Esp. 217, fraxini L. 217, nupta L. 217, promissa Esp. 217, sponsa L. 217; für Lemonia dumi L. 198; für Lycaena coridon Poda 117.

Gelechia rosabella Fologne 172.
Geometriden, neue 5.
Geschlechtswitterung bei Raupen 22.
Gnorimus variabilis L., Lebensweise 160.
Gracilaria roscipennella Hb. ab. obscurella Fuchs 172.
Grammesia trigrammica Hufn., Abart 158.
Gullaca derasata Bastelberger 77; exilis Bastelberger 5.
Gynandromorphismus bei Apatura ilia Schiff. ab. clytie Schiff. 21; bei Lycaena icarus Rott. 157; bei Ocnogyna corsicum Rbr. 157.

Hautflügler im sächsischen Erzgebirge 177.
Heliaca tenebrata Sc. ab. subtristis Schultz 82.
Hemipteren im sächsichen Erzgebirge 178.
Heterochasta (Polyclysta) lasioplaca Low. 22.
Holcocneme insignis Klg., Vorkommen im sächsischen Erzgebirge 178,
Honigbienen, unsere 6.
Hybernia-Arten, Altes und Neues davon 12.
Hybernia leucophaearia Schiff. 12; Ei 18; ab. marmorinaria Esp. 13; ab. merularia Weymer 13; ab. medioobscuraria Uffeln 13.
Hybernia marginaria Bkh. 14; Ei 19; ab. fuscata Harr. 14; ab. denigraria Uffeln 14.
Hybriden 148.
Hymenopteren im sächsischen Erzgebirge 177; am Köder 183.
Hymenopterologisches vom Sommer 1905 202.
Hyperchiria io Fabricius, Raupe 85; Darstellung ihrer Längenzunahme 91.
Hypogymna morio C. ab. nátlyi Aigner 209.

Isamia aegyptus Butl., Lokalrassen 46.
Isamia aegyptus tricolora Fruhst. 46.
Isamia midamus L., Lokalrassen 46.

Käferfang in Töpfen 193.
Käferfunde auf Korsika 167; im sächsischen Erzgebirge 166.
Käfergräben 193.
Köder: Welche Tiere kommen zum Köder? 178.
Köderbereitung 178.
Konservierung kleiner Insekten 74.
Kopulation der Seidenspinner 74.

Lampyris noctiluca L., Lichtstärke 173.
Lasiocampa quercus L. 99; Aberrationen 99; ab. latovirgata Tutt 99; ab. brunnea Tutt 99.
Lasiomus enervis Fieb., Vorkommen im sächsischen Erzgebirge 178.
Lebensweise von Gnorimus variabilis L. 160; von Agriotypus armatus Walk. 178.
Lemonia dumi L., monströse Bildung 40; Zucht aus dem Ei 197.
Leptidia sinapis L. 145; ab. major Grund 145; v. lathyri Hb. 146; ab. croatica Grund 146; v. diniensis B. 147; ab. flavescens Grund 147; v. sartha Rühl 147.
Lichtstärke von Lampyris noctiluca L. 173.
Lokalrassen von Cethosia biblis Drury 105; von Cethosia penthesilea Cram. 105; von Cyaniris puspa Horsf. 64; von Cynitia lepidea Moore 56; von Delias aglaja L. 81; von Delias bagoë Boisd. 89; von Delias crithoë Boisd. 87; von Delias henningia Eschh. 87; von Delias ninus Wall. 87; von Delias pandemia Wall. 87; von Delias thysbe

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cramer 87; von Euthalia adonia Cramer 64; von Euthalia apicalis Vollenh. 55; von Euthalia jahnu Moore 55; von Euthalia julii Bougainville 55; von Isamia aegyptus Butl. 46; von Isamia midamus L. 46; von Morpho cisseis Feld. 125; von Morpho hecuba L. 125; von Morpho hercules Dalm. 113; von Morpho perseus Cramer 126; von Phaedyma columella Cramer 89, 90; von Phaedyma daria Feld. 100; von Phaedyma shepherdi Moore 100, 101; von Parantica cleona Cramer 46; von Tachyris nero F. 45.
Ludius serraticornis Payk., Vorkommen im sächsischen Erzgebirge 166.
Lupen, entomologische 166.
Lycaena alcon F. ab. pallidior Schultz 215.
Lycaena amandus Schn. ab. caeca Gillmer 151; ab. ♂ stigmatica Schultz 214.
Lycaena arcas Rott. ab. ♂ lycaonius Schultz 215.
Lycaena argyrognomon Bergstr. ab. lutea Carad. 73.
Lycaena baton Bergstr. 74.
Lycaena bellargus Rott. 74; ab. albofimbriata Gillmer 151; ab. krodeli Gillmer 151; ab. ♂ czekelii Aigner 209; ab. ♂ parvipuncta Aigner 209; ab. ♂ confluens Aigner 209; ab. ♀ latefasciata Schultz 214.
Lycaena charybdis Stdgr. ab. exuta Schultz 214.
Lycaena coridon Poda 11; Beschreibung der Raupe 126; Gewohnheiten der Raupe 117; Symbiose 118; Verpuppung 126.
Lycaena cyllarus Rott. 74.
Lycaena damon Schiff. 11; ab. ♂ caeca Aigner 209.
Lycaena eros O. ab. ♀ albopicta Schultz 214.
Lycaena euphemus Hb. ab. paula Schultz 215.
Lycaena eversmanni Stdgr. ab. amplificata Schultz 214.
Lycaena icarus Rott. 74; ♀ Aberration 158; Zwitter 158.
Lycaena jolas Ochs. 18; v. debilitata Schultz 18; ab. opulenta Schultz 18.
Lycaena meleager Esp. ab. ♂ limbopunctata Schultz 214.
Lycaena miris Stdgr. ab. oblitescens Schultz 214.

Malacosoma neustria L. ab. unicolor Aigner 209.
Manduca siehe Acherontia.
Massenhaftes Auftreten einzelner Käferarten 160; von Orgyia antiqua L. auf ausländischen Pflanzen 159.
Melanargia galathea L. ab. franzenaui Aigner 208.
Melanargia japygia Hbst. v. clotho Hb. ab. immaculata Aigner 208.
Melitaea aurinia Rott. ab. 206; ab. nigrolimbata Schultz 205; ab. atricolor Schultz 205; ab. impunctata Schultz 205; ab. dubia Kroul. 206; ab. sesostris Schultz 206; ab. sebaldus Schultz 206.
Melitaea cinxia L. ab. ♀ horváthi Aigner 208; ab ♀ uhryki Aigner 208; ab. ♂ mocsáryi Aigner 208.
Melitaea didyma O. ♀ aberr. 65; ab. ♀ kempeleni Aigner 208; ab. ♀ fischeri Aigner 208.
Melitaea phoebe Knoch. ab. ♂ geyeri Aigner 208.
Meloluntha vulgaris L., Nigrino 44, 67; v. lugubris Mulsant ab. nigritarsis Pfanneberg 44, 67; v. nigra Gauckler 67.
Meteorologisches 165.
Metrocampa honoraria Schiff. 40; margaritata L. 40.
Mimas siehe Dilina.
Mnesiloba seminigra Bastelberger 76.
Monströse Bildung bei Argynnis paphia L. 40; bei Lemonia dumi L. 40.
Morpho cisseis forma cisseides Fruhst. 125; hecuba obidonus Fruhst. 125; hercules diadema Fruhst. 113; hercules richardus Fruhst. 113; perseus aratos Fruhst. 126.

Nährpflanzen der Raupe von Agrotis interjecta Hb. 201, 202; von Boarmia jubata Thbg. 127; von Lemonia dumi L. 198; von Lycaena coridon Poda 117, 118.
Nomenklatur 189, 199.

Oenogyna corsicum Rbr., Zwitter 157.
Orgyia antiqua L., massenhaftes Auftreten auf ausländischen Pflanzen 159.
Orthopteren am Köder 183.

Pachyta lamed L., Vorkommen im Erzgebirge 17.
Papilio machaon L., Beiträge zur Biologie 14; Aberration 87; Erkennung der angestochenen Puppen 186.
Parantica cleona Cramer 46; cleona rita Fruhst. 46; philomela Zink. 46; Lokalrassen von cleona Cramer 46.
Parasiten, Erkennung ihrer Anwesenheit in den Puppen von Papilio machaon, hospiton und Pyrameis cardui 186, 187.
Pericallia matronula L., sonderbare Ergebnisse der Zucht 172.
Phaedyma columella kangeana Fruhst. 89; columella baweana Fruhst. 89; columella sumbana Fruhst. 90; columella tonkiniana Fruhst. 90; jumba amorosa Fruhst. 90; columella binghami Fruhst. 99; shepherdi donata Fruhst. 100; shepherdi graziella Fruhst. 100; shepherdi damia Fruhst. 100; Uebersicht der austro-malayischen Phaedyma 100.
Phrissogonus laticostata Wlk. ab. agoniaria Bastelberger 77.
Pieris brassicae L., ihr scharenweises Auftreten und ihre Vertilgung durch Schmarotzer 69.
Pieris napi L. ab. fumigata Gillmer 158.
Platisamia cecropia Hb., Beschreibung der Raupe 91; Entwickelungsdauer 91.
Plusia bractea F., Vorkommen im Erzgebirge 18; Vorkommen im Riesengebirge 109.
Plusia festucae L. ab. et v. coalescens Schultz 86, 133; ab. miniana Schultz 87.
Plusia putnami Grote (= festata Graeser), Beschreibung 134.
Polia polymita L., Ei 17.
Polyclysta (Heterochasta) lasioplaca Low. 22.
Präparation der Raupen, eine neue Methode 3; der Coleopteren 161.
Psilura monacha L., Vernichtung der Raupen durch Witterungseinflüsse 129.
Psodos alpinata Sc. 40.
Pterodonta Austaut, novum genus, errichtet für gorgoniades H. S. 29.
Pterogon (Pterodonta) gorgoniades H. S. 30.
Pteroloma forstroemi Gyllh., Vorkommen im sächsischen Erzgebirge 166.
Puppe von Boarmia jubata Thbg. 129; von Teracolus daira v. nouna Luc. 142.
Puppenkasten 68.
Puppenlager von Lemonia dumi L. 197, 198.
Puppenruhe kurze, bei Cerura bifida Hb. 118; bei Smerinthus ocellata L. 203.
Pyrameis atalanta L., Zwergform 67; ab. et v. nana Schultz 67.
Pyrameis cardui L., Erkennung der angestochenen Puppen 187.

Quecksilber, seine Verwendung bei der Raupen-Präparation 3.

Raupe von Acronicta menyanthidis View., in ihren einzelnen Stadien 2, 6.
Raupe von Agrotis interjecta Hb., ihre ersten Entwickelungsstadien 201; ihre Nährpflanzen 201, 202.
Raupe in ihren Entwickelungsstadien von Antheraea yamamai Guér. 82; von Caligula japonica Butler 83; von Hyperchiria io Fabr. 85; von Attacus cynthia Drury 86; von Platisamia cecropia Hb. 91.
Raupe von Boarmia jubata Thbg., ihre Entwickelungsstadien 98; Gestalt und Dimensionen 107; Variation 116; Entwickelungszeit 116; Gewohnheiten 116; biologischer Wert der Raupenfärbung 116; Nährpflanzen 127; Verpuppung 127; Puppe 129.
Raupe von Lycaena coridon Poda, ihre Gewohnheiten 117; von Teracolus daira v. nouna Luc. 141; von Thecla w-album Knoch., Gewohnheiten und Schutzfärbung 108; von Zephyrus betulae L., ihre Gewohnheiten 108.
Raupenpräparation, eine neue Methode 3.

Sammeln der Buprestiden 131; der Cerambyciden 149.
Saperda perforata Pall., Fang 167.
Saturnia pyri Schiff., Verfärbung der Raupe vor der Verpuppung 173.
Satyrus atlantis Austaut 29.
Schmarotzer in Schmetterlings-Raupen und -Puppen 69; Erkennung ihrer Gegenwart in den Puppen von Papilio machaon, hospiton und Pyrameis cardui 186.
Schmetterlingsköder, Bereitung 178.
Schutzfärbung 91; der Raupe von Thecla w-album Knoch 108.
Selenephera lunigera Esp. und ab. lobulina Esp., Zucht 200.
Sesia rufibasalis Bartel 191.
Smerinthus hybrid. leoniae Stndf., Zucht 148.
Smerinthus ocellata L., schnelle Entwickelung 203.
Smerinthus populi L., Aberrationen 90, 157; ab. ferrugineafasciata Gillmer 90; ab. rufescens Selys-Longch. 158.
Species-Begriff 49.
Stauropus fagi L., Zucht aus dem Ei 172.
Subspecies und ihre Bezeichnung 199.
Symbiose zwischen Lycaenen-Raupen und Ameisen 118.

Tachyris nero F., Lokalrassen 45.
Tachyris nero F. 45; nero baweanicus Fruhst. 45; nero figulina Butl. 45; nero zarinda Boisd. 45.
Temperatur-Experimente 11.
Temperaturoptimum für Lepidopteren 179, für Hymenopteren 183, für Orthopteren 183, für Dipteren 183; sein Einfluß auf den Insektenflug 184.
Teracolus daira v. nouna Luc., Beiträge zur Lebensgeschichte 141.
Thecla ilicis Esp. v. mauretanica Stdgr. ab. fountaineae Aigner 209.
Thecla w-album Knoch, Gewohnheiten und Schutzfärbung der Raupe 108.

Ueberliegen der Puppen von Cucullia scrophulariae Capieux 218.
Uebersicht der austro-malayischen Phaedyma 100.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ueberwinterung der Puppen von Stauropus fagi L. 173; der Raupen von Selenephera lunigera Esp. und ab. lobulina Esp. 200.
Unterart und ihre Bezeichnung 199.

Vanessa antiopa L. ab. 180; urticae L., ihre Schmarotzer 69.
Variabilität von Arctia flavia Fuessly 1; von Callimorpha dominula L. 10; von Aglia tau L. 108; von Boarmia jubata Thbg. 134.
Varietäten von Arctia flavia Fuessly 10.
Veränderungen in der Fauna der Großschmetterlinge von Chemnitz und Umgegend 180.
Verbreitung: Acronicta menyanthidis View. 42, 132; Boarmia jubata Thbg. 136; Lycaena bellargus Rott. 151; Plusia festucae ab. coalescens Schultz 133.
Verfärbung der Raupen vor der Verpuppung 148, 173.
Verpuppung der Raupe von Boarmia jubata Thbg. 127; von Lemonia dumi L. 197, 198; von Lycaena coridon Poda 126.
Vorkommen seltener Käfer, Fliegen, Hautflügler und Wanzen im sächsischen Erzgebirge 166, 178.

Wanzen, seltene, im sächsischen Erzgebirge 178.
Wetterregeln 165.
Witterungseinflüsse auf das Insektenleben 129, 165, 179.

Zephyrus betulae L., Gewohnheiten der Raupe 107.
Zucht: einige Ratschläge für Zucht 68.
Zucht von Acronicta menyanthidis View. 24; von Arctia villica ab. konewkai Frr. 25; der Catocalen 216; von Ergates faber L. 153; von Hybernia marginaria Bkh. ab. denigraria Uffeln 14, 18; von Lemonia dumi L. 197, 206; von Pericallia matronula L., sonderbare Ergebnisse 172; von Selenephera lunigera Esp. ab. lobulina Esp. 200; von Smerinthus hybrid. leoniae Stndf. 148; von Stauropus fagi L. 172.
Zuchtglas 68.
Zusammenhang zwischen Insektenleben und Wetter 165.
Zustandsformen 199.
Zwergformen von Lycaena baton Bergstr. 74; von Pyrameis atalanta L. (ab. et v. nana Schultz) 67; von Pyrameis cardui L. (v. minor Canlo) 67; von Vanessa io L. (ab. ioides Ochsenh.) 67; von Vanessa polychloros L. (ab. pyrometas Frr.) 67; von Vanessa urticae L. (v. et ab. urticoides Fisch. und ab. pygmaea Rühl) 67.
Zwitter von Apatura ilia Schiff. ab. clytie Schiff. 21; von Lycaena icarus Rott. 157; von Ocnogyna corsicum Rbr. 157.
Zygaena. Ein Vorschlag für eine neue Zusammenstellung der Zygaenenarten des europäischen Faunengebietes 184.
Zygaena carniolica Sc. ab. vángeli Aigner 209; erythrus Hb. ab. irpina Zkt. 117; oxytropis B. ab. confluens Zkt. 117, ab. cingulata Zkt. 117; scabiosae Scheven ab. flaveola Zkt. 117, ab. nigerrima Zkt. 117.

III. Neu beschriebene Arten und Abarten.

Abisara wallacei theodosia n. subsp. 215.
Abraxas privata n. sp. 5.
Aglia tau ab. cerberus n. ab. 115; ab. confluens n. ab. 115; ab. decaeruleata n. ab. 115; ab. ♂ decolor n. ab. 108; ab. flexilis n. ab. 115; ab. locuples n. ab. 142; ab. oblongomaculata n. ab. 115.
Aporia crataegi ab. koyi n. ab. 208.
Arctia caja ab. flava n. ab. 209.
Actia erschoffi v. selmonsi n. var. 62; ab. transversata n. ab. 62.
Arctia flavia ab. continua n. ab. 9; ab. latemarginata n. ab. 2; ab. stygialis n. ab. 2.
Arctia glaphyra ab. amabilis n. ab. 63; ab. puengleri n. ab. 63.
Arctia hebe ab. wassi n. ab. 209.
Arctia intercalaris ab. ilithyia n. ab. 55.
Argynnis dia ab. hudáki n. ab. 208.

Bapta pictaria ab. contrastaria n. ab. 172.
Boarmia gemmaria ab. rebeli n. ab. 209.
Borshomia novum genus 30.
Bulonga trilineata n. sp. 31.

Callimorpha dominula ab. radiata n. ab. 11.
Callimorpha quadripunctaria ab. perfusca n. ab. 85.
Calophasia casta ab. biróí n. ab. 209.
Cethosia biblis (?) atia n. subsp. 105.
Cethosia cydippe sangira n. subsp. 215.
Cethosia penthesilea diffusa n. subsp. 105; penthesilea paksha n. subsp. 105.
Chilades trochylus v. grisea n. var. 209.
Cynitia lepidea flaminia n. subsp. 56; lepidea matala nov. nom. 56.
Cynthia arsinoë adina n. subsp. 216; arsinoë meforica n. subsp. 216; arsinoë rebeli n. subsp. 216.

Deilemera fatua n. sp. 213.
Delias aglaja beata n. subsp. 76; aglaja goda n. subsp. 76; aglaja parthenope f. temp. sicc. 76; aglaja tonkiniana n. subsp. 76.
Delias bagoë nusana n. subsp. 89.
Delias ninus alluviorum n. subsp. 75.
Dilophodes amplificata n. sp. 22.

Euthalia adonia beata n. subsp. 63.
Euthalia apicalis chula n. subsp. 56; apicalis lioneli n. subsp. 56.
Euthalia jahnu jahnides n. subsp. 55.
Euthalia julii indochinensis n. subsp. 51; julii irma n. subsp. 46.

Gracilaria roscipennella ab. obscurella n. ab. 172.
Gullaca derasata n. sp. 77; exilis n. sp. 5.

Heliaca tenebrata ab. subtristis n. ab. 82.
Hybernia leucophaearia ab. medioobscuraria n. ab. 13.
Hybernia marginaria ab. denigraria n. ab. 14, 18.
Hypogymna morio ab. nátlyi n. ab. 209.

Isamia aegyptus tricolora n. subsp. 46.

Leptidia sinapis ab. croatica n. ab. 146; ab. flavescens n. ab. 147; ab. major n. ab. 145.
Lycaena alcon ab. pallidior n. ab. 215.
Lycaena amandus ab. ♂ stigmatica n. ab. 214.
Lycaena arcas ab. ♂ lycaonius n. ab. 215.
Lycaena bellargus ab. albofimbriata n. ab. 151; ab. ♂ confluens n. ab. 209; ab. ♂ czekelii n. ab. 209; ab. ♀ latefasciata n. ab. 214; ab. ♂ parvipuncta n. ab. 209.
Lycaena charybdis ab. exuta n. ab. 214.
Lycaena damon ab. ♂ caeca n ab. 209.
Lycaena eros ab. ♀ albopicta n. ab. 214.
Lycaena euphemus ab. paula n. ab. 215.
Lycaena eversmanni ab. amplificata n. ab. 214.
Lycaena jolas v. debilitata n. var. 18; ab. opulenta n. ab. 18.
Lycaena meleager ab. ♂ limbopunctata n. ab. 214.
Lycaena miris ab. oblitescens n. ab. 214.

Malacosoma neustria ab. unicolor n. ab. 209.
Melanargia galathea ab. franzenaui n. ab. 208.
Melanargia japygia v. clotho ab. immaculata n. ab. 208.
Melitaea aurinia ab. atricolor n. ab. 205; ab. impunctata n. ab. 205; ab. nigrolimbata n. ab. 205; ab. sebaldus n. ab. 206; ab. sesostris n. ab. 206.
Melitaea cinxia ab. ♀ horváthi n. ab. 208; ab. ♂ mocsáryi n. ab. 208; ab. ♀ uhryki n. ab. 208.
Melitaea didyma ab. ♀ fischeri n. ab. 208; ab ♀ kempeleni n. ab. 208.
Melitaea phoebe ab. ♂ geyeri n. ab. 208.
Melolontha vulgaris v. lugubris ab. nigritarsis n. ab. 44.
Mnesiloba seminigra n. sp. 76.
Morpho hecuba obidonus n. subsp. 125; hercules diadema n. subsp. 113; perseus aratos n. subsp. 126.

Parantica cleona rita n. subsp. 46.
Phaedyma columella bawcana n. subsp. 89; columella binghami n. subsp. 99; columella kangeana n. subsp. 89; columella sumbana n. subsp. 90; columella tonkiniana n. subsp. 90.
Phaedyma jumba amorosca n. subsp. 90.
Phaedyma shepherdi damia n. subsp. 100; shepherdi donata n. subsp. 100; shepherdi graziella n. subsp. 100.
Phrissogonus laticostata ab. agoniaria n. ab. 77.
Pieris napi ab. fumigata n. ab. 158.
Plusia festucae ab. et v. coalescens n. ab. 86; ab. miniana n. ab. 87.
Pterodonta novum genus 29.
Pyrameis atalanta ab. et v. nana n. ab. 67.

Satyrus atlantis n. sp. 29.
Sesia rufibasalis n. sp. 191.

Tachyris nero bawcanicus n. subsp. 45.
Thecla ilicis v. mauretanica ab. fountaineae n. ab. 209.

Zygaena carniolica ab. vángeli n. ab. 209; erythrus ab. irpina n. ab. 117; oxytropis ab. cingulata n. ab. 117; ab. confluens n. ab. 117.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

IV. Bücherbesprechungen.

Mitteilungen des Entomologischen Vereins für Hamburg-Altona 1899—1904. Anhang: Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgegend Hamburg-Altona's v. O. Laplace 20.
Bingham, C. F.: The fauna of British India including Ceylon and Burma Butterflies. Vol. I. 48.
Gillmer, M.: Mimas tiliae L. 77.
Reinecke, W.: Verzeichnis der Großschmetterlinge des nordöstlichen Harzrandes 193.

V. Vereins-Nachrichten.

Die Entomologische Ausstellung in Schwabach 159.
Gemeinschaftliche Sitzung der entomologischen Vereine zu Chemnitz und Limbach 180.

VI. Abbildungen.

Acronicta rumicis ab. salicis Curt. Seite 158 Figur 8 a und b.
Agrotis interjecta Hb., Ansicht des 7. Leibesringes der Raupe. Seite 202.
Apparat, neuer, zur Raupenpräparation. Seite 4.
Arctia erschoffi Alph. Seite 53 Figur 15.
Arctia erschoffi v. issyka Stdgr. Seite 53 Figur 16 ♂, Figur 17 ♀.
Arctia erschoffi v. selmonsi Böttcher. Seite 53 Figur 18, 19, 20 ♂, Figur 21 ♀.
Arctia flavia ab. stygialis Schultz Seite 2.
Arctia glaphyra v. manni Alph. Seite 53 Figur 4, 5 ♂, Figur 13, 14 ♀, Figur 7, 8 forma obscurata.
Arctia glaphyra v. manni ab. amabilis Böttcher Seite 53 Figur 6.
Arctia glaphyra v. manni ab. puengleri Böttcher. Seite 53 Figur 9, 10, 11.
Arctia glaphyra v. gratiosa Gr. Gr. Seite 53 Figur 12.
Arctia intercalaris Ev. Seite 53 Figur 1.
Arctia intercalaris Ev. ♂ aberr. Seite 53 Figur 2.
Arctia intercalaris ab. ilithyia Böttcher. Seite 53 Figur 3.

Boarmia jubata Thbg.
Seite 97 Figur I_1: Ei 12mal vergrößert.
Figur I_2: Ei 70mal vergrößert.
Figur II_1: Entwickelung der Raupenzeichnung in den 6 Stadien.
Figur II_2: Länge der Raupe in den 6 Stadien.
Seite 130 Figur III: Puppe vergrößert.
Seite 135 Figur IV_1 und IV_2: Schmetterling in natürlicher Größe.
Seite 130 Figur IV_6 bis IV_8 und
Seite 135 Figur IV_3 bis IV_5 und IV_9: Schmetterling 2mal linear vergrößert.
Seite 135 Figur IV_{10}: Schmetterling 4mal linear vergrößert mit Darstellung des Geäders.

Caligula japonica Butler Raupe. Seite 83.
Callimorpha dominula L. Tafel I Figur 1.
Callimorpha dominula L. aberr. Tafel I Figur 11, 12.
Callimorpha dominula ab. marita Schultz Tafel I Figur 8.
Callimorpha dominula ab. paucimacula Schultz Tafel I Figur 2 bis 7 und 9, 10.
Callimorpha dominula ab. radiata Krodel Tafel I Figur 13, 14, 15.
Cethosia biblis alceste Fruhst. Seite 106 Figur 7.
Cethosia biblis (?) atia Fruhst. Seite 106 Figur 6.
Cethosia penthesilea exsanguis Fruhst. Seite 105 Figur 5.
Cyaniris puspa hermione Fruhst. Seite 64 Figur 10.

Deilemera fatua Heyn Seite 213.
Delias bagoë nusana Fruhst. Seite 89 Figur 1.
Dilina (Mimas) tiliae ab. pallida-centripuncta Tutt. Seite 158 Figur 7.

Euploea aegyptus tricolora Fruhst. Seite 46 Figur 3.
Euthalia adonia pura Fruhst. Seite 57 Figur 7 ♂ Oberseite, Figur 8 ♀ Oberseite, Figur 9 ♀ Unterseite.
Euthalia apicalis chula Fruhst. Seite 56 Figur 6.
Euthalia julii irma Fruhst. Seite 47 Figur 4 ♂ Unterseite, Figur 5 ♀ Oberseite.

Grammesia trigrammica Hufn. aberr. Seite 158 Figur 5.
Graphische Darstellung der Längenzunahme der Raupe von I. Antheraea yamamai, II. Caligula japonica, III. Hyperchiria io S. [illegible] 92.

Lemonia dumi L., Durchschnitt eines Erdballens mit zwei Verpuppungshöhlen. Seite 197.
Leptidia sinapis L. Seite 145 Figur 1 ♂, Figur 2 ♀, Figur 3 Unterseite.
Leptidia sinapis ab. major Grund. Seite 146 Figur 4 und 7 ♂, Figur 5 ♀, Figur 6 Unterseite.
Leptidia sinapis v. lathyri Hb. Seite 146 Figur 8 und 17 ♂, Figur 9 ♀, Figur 10 Unterseite.
Leptidia sinapis ab. croatica Grund. Seite 147 Figur 11 und 14 ♂, Figur 12 ♀, Figur 13 Unterseite, Figur 15 und 16 ♂.
Leptidia sinapis v. diniensis B. Seite 147 Figur 18 ♂, Figur 19 ♀, Figur 20 Unterseite.
Lycaena amandus ab. caeca Gillmer Seite 151 Figur 1.
Lycaena argyrognomon Bergstr. ♀ Albino Seite 73 Figur 4a Oberseite, Figur 4b Unterseite.
Lycaena bellargus ab. albofimbriata Gillmer Seite 151 Figur 2.
Lycaena euphemus Hb. Seite 215 Figur 2.
Lycaena euphemus ab. paula Schultz Seite 215 Figur 3 und 4.
Lycaena icarus Rott. ♀ aberr. Seite 66 Figur 3a Oberseite, Seite 67 Figur 3b Unterseite.
Lycaena icarus Rott. Zwitter. Seite 73 Figur 4.
Lycaena meleager ab. ♂ limbopunctata Schultz Seite 214 Figur 1.

Melitaea aurinia ab. nigrolimbata Schultz Seite 205 Figur 1 und 2.
Melitaea aurinia ab. sebaldus Schultz Seite 206 Figur 4.
Melitaea aurinia ab. sesostris Schultz Seite 206 Figur 3.
Melitaea didyma O. ♀ aberr. Seite 65 Figur Ia Oberseite, Figur Ib Unterseite.
Melitaea didyma O. ♀ aberr. Seite 66 Figur IIa Oberseite, Figur IIb Unterseite.
Melitaea didyma O. ♀ aberr. Seite 66 Figur IIIa Oberseite, Seite 67 Figur IIIb Unterseite.
Morpho hecuba obidonus Fruhst. Seite 125 Figur 12.
Morpho hercules diadema Fruhst. Seite 144 Figur 10 Oberseite, Figur 11 Unterseite.
Morpho hercules richardus Fruhst. Seite 113 Figur 8 Oberseite, Seite 114 Figur 9 Unterseite.
Morpho perseus aratos Fruhst. Seite 126 Figur 13.

Ocnogyna corsicum Rbr. Zwitter Seite 157 Figur 3.

Phaedyma columella baweana Fruhst. Seite 90 Figur 2.
Phaedyma columella tonkiniana Fruhst. Seite 90 Figur 3.
Phaedyma jumba amorosco Fruhst. Seite 90 Figur 4.
Pieris napi ab. fumigata Gillmer Seite 157 Figur 4.

Smerinthus (Amorpha) populi ab. rufescens Selys-Longch. Seite 158 Figur 6.

Tabelle I und II zu: Entomologie und Meteorologie Seite 170 und 171.
Tachyris nero F. Seite 45 Figur 2.
Tachyris nero baweanicus Fruhst. Seite 45 Figur 1.
Teracolus daira v. nouna Luc. Seite 141 Figur 1 bis 6.

VII. Berichtigungen.

Seite 21 lies in der Ueberschrift: Beschreibung dreier (statt zweier) gynandromorphen Exemplare.
Seite 74 unter: Beiträge zur Morphologie und Biologie der Lepidopteren lies in Zeile 27 von unten nötig statt möglich.
Seite 92, 7. Zeile von unten lies Palaearktica statt Palaeartica.
Seite 166, 20. Zeile von unten lies Fichtelberge statt Fichtelgebirge.

VIII. Vereins-Angelegenheiten.

Kassenbericht 1904/1905. I. Beilage zu Nr. 7.
Vereins-Tauschstellen. 93, 101, 138.
Anträge zur XIX. Generalversammlung 121, 128 und Tagesordnung für dieselbe I. Beilage zu Nr. 22 und Seite 137.
Generalversammlung betreffend 132.
Protokoll der XIX. Generalversammlung 155, 161.
Vorstandssitzung am 29. Dezember 1905. 187.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Inhalts-Verzeichnis III-VIII