

I. Beilage zu No. 7. XX. Jahrgang.

(Fortsetzung aus dem Hauptblatt.)

Alle großen Raupen waren ohne Ausnahme tot und so leicht, wie eine abgestreifte Haut, waren also keiner Krankheit zum Opfer gefallen. Dagegen waren die kleinen Raupen alle gesund und munter.

Ich vermutete, daß die erwachsenen Raupen eingingen, weil sie in diesem Stadium der Entwicklung nicht an eine Ueberwinterung gewöhnt sind. Vielleicht hätten sie sich verpuppt, wenn ich sie im warmen Zimmer hätte weiter füttern können. Aufällig ist auch das ungleichmäßige Wachstum der Raupen bei der gleichen Temperatur und dem gleichmäßigen reichlichen Futter.

Im Mürztale gefundene Puppen von *B. quercus*, die ebenfalls von überwinternten Raupen stammen, sind bis heute, nachdem sie bereits seit Mitte Januar in der Wärme sind, noch nicht geschlüpft. Es überwintern also die Raupen und die Puppen schon bei einer Seehöhe von 650 m.

Fritz Hoffmann, Krieglach.

Etwas über die Entwicklung von *Cossus cossus* L.

Bei einer grösseren *cossus*-Zucht, deren Raupen einer *Paulownia imperialis* *) Sieb. entnommen waren, hatte ich Gelegenheit, in diesem Frühjahr eine eigenartige Beobachtung zu machen. Bekanntlich muß ein Schmetterling nach seinem Auskriechen eine senkrechte oder überhängende Stellung einnehmen, um seine Flügel durch Einpressen von Körperblut in die Flügeltracheen zu entwickeln. Ist das Tier aus irgend einem Grunde nicht in der Lage, diese Stellung einzunehmen, so verkrüppeln die Flügel und wachsen nur teilweise aus. Bei *cossus* ist dies nun, wie meine kleine Beobachtung beweist, anders. Nach dem Verlassen der Puppenhülle blieben nämlich manche Falter auf dem Boden des Zuchtkastens sitzen, ohne an den mit Gaze bespannten Wänden desselben aufzukriechen. Trotzdem wuchsen die Flügel schnell aus und lagen dabei dem Körper fest an, wie in der Ruhestellung des fertig entwickelten Schmetterlings. Erst als die Flügel ihre volle Größe erlangt hatten, wurden sie in die Höhe geschlagen, ohne daß sie sich dabei trotz ihrer jetzigen Weichheit gebogen hätten, und nun eine Zeitlang in der Stellung des sitzenden Tagfalters belassen, bis sie einigermaßen ausgetrocknet und gehärtet waren. Dann erst erhielten sie die endgültige Ruhestellung. Die Falter hatten also ihre Flügel vollkommen normal entwickelt, ohne die horizontale Lage auf dem Boden des Kastens zu verändern. Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, daß ein solches abweichendes Verhalten nur Arten mit sehr starkem Flügelbau möglich ist, da sonst die Flügel bei der aufrechten Stellung sich umbiegen müßten. — Herr Dr. Staudinger hat vor Jahren die gleiche Beobachtung bei einer kleinen *Cerura* gemacht und

*) *Paulownia imperialis* ist ein mittelgrosser Baum, der zu den Serophulariaceen gehört und weiches Holz besitzt. Er entstammt dem südlichen Japan, hat sehr grosse eirundherzförmige, sammetartige Blätter und blüht Mitte Mai. Die Blüten sind sehr gross, stehen in Rispen, duften herrlich, sind hellblau, oft etwas violett. Der prächtige, einen südlichen Eindruck machende Baum gedeiht nur in warmen Gegenden; starken Frost kann er nicht vertragen. Hier im sehr warmen Rheinlande mit den milden Wintern kommt der Baum gut weiter und wird vielfach als Zierbaum angepflanzt, wie viele andere südl. Gewächse.

a. a. O. publiziert. Bei *Cossus cossus* war mir ein solches Verhalten jedoch neu und wollte ich es nicht der Vergessenheit anheim fallen lassen.

Carl Frings.

Ueberliegen der Puppen von *Lem. dumii*.

In meiner Zuchtdeskription von *Lem. dumii* in No. 4 unserer Zeitschrift bemerkte ich, daß ich am 14. Januar noch drei lebende Puppen dieser Art — 2 ♂♂ und 1 ♀ — besessen hätte. Manches der geehrten Mitglieder wird diese Mitteilung mit Interesse gelesen haben, da meines Wissens ein Fall von Ueberliegen dieser Puppen noch nicht bekannt geworden sein dürfte. Ich erlaube mir nun die Mitteilung, daß heut, am 2. Mai, sämtliche 3 Puppen noch leben. Ich habe sie in einem ungeheizten Zimmer in einer Pappschachtel unter Moos und besprühe sie ab und zu ein wenig mit abgestandenem Wasser. Die Puppen von *dumi* — ich hatte die 3 Stück bekanntlich vor der Ueberwinterung ca. 4 Wochen im geheizten Zimmer — scheinen gar nicht so empfindlich zu sein, als man gewöhnlich annimmt — vorausgesetzt, daß man sie im ersten Stadium nicht gestört hat. Meine Hoffnung, im Herbst aus diesen Puppen die Falter zu erhalten, und meine Annahme, daß unter Umständen auch im Freien ein Prozentsatz der Puppen von *dumi* überwintern mag, dürfte nun immer mehr als begründet erscheinen. Das Endresultat werde ich seinerzeit zur Kenntnis bringen.

F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

Kleine Mitteilungen.

Fehlen der Totenkopfzeichnung bei *Acherontia atropos* L.



Im Sammelgebiete von Prag, bei der Villen-Ortschaft Dobrichovic, fand ich an einem Kartoffelfelde ein auffallendes Exemplar von *Acherontia atropos* ♀. Es hat eine Flügelspannung von 120 mm; die Flügelzeichnung ist deutlich ausgeprägt und das Gelb der Hinterflügel sehr lebhaft. Die gewöhnliche Totenkopfzeichnung auf dem Thorax fehlt vollständig. An ihrer Stelle steht dicht hinter dem Kopfe in der Mitte des Thorax ein gelbes Dreieck, dessen etwa 2 mm lange Grundlinie dem Kopfe und dessen Spitze dem Hinterleibe zugekehrt ist. Darunter befinden sich zwei durch schwarze Behaarung gebildete bogentörmige Streifen, welche in der Mitte des Thorax nicht zusammenfließen, während der dritte durch gelbe Behaarung gebildete Streifen quer über den Thorax hinweggeht. Den Abschluß der Zeichnung macht ein 11 mm langer und 6 mm breiter sammetschwarzer Fleck. Die übrige Behaarung des Thorax ist schwärzlich, aber stärker als gewöhnlich bläulichweiß bestäubt. Die obige Zeichnung möge die Beschreibung vervollständigen. In dem II. Bande der „palaearktischen Großschmetterlinge“ Seite 23 erwähnt Max Bartel ein

Acherontia atropos ♂ der Wiskott'schen Sammlung, welchem die Totenkopfzeichnung gleichfalls vollständig fehlt und dessen Thorax in der Mitte nur ein kleines, ganz schwarzes Fleckchen trägt.

Man vergleiche „Entomolog. Zeitschr.“ XIX, No. 17, Seite 90, wo Herr Gillmer ein ähnliches Stück von *Acherontia atropos* beschreibt.

W. Táboršky, Smichow bei Prag.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Herr Ernst Backsmann, Mittelschullehrer, Wittenberg (Bez. Halle), Lutherstrasse 16.

Herr Bernhard Müller, Bahnexpeditor, Riedenburg, Oberpfalz.

Entomologischer Verein „Lepidoptera“ Bielefeld, vertreten durch Herrn Julius Böhm, Bielefeld, Ed. Windhorststr. 15, I.

Herr Gustav Kuhn jun., Leipzig-Lindenau, Henriettenstraße 9, II r.

Herr W. Erdmann, Charlottenburg, Magazinstr. 12, I. Herr Michael Hellweger, Professor am Gymnasium „Vinzentinum“, Brixen, Südtirol.

Herr Witaut von Peltz, St. Petersburg, Wassiliostrowo, 17. Linie, Haus 20 W. 16.

Herr Arnold Schütze, Prokurist, Tangermünde Bez. Magdeburg.

Herr Rich. Schmieder, Bürgerschullehrer, Döbeln, Bez. Leipzig.

Herr S. Lohr, Bahnbeamter, Coblenz, Römerstr. 52.

Herr E. Kielreiter, Maler, Brandenburg (Havel), Altstadt. Markt 11.

Herr Jos. Müller, Lehrer, Schönfeld, Post Türmitz, Böhmen.

Herr Max Bonath, Architekt, Straßburg (Elsaß), Schweighäuserstraße 12.

Ausgetreten sind:

No. 3165. Herr Karl Joachimsthaler, Jenbach.

No. 1896. Herr P. Koechlin-Kern, Basel.

No. 431. Herr Th. Dolegny, k. k. Finanzrat, Eger, (gest.).

No. 2741. Herr Dr. von Rothenburg, Patentanwalt, Darmstadt.

Vereins-Angelegenheiten.

Das III. Heft der Sonder-Ausgabe der „Entomolog. Zeitschrift“ in Buchform ist in diesen Tagen versandt worden. Die drei Hefte des XIX. Jahrganges bringen unter Weglassung

aller Inserate auf 407 Seiten nur die Aufsätze, welche in der Zeitschrift 1905/06 erschienen sind. 17 Tafeln mit 110 Abbildungen und 2 Tabellen sind ihnen begegeben. Außerdem finden sich darin 27 Abbildungen zwischen dem Texte. Alle drei Hefte werden den Mitgliedern zum Preise von M. 1,50 geliefert.

Bestellungen auf den XX. Jahrgang in Buchform werden möglichst bald erbeten. Auch der XVIII. Jahrgang kann noch zu dem gleichen Preise abgegeben werden.

Im Juni d. J. soll das Mitglieder-Verzeichnis neu gedruckt werden.

Um unrichtige Angaben darin nach Möglichkeit zu vermeiden, werden alle Mitglieder gebeten, besonders die Adressen auf den Versandstreifen der Zeitschrift genau zu prüfen und Unrichtigkeiten in bezug auf Namen, Stand und Wohnung recht bald hierher mitzuteilen, damit sie beseitigt werden können.

Wie bisher wird auch in dem neuen Verzeichnis eine besondere Spalte zur Eintragung des Sammelgebietes vorhanden sein. Der Hinweis auf diese wenig benutzte Einrichtung wird diesmal sicher den Erfolg haben, daß alle Mitglieder die gewünschte Angabe machen.

Vereine, welche regelmäßige Sitzungen abhalten und denen dabei Gäste willkommen sind, wollen die erforderlichen Mitteilungen über Zeit und Ort der Zusammenkünfte mir recht bald zugehen lassen, damit sie zu einem „Tageskalender“ zusammengestellt werden können.

Dem Mitglieder-Verzeichnis soll wieder ein Inseraten-Appendix beigegeben werden.

Da das Verzeichnis allen Vereinsmitgliedern vielen Universitäten, naturwissenschaftlichen Instituten und Gesellschaften zugestellt wird, so sind selbstredend Inserate darin von grösster Wirkung.

Es werden berechnet:

für eine ganze Seite (12×20 cm Druckfläche)	12 M.
für eine halbe Seite	7 M.
für eine viertel Seite	4 M.
für eine achtel Seite	3 M.

Für die erste und letzte Seite werden, so weit die Aufträge berücksichtigt werden können, die doppelten Preise berechnet.

P. Hoffmann.

Soeben erschien

meine neue Preisliste (Nr. 53) [Nachtrag zu Nr. 44] über Utensilien für Naturaliensammler mit zahlreichen Illustrationen.

Zusendung auf Verlangen gratis und franko.

Ernst A. Böttcher,
Naturalien- und Lehrmittelanstalt,
Berlin C. 2, Brüderstr. 15.

Russische Coleopteren
aus dem Gebiete des Uralflusses, Transcaspien, Krim etc. von 60 Arten mit Fundortsetiquetten, Originalsendung, billigst abzugeben. Auf Wunsch sende Liste ein.

Emil Kerler, Stuttgart, Gutenbergstr. 118.

Mehrere Hundert Maikäfer in Spiritus abgetötet und mehrere Hundert nicht in Spiritus abgetötet, genadelt, kauft und bittet um Angebote.

E. Rey, Berlin NW., Turmstr. 19 III.

Ausl. Käfer aus verschiedenen Erdteilen, nur prächtige und bessere Arten, wie Calc. v. hesperus, Protoc. laetus, Chrysochroa, Sternocera, Eudicella, die seit. Conradia principalis etc. 50 St. in ca. 50 Arten nur 10,50 M. franko empfiehlt

Jul. Arntz, Elberfeld.

Lebende Käfer.
Aromia moschata in grösserer Anzahl, sowie Frassstücke in Nussbaumholz habe gegen Schmetterlinge oder deren Zuchtmaterial im Tausch abzugeben und bitte um Angebote.

Fritz Isselmann, Köln, Burgunderstr. 21.

Colopteren-Sammlung,
sauber gehalten, mit vielen guten Arten in 26 Glaskästen 38×54×6 1/4, auch für Schulzwecke geeignet, ist gegen exot. u. palearkt. Lepidopteren zu vertauschen oder billig zu verkaufen.

L. Hartmann, Würzburg,
Domherrenstrasse 6.

Platypus var. cylindriformis Reitt.

♂♂ und ♀♀
gibt ab im Tausch gegen seltene andere Scolytiden.

Forstassessor Strohmeyer, Niederbronn (Elsass).

Mozambique-Käfer

aus neuer Ausbeute gebe folgende hochfeine Serien ab:

100 St. in 50 Arten	15,— M.
50 St. in 30 Arten	8,— M.
25 St. in 20 Arten	6,— M.

darunter viele grosse Prachtarten, wie *Dicranorrhina derbyana*, *Sternocera bertolini* etc., alles bestimmt und genadelt mit Fundortangaben.

— In luftdichten Insektenkästen eingeordnet 2—5 M. mehr.

P. Ringler,
Vertrieb überseeischer Naturalien,
Halle a. S., Viktoriaplatz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen 53-54](#)