

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.

Central-Organ des Entomologischen Internationalen Vereins.

Herausgegeben

unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint im Sommerhalbjahr monatlich vier Mal. Insertionspreis pro dreigespaltene Petit-Zeile oder deren Raum 20 Pf. — Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vereinsjahre 100 Zeilen Inserate frei.

Inhalt: Neue Schmetterlinge von den Batu-Inseln. (Fortsetzung.) — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Korsika. (Fortsetzung.) — Vereins-Angelegenheiten.

— Jeder Nachdruck ohne Erlaubnis ist untersagt. —

Neue Schmetterlinge von den Batu-Inseln.

Von H. Fruhstorfer.
(Fortsetzung aus Nr. 16.)

B. Nymphalidae.

6. *Limnitis procris batuna* Fruhst.

Diese neue Inselrasse bildet eine der größten Ueberraschungen der Batu-Falterserie. Man konnte auf Batu eine Form erwarten, die sich *aemonia* Weymer von Nias oder *laubenheimeri* Hagen von Mentawey nähern würde, statt dessen erscheint die landläufige kontinentale *procris* in einer Subspecies, die sich innig an die javanische *neutra* Fruhst. anschließt und *milonia* Fruhst. (Gubener Entomologische Zeitschrift 1. Jnni 1906 p. 62) mit *neutra* verbindet.

Batuna hat mit *neutra* die sehr breiten, weißen Medianbinden aller Flügel gemeinsam, ebenso die prominente, weiße Submarginallinie, die bei *milonia* fehlt. An *milonia* erinnert der große, weiße Fleck vor dem Apex der Vorderflügel-Zelle, der bei *batuna* mindestens dreimal breiter ist, als bei *neutra*.

Die subapikale Reihe weißer Flecken auf den Hinterflügeln besteht aus vier ungleichgroßen Makeln, die erheblich größer als bei *neutra* ausfallen, während sich bei *milonia* deren überhaupt nur 2 einstellen.

Die Unterseite meines Exemplares trägt die Merkmale einer Trockenzeitform und erinnert durch den breiten weißlich violetten distalen Bezug aller Flügel an *procris* forma *chlaua* Fruhst. von Sikkim; dadurch entfernt sie sich von *milonia* aus Sumatra, die nur einen ganz geringen weißlichen, distalen Anflug aufweist.

7. *Pantoporia nefte cordigera* Fruhst.

Die *Pantoporia nefte*-Form der Batu-Inseln entfernt sich durch ihr einfaches, farbenarmes Kolorit recht auffallend von der bunten *glora* Kheil aus Nias, und nähert sich mehr *nefte* Cramer von Java.

Mit *glora* hat *cordigera* die stark verbreiterte peripherisch ungewöhnlich rein hell blauviolett schimmernde Medianbinde der Vorderflügel gemeinsam.

Die Submarginallinie der Vorderflügel ist weißlich, die drei subapikalen, sehr breiten, ziemlich gleich großen Flecken erscheinen nur nach unten (proximal) violett gesäumt.

Die Hinterflügel tragen eine sehr breite distale und eine schmale viel längere submarginale, weiße Binde, außerdem noch eine obsolete Antemarginallinie.

Unterseite: Einfarbig graubraun mit dunkleren kostalen und medianen Flecken und dem üblichen analen blaugrauen Anflug der Hinterflügel. Antemarginalbinde aller Flügel ausgedehnter als auf der Oberseite.

8. *Lebadea pava* Fruhst.

♂: Oberseite braungrau mit der üblichen *Lebadea*-Zeichnung, deren Weiß verglichen mit *atankara* Horsf. von Java oder *wallacei* Moore von Sumatra stark reduziert ist.

Die sehr deutliche, schwarze Submarginalbinde auf allen Flügeln nur undeutlich weiß begrenzt. Die Vorderflügel tragen dann noch eine postmedianen Reihe von zumeist halbmondförmigen Flecken, die am Kostalrand beginnen, im Analwinkel enden. Jenseits des Zellapex stehen 3 längliche, weiße Makeln und unterhalb der Zelle lagern noch 4 weiße Medianflecken zwischen den Medianadern und der SM.

Die Hinterflügel zeigen eine Reihe von 7 weißen medianen Helmflecken, mit denen parallel und proximal noch eine zweite subbasale Binde verläuft, deren oberster Fleck etwa 2 mm breit ist, während sich die unteren zu fadendünnen Linien verjüngen.

Unterseite: Gelblich grau, auf den Vorderflügeln wiederholt sich die weiße Zeichnung der Oberseite, die sich indes verbreitert, so daß die äußere und innere marginale Binde stellenweise zusammenfließen.

Auf den Hinterflügeln schlagen die beiden Medianbinden ganz obsolet durch; auf beiden Flügeln hebt sich aber die gewellte hier braune, anstatt schwarze, submarginale Wellenlinie recht prägnant ab. *Pava* ist die erste *Lebadea*, die auf den S.-W.-Satellit-Inseln von Sumatra gefunden wurde.

9. *Cynthia erota kohana* Fruhst.

Bei dieser Lokalrasse finden wir eine Verdunkelung der Oberseite vereinigt mit bemerkenswerter Aufhellung der Flügelunterseite.

Kohana, eine kleine Inselform mit ungewöhnlich langen und spitzen Schwänzen, steht nächst *orahilia* Kheil von Nias, von der sie durch die reduzierte mediane Schwarzpunktierung der Vorderflügel-Oberseite leicht zu unterscheiden ist.

Die Hinterflügel weisen eine scharf abgesetzte weiblich violette mattglänzende Distalregion auf, die an *austrorudana* Fruhst. von den kleinen Sunda-Inseln erinnert.

1 ♂ Poeloe Tello.

10. *Chersonesia rahria sanna* Fruhst.

♂: Nur wenig heller als *apicusta* Hagen von Mentawai, alle Längsbinden apikalwärts stärker gebogen.

Unterseite: Heller, Binden markanter;

♀: Außergewöhnlich reich dekoriert mit hellgelblichen Flecken auf der Oberseite, die sich unterseits wiederholen und dort bläulich violett erscheinen. Alle Längsbinden wesentlich breiter als beim ♂.

II. *Cethosia cyane* nov. subspec.

Eine *Cethosia* nahe *hypsinia* Feld. von Sumatra und *pallansea* Hagen von den Mentawai-Inseln wird Herr Stichel in den Genera Insectorum, Subfamilie *Dioninae*, beschreiben.

(Fortsetzung folgt.)

Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Korsika.

Von Heinrich Bickhardt, Ober-Postpraktikant, Erfurt.

(Fortsetzung.)

Clambus minutus Strm. — Vizzavona.
Arthrolips humilis Rosenh. — Ajaccio (Budtz).
Trichopteryx fascicularis Hbst. — Vizzavona.
 „ *intermedia* Gillm. — Vizzavona.
Hister major L. — Bastia.
 „ *cadaverinus* Hoffm. — Vizzavona.
Carcinops minima Aubé. — Ajaccio (Budtz).
Paromatus complanatus Panz. — Ajaccio (Budtz).
Saprinus semistriatus Scrib. — Vizzavona.
Plegaderus pusillus Rossi. — Ajaccio (Budtz).
Brachypterus glaber Steph. — Vizzavona.
Epuraca melina Er. — Vizzavona.
 „ *pusilla bickhardti* Dev. (nov. subspec.). — Vizzavona.
Metigethes brassicae Scop. var. *australis* Küst. — Bastia.
 „ *planusculus* Heer. — Ajaccio, Costeglia, Corte.
 „ *obscurus* Er. — Bastia, Vizzavona.
Thalycra fervida Oliv. — Vizzavona.
Pityophagus laevior Abeille. — Vizzavona.
Rhizophagus ferrugineus Payk. — Vizzavona.
Silvanus unidentatus Ol. — Ajaccio (Budtz).
Henoticus serratus Gyll. — Vizzavona.
Cryptophagus scanicus L. — Bastia, Corte, Vizzavona.
 „ *thomsoni* Reitt. — Vizzavona.
 „ *dentatus* Hbst. — Vizzavona.
 „ *distinguendus* Sturm. — Vizzavona.
Caenoscelis subdeplanata Bris. — Vizzavona.
Atomaria umbrina Gyll. (?). — Costeglia.
 „ *prolixa* Er. — Vizzavona.

Otobrus bicolor F. var. *apicatus* Guilleb. — Bastia.
 „ *liquidus* Erichs. — Bastia.
 „ *aenescens* Küst. — Costeglia.
Lathridius nodifer Westwood. — Vizzavona.
Corticaria distinguenda Com. — Bastia.
Antonium ruficornis Oliv. — Vizzavona.
Endophloeus spinulosus Latr. — Vizzavona.
Coxetus pictus Sturm. — Vizzavona.
Ceryton histeroides F. — Vizzavona.
 „ *ferrugineum* Steph. — Vizzavona.
Eudomychus coccineus L. — Vizzavona.
Epilachna chrysomelina F. — Bastia.
 „ *chrysomelina* F. var. *hieroglyphica* Sulz. — Bastia.
Rhizobius titra F. — Bastia.
Scymnus auritus Thunb. — Bastia.
 „ *subvillosus* Goeze. — Bastia.
 „ *damryi* Wse. — Bastia, Corte, Costeglia.
 „ *interruptus* Goeze. — Bastia.
 „ *pulchellus* Hbst. var. *pictus* Gyll. — Bastia.
Platynaspis luteorubra Goeze var. *confluens* Muls. — Bastia.
Chilocorus bipustulatus L. — Bastia.
Exochomus quadripustulatus L. — Bastia.
Coccinella conglobata L. var. *rosea* Deg. — Ajaccio (Budtz).
 „ *conglobata* L. var. *gemella* Hbst. — Bastia.
 „ *sempunctata* L. — Bastia, Ajaccio, Corte, Vizzavona.
 „ *undecimnotata* Schneider var. *fulvimana* Motsch. — Bastia.
Cercyon flavipes F. — Vizzavona.
 „ *pygmaeus* Illig. — Vizzavona.
Megasternum obscurum Mrsh. — Vizzavona.
Hydraena vodozi Dev. (nov. spec., ined.). — Vizzavona.
Dermestes rufipennis F. — Vizzavona.
 „ *frischii* Kugel. — Bastia.
 „ *mutulatus* Brahm. — Vizzavona.
Hadrotoma variegata Küst. — Bastia, Vizzavona.
Anthrenus pimpinellae F. var. *delicatus* Kiesw. — Bastia, Ajaccio (Budtz).
 „ *pimpinellae* F. var. *latefasciatus* Reitt. — Bastia.
 „ *scrophulariae* L. var. *atbidus* Brullé. — Bastia.
 „ *verbasci* L. — Bastia, Corte, Costeglia.
 „ *verbasci* L. var. *nitidulus* Küst. — Bastia, Costeglia.
Helodes genei Guér. — Bastia, Corte.
Elater sanguineus L. — Vizzavona.
 „ *pomoniae* Steph. — Vizzavona.
Cardiophorus argiolus Gené var. *fascicollis* Gené. — Ajaccio, Costeglia.
 „ *argiolus* Gené var. *nesticus* Buys. — Ajaccio, Bastia.
 „ *eleonora* Gené. — Bastia.
Athous corsicus Reiche. — Vizzavona.
Throscus carinifrons Bonv. — Ajaccio.
 „ *corsicus* Reitt. — Costeglia.
Capnotis tenebricosa F. — Ajaccio.
Ancylochira flavopunctata Deg. — Ajaccio, Vizzavona.
Eurythyrea micans F. — Ajaccio.
Anthaxia millefolii F. — Bastia.
 „ *croesus* Vill. — Bastia, Ajaccio.
 „ *grammica* Lap. — Bastia.
Trachys corusca Ponza. — Bastia, Corte.
Lygistopterus sanguineus F. — Vizzavona.
Lampyris tareyniei Duv. — Ajaccio.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Neue Schmetterlinge von den Batu-Inseln 121-122](#)