

reingelb, sondern mehr grau, nur zumeist stärker schwarz überpudert. ♀. Oberseits aber ärmer an schwarzer Beschuppung. Type von Tivoli bei Rom. ♂) gen. aest. *rossi* Stefan. Habituell gleichfalls kleiner als die korrespondierende dalmatinische Generation asta, oberseits mit kleineren schwarzen Flecken, unterseits fahler und mehr weisslich statt gelb.

Pieris rapae leucosoma Schawenda gen. vern. *vaga nova*.

Für die Frühjahrsform der kleinasiatischen *rapae*-Rasse führe obige Bezeichnung an. *Vaga* erinnert durch die stets reduzierte Schwarzfleckung und den absolut schwarzen Apicalbezug an *leucotera* Stef., von der sie aber auch bei den ♀ durch schmalere Flügel-form zu unterscheiden ist. — Patria: Smyrna. Dr. L. Martin, April—Juni leg.

P. rapae forma atomaria nova.

In Dalmatien scheint sich eine Subspecies von *rapae* zu entwickeln, ausgezeichnet durch stattliche Grösse und eine sowohl bei der Frühlings- wie Sommergeneration häufig wiederkehrende, auffallende schwarze Bestäubung der Basis, besonders der Vorderflügel (*forma atomaria* oder *subspec. nova*).

Zwei neue paläarktische Neptis.

Von H. Fruhstorfer, Genf.

Oberthür hat 1906 in den Lepid. Comparée die von Leech, Staudinger-Rebel und mir bisher als eine Kollektivart behandelten *Neptis thisbe* — *themis* — *thetis* in 3 Arten zerlegt und ich glaube mit Recht. Mir ging neuerdings neben *thisbe* aus der Amurgegend auch eine neue *themis*-Rasse zu, die ich als *N. themis ilos* nov. *subspec.* bezeichnen möchte. Habituell kleiner als *themis* vom gebirgigen Westchina, alle gelben Bänder und Flecken reduziert, so namentlich der gelbe Streifen in der Zelle und die zweite kleinere subapicale Makel der Vorderflügel. Basalfeld der Vorderflügelunterseite weiss, nicht schwarz wie bei *themis*. — Patria: Amurgebiet, 2 ♂ Koll. Fruhstorfer.

Themis theodora Obthr. ist eine weitere Rasse aus Yunnan.

N. sankara segesta nov. *subspec.*

Kommt der Figur 1 von *Neptis amba* Leech T. 19 der Bull., China, nahe. Alle ockergelben Binden aber noch wesentlicher verbreitert, was auch für die weissen Binden der Flügelunterseite gilt, wodurch sie auch von *antonia* Obthr. differenziert ist. — Szetschuen, Omi-Shan.

Eine neue Lethe-Rasse aus Tonkin.

Von H. Fruhstorfer, Genf.

Lethe syrcis diunaga nov. *subspec.*

Kleiner und oberseits satter graubraun als die aus Nordchina von Hewitson beschriebene *syrcis*. Die schwarzen Ocellen der Hinterflügel viel grösser, weniger deutlich gelb geringelt.

Unterseite: Wesentlich dunkler, Grundfärbung mehr braun statt gelbgrau und die Längsbinden, namentlich jene der Hinterflügel, rot- anstatt gelbbraun. Die Antemarginalbinden aller Flügel viel breiter angelegt — rauchbraun statt hellgrau. — Patria: Tonkin, Montes Mauson, April bis Mai 1900 auf ca. 3000' Höhe, H. Fruhstorfer leg.

Syrcis ist eine der schönsten bekannten *Lethe*-Arten, eine echt chinesische Art, die hier zum ersten-

mal ausserhalb Chinas (allerdings aber nur von einem Grenzgebirge, dessen Nordflanken unter chinesischer, dessen Südabhänge unter französischer Herrschaft stehen) nachgewiesen.

Wir haben somit:

syrcis syrcis Hew. 1863 (Leech p. 37, Moore Lep. Ind. p. 270). Von Mou-pin bis Südchina.

syrcis diunaga Fruhst. Tonkin.

Kleine Mitteilungen.

***Callosamia angulifera carolina*.** Die nordamerikanischen Nachtpfauenaugen erfreuen sich infolge des Massenimportes ihrer Puppen nach Europa auch in der alten Welt allgemeinen Interesses. Selbst manche sonst ausschliesslich für paläarktisches Material zu habenden Sammler machen sich zeitweise das Vergnügen, eine Anzahl der bekannten Nearktiker-Puppen anzuschaffen; es ist allein doch schon eine dankenswerte Beschäftigung, sich diese Riesenpuppen, von denen fast nicht eine versagt, einzusetzen, um den Faltern später die Freiheit zu geben und zuzuschauen, wie die kräftigen Flieger ihren Weg ins Freie nehmen. Trotz dem massenhaften Vorkommen der meisten *Saturniden* werden doch selbst drüben noch beständig neue Rassen entdeckt; wir brauchen bloss an die neuentdeckten *rothschildia*, die amerikanischen Vertreter der altweltlichen *Attacus*, zu erinnern, von denen auch sicher noch manches Neue zu erwarten ist. Zu den bisher bekannten Formen, nämlich:

promethea Drur. aus der Union

angulifera Wkr. von den Südstaaten

securifera Maass und Weym., Central-Amerika

calleta Westw., Mexiko etc.,

ist noch eine Nebenform der *angulifera* gekommen, *carolina*, von der Frank, M. Jones, Wilmington, Del. Mitteilungen über die Jugendzustände macht. Die Puppen wurden nur an *Magnolia glauca* in Carolina gefunden und schon die Machart der Cocons verriet etwas Besonderes. Er unterschied sich von dem *angulifera*-Cocon durch den bei dieser Form seltenen, bei *carolina* sehr langen Stiel, durch Grösse und lockereres Gewebe. Der Falter (♂) hat nur auf dem Vorderflügel ein kleines Häkchen, auf dem Hinterflügel aber nichts von einer Mittelmakel. Von den sonst ähnlichen *calleta* ♂ unterscheidet er sich sofort durch das Fehlen des weissen Submarginalbandes. Wir machen auf diese Details, die wir den »Entom. News« entnehmen, hier aufmerksam, weil sicher zahlreiche Mitglieder *Callosamia*-Puppen aus Carolina beziehen und es für sie wichtig ist, diese Seltenheiten, die wahrscheinlich den *C. promethea*-Puppen zuweilen untergemengt sind, schon am Cocon zu erkennen.

Für das Mitglied 4548. (Eingesandt.) Gegen das **Jucken von Raupenhaaren** ist *Perubalsam* ein sehr gutes Mittel. Ich bin selbst gegen Raupenhaare sehr empfindlich und wende das Mittel schon viele Jahre an. Nur muss man sich beim Bestreichen der Hautstellen in acht nehmen, dass die Leibwäsche davon befreit bleibt, es gibt sonst leicht Flecke.

Druckfehler-Berichtigung.

In Nr. 7 der Entom. Zeitschr. ist auf S. 37, rechte Spalte, Zeile 6 von unten und auf S. 38, linke Spalte, Zeile 1 oben statt „ab. identata“ vielmehr „ab. indentata“ (= ungezähnt) zu lesen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Zwei neue paläarktische Neptis 42](#)