

holt er die beiden Namen mit ihren Nummern und erklärt bestimmt: „*Idas femina est*“.

(Fortsetzung folgt.)

## Makrolepidopteren von Görz und Umgebung.

Beitrag zur Kenntnis der Fauna des österreichischen Küstenlandes.

Von J. Hafner, Laibach.

(Fortsetzung.)

153. *Cosmotriche potatoria* L. Raupen im Grojnatale gefunden.

154. *Epicuaptera tremulifolia* Hb. Lichtfang, 8. Mai (Philipp).

155. *Gastropacha quercifolia* L. Nicht selten am Licht, vom Anfang bis Ende Juni und wieder im August-September (Philipp). Ab. *hoegei* Henäcker. Lichtfang am 24. September 1905 (Hafn.).

156. *Odonestis pruni* L. Anfangs Juni Lichtfang (Philipp). Eine Zucht ab. *oro* ergab einzelne Falter der II. Generation bereits im letzten Julidrittel (21. VII.) und weitere im August. Etwa die Hälfte der Raupen schickte sich im Oktober zur Ueberwinterung an; drei davon verpuppten sich jedoch noch und lieferten anfangs November die ab. *prunoides* Stgr. (Philipp).

157. *Lemonia taraxaci* Esp. Lichtfang, 25. und 28. September (Philipp).

158. *Perisomena caecigena* Kupido. Raupen bei Sesana auf Eichen in Anzahl gefunden. Die Schmetterlinge schlüpften im Oktober (Splich., Winkl.).

159. *Saturnia pyri* Schiff. Ende April, Mai, häufig. Raupen auf *Fraxinus excelsior* und auf Rosskastanien. Durchschnittlich grösser als Dalmatiner.

160. *Saturnia pavonia* L. Im Grojnatale, bei Salcano und bei Manfalcone, nicht häufig. Grosse, lebhaft gefärbte Exemplare.

161. *Drepana falcatoria* L. Ein ♂ im Grojnatale am 4. Mai 1906 gefangen.

162. *Drepana binaria* Hufn. Lichtfang, ohne Datum (Philipp).

163. *Cilix glaucata* Scop. Ohne Datum (Philipp); 4. September 1896 bei Comelli ob Cronberg gefangen (Preiss.).

164. *Thyris fenestrella* Scop. Am Isonzoufer bei Strazig Ende Juni, anfangs Juli, auf Rubusblüten sehr häufig. Auch im Grojnatale angetroffen.

165. *Demas coryli* L. Lichtfang, 9. und 15. April (Philipp).

166. *Acronicta aceris* L. Lichtfang am 1. Juni und e. l. am 23. Juli (Philipp).

167. *Acronicta megacephala* F. Ein Stück bei einer Laterne in Strazig gefunden, 5. Juni 1905.

168. *Acronicta alni* L. Lichtfang, ohne Datum (Brandstetter).

169. *Acronicta tridens* Schiff. Einige Stücke bei Haidenschaft an alten Mauern (Mann).

170. *Acronicta psi* L. Lichtfang, 27. Mai (Philipp); Köderfang im August (Hafn.).

171. *Acronicta euphorbiae* F. Sesana (Winkl.). 1

172. *Acronicta rumicis* L. Bereits anfangs April beobachtet. Im August, September gemein am Köder,

173. *Craniophora ligustri* F. Lichtfang, 22. April-29. Juli (Philipp); Köderfang, 27. August 1907, ein aberatives Stück mit verschwommener Zeichnung (Hafn.).

174. *Agrotis janthina* Esp. Ueberall in der Umgebung in Hecken, nicht selten, Anfang Juni bis gegen Ende August. Auch am Köder.

175. *Agrotis fimbria* L. Bei Salcano (Abhänge) aus einer Hecke gescheucht, 29. Juni 1905; auch im August am Köder gefangen.

176. *Agrotis pronuba* L. mit ab. *innuba* Tr. e. l. 21. Mai; August, September am Köder nicht selten.

177. *Agrotis orbona* Hufn. Ein Stück am Köder, 16. Oktober.

178. *Agrotis comes* Hb. Juni, Juli, Lichtfang (Philipp).

179. *Agrotis castanea* v. *neglecta* Hb. Lichtfang, ohne Datum (Philipp).

180. *Agrotis baja* F. Lichtfang, 24. Aug. (Philipp).

181. *Agrotis c-nigrum* L. Lichtfang, 6. und 22. Mai (Philipp). Im August, September am Köder ziemlich häufig. Noch am 20. Oktober ein frisches Stück angefl.

182. *Agrotis xanthographa* F. Ziemlich häufig am Köder. Ende August, September.

183. *Agrotis plecta* L. Im August nicht selten am Köder.

184. *Agrotis putris* L. Wie die vorige.

185. *Agrotis exclamationis* L. E. l. 19. Mai. Ende Juli bis September gemein am Köder. Sehr variabel.

186. *Agrotis obelisca* Hb. mit ab. *ruris* Hb., ab. *villiersi* Gn. und Uebergängen, Ende August, Anfang Septbr. nicht selten am Köder. (Determinavit Wagn.).

187. *Agrotis ypsilon* Rott. Lichtfang, 18. April (Philipp); August bis Oktober am Köder ziemlich häufig.

188. *Agrotis segetum* Schiff. Lichtfang, 22. Mai (Philipp); August, September am Köder häufig; schöne, scharf gezeichnete Exemplare.

189. *Agrotis saucia* Hb. mit Uebergängen zu ab. *margaritosa* Hw. Im August einige Stücke am Köder erbeutet. Im Jahre 1905 noch am 4. Dezember ein frisches Stück am Licht gefangen.

190. *Agrotis crassa* Hb. v. *lata* Tr. In der zweiten Augsthälfte und noch Anfang September nicht selten am Köder.

191. *Agrotis prasina* F. Lichtfang, 18. Juli (Philipp).

192. *Pachnobia rubricosa* F. März (16. III.) und im April einige Stücke am Licht erbeutet (Hafn., Philipp).

193. *Mamestra leucophaea* View. An den Abhängen bei Salcano an Steinen sitzend angetroffen, 9. und 20. Mai.

194. *Mamestra brassicae* L. Im Juli, August, ziemlich häufig am Köder; grosse, scharf gezeichnete Stücke.

195. *Mamestra persicariae* L. Lichtfang, 25. Juni (Philipp); ab. *unicolor* Stgr. Lichtfang, ohne Datum (Brandstetter).

196. *Mamestra oleracea* L. Lichtfang, 6. Mai (Phil.); am Köder häufig, Juli bis Oktober. Ab. *obscura* Spul., 20. August 1907 (Hafn.).

197. *Mamestra genistae* Bkh. Lichtfang, 5., 27. Mai, 17. Juni (Philipp).

198. *Mamestra dissimilis* Knoch. Nicht selten am Köder im August,

199. *Mamestra trifolii* Rott. Köderfang, 13. August und 13. Oktober.

200. *Mamestra chrysozona* Bkh. Köderfang, 25. August 1906 (Hafn.); 11. August 1892 (Preiss.).

201. *Mamestra serena* F. 2. Juli (Philipp). Auch im August am Köder (Hafn.).

202. *Dianthoecia cucubali* Fuessl. 8. Aug. (Philipp); bei Manfalcone, 9. August (Hafn.).

203. *Dianthoecia carpophaga* Bkh. Licht- und Köderfang; auch bei Salcano an Felsen gefunden, 26. Mai, 22. Juni, 27. August.

204. *Miana strigilis* Cl. Mitte Mai einige frische Stücke an einer Mauer gefunden.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Hafner J.

Artikel/Article: [Makrolepidopteren von Görz und Umgebung - Fortsetzung 67](#)