© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Schultz führt zwei „Hippothoë ♀♀" an, welche je einen lichten Vorderflügel haben.

(Fortsetzung folgt).

Description de quelques Macrolépidoptères nouveaux ou peu connus

et notes faunistiques. [1])

Par *A. Costantini,* Modena.

Drepana binaria v. umbratula Stgr. — Plusieurs fois capturée aussi par moi à Montegibbio (Modena).

Thyris fenestrella v. nigra B.-Haas. — Monsieur A. Bang-Haas a, tout récemment, décrit cette forme dans le revue „Iris". Elle est bien noire, pas bronzée. Le saupoudrage d'orange presque tout-à-fait déparu; le collier, les palpes etc., noires; les taches vitreuses plus petites. — Tous les exemplaires indiqués par Mr. Bang-Haas (qu'ils lui sont parvenus autrement) ont étés capturés par moi, dans les basses collines de la province de Reggio-Emilia et dans l'apennin modenese. Chez nous, aussi bien qu'en Toscane [2]), elle doit se sèbstituer completèment au type.

Agrotis nictymera B. — Je l'ai prise à la lanterne en juillet passé dans l'apennin modenese. Etait inconnu jusqu'aujourd'hui l'habitat apenninique de cette Agrotis.

Agrotis cos Hb. — Plusieurs fois capturée par moi à Montegibbio (Modena).

Hydroecia leucographa Bkh. — Une superbe ♀, que j'ai trouvée sur une lanterne publique, aux environs de Modena, en octobre dernier.

Meliana flammea Curt. — Capturée par moi, en avril, aux environs de ma ville.

Leucania scirpi Dup. av. sa v. montium B. — Plusieurs fois, et en plusieurs d'exemplaires, trouvée par moi à Montegibbio (Modena), en mai, juin et (2 ème gen.) en août.

Stilbia faillae Püng. — J'ai trouvée Stilbia faillae (une unique ♀, à la mielée, aux premiers du septembre 1910) chaque année, depuis le 1907, dans la forêt Borsari à Montegibbio (Modena). Elle parait de la fin de août jusqu'à la moitié de septembre. La femelle de cette espèce n'a pas encore étée décrite. Elle est de moindre taille que le mâle. Ses ailes antérieures sont beaucoup plus étroites, avec l'angle apicale obtus. Elles ont une colorisation uniforme gris-fer, très foncé. Dessins noires, sur cette surface obscure et monotone, moins évidents que chez le mâle. Taches ordinaires très allongées (la orbiculaire fort oblique) et bien visibiles. Ailes postérieures un peu plus sombres. Les antennes sont filiformes, plus minces que celles du ♂. Palpes petites et bien aigues. La spiritrompe est bien développée.

L'oeuf (que j'ai pu avoir en assez petit nombre en sectionnant la ♀) est presque hemispherique, d'une couleur perlacée, à peine iridescente. Son plus grand diamètre est de mm. 0,9—1. La base est plane et un peu rétrecissée dans sa peripherie. Du sommet de la surface micropylaire (qui ne parait pas trop relevée) se departent ca. 24 petites crétes, egales entre elles, légèrement gravées, qui n'atteignent pas complètement la base.

Caradrina selini forma selinoides Bell. — Selon Mr. le Comte Emilio Turati, dans son dernier travail (III.-1909) elle est donc une forme de selini et non pas une bonne espèce. — Apennin modenese: capturée par moi, plusieurs fois, autour de la lanterne.

Caradrina lenta ab. excaecata m. (ab. nova) — Une ♀ de Montegibbio (Modena), chez qui manquent tout-à-fait les taches ordinaires des ailes antérieures. Cette forme, pas encore nommée, je crois, doit, bienque pas commune, se trouver partout.

Hydrilla hospes Frr. — Plusieurs fois je l'ai prise dans la province de Modena.

Cucullia gnaphalii Hb. — Une ♀ trouvée par moi cette année, à la lanterne, à Montegibbio (Modena).

Plusia gamma L. ab. rufa Verity (Verity Roger: Elenco di Lepidotteri raccolti nell' apennino pistojese — Bull. d. Soc. Ent. It., 1904) = ab. rufescens Tutt? — Aussi dans la province de Modena (Montegibbio): capturée par moi.

Leucanitis cailino Let. — Montegibbio (Modena): A. Costantini legit.

Arctia casta Esp. — Avec sa ab. mediodivisa Spul., plusieurs fois capturée par moi à Montegibbio (Modena).

Hepialus fusconebulosa De Geer var. aemilianus m. (var. nova) — Dans la zone montagneuse de la province de Modena (Montegibbio, Fiumalbo) une forme bien distinguée de fusconebulosa remplace entièrement le type. Elle peut, sans nul doute, être autant répandue est constante qu'ici même en toutes les autres provinces de la region de l'Emilia; et pour ça je veux la nommer aemilianus. — Cette forme parait aux premiers du septembre et n'est pas trop rare sur les prairies, surtout à Montegibbio. Elle tient de la livrée de ab. gallicus Led., mais elle en diffère, parce qu'elle est beaucoup plus jaune et monotone. Les taches blanches en séries transversales sur ses ailes antérieures, manquent, par contre, à la forme gallicus. Aussi dans la ♀ les franges des ailes sont parfaitement d'une même couleur que le fond, et non pas entrecoupées. Elle est, enfin, une forme bien constante, tandis que gallicus se rencontre comme ab. dans les alpes etc., parmi le type.

[1]) *In litteris* à Mr. le Prof. Dr. A. Seitz, en décembre 1910.

[2]) Prof. *P. Stefanelli:* Catalogo dei Lepidotteri della Toscana (Bull. d. Soc. Ent. Ital., 1870). — Il parle de la nuance bien noire de la forme toscane du Thyris fenestrella, sans, cep., la separer, cette forme.

Ex ovo-Zucht von Epione parallelaria Schiff.

Von *Franz Maschke* (Schluckenau).

Anschließend an meinen im Jahrgange 1908/09 der „Entom. Zeitschrift" gebrachten Artikel über die Eiablage von Epione parallelaria Schiff. gestatte ich mir, meine Resultate über die Zucht dieser schönen Geometride zu veröffentlichen.

Am 26. April 1909 verfärbten sich die ersten, der in meinem Besitze befindlichen 166 Stück Eier. Dieselben wurden — bisher braunrot — dunkelblaugrau, perlmutterartig glänzend.

Am 28. April konnte ich das erste Räupchen konstatieren. Dasselbe war 3 mm lang und ca. 0,2 mm im Durchmesser, zeigte am Rücken einen dunkelbraunen Längsstreifen, anschließend an beiden Seiten einen solchen von schmutzig-weißer Farbe, der wiederum mit braunen Streifen abwechselte und auf der Unterseite mit einem schmutzigweißen Längsstreifen abschloß. Der Kopf war gelbbraun.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Constantini A.

Artikel/Article: Description de quelques Macrolépidoptères nouveaux ou peu connus et notes faunistiques 247