

# Was kommt an einem Lichtfangabend zum Lichte?

Von Fritz Hoffmann-Krieglach.

(Schluß.)

Name des Falters:	Gölk 1175 m Wetterkreuz 800 m	
	Von 2/210—9/212 geleuchtet Stückzahl	Von 2/210—2/21 geleuchtet Stückzahl
Agrotis simulans Hufn. . . . .	1	—
Agrotis primulae Esp. . . . .	1	—
Agrotis plecta L. . . . .	1	—
Mamestra tincta Brahm. . . . .	1	—
Mamestra leucophaea View. . . . .	1	—
Mamestra reticulata Vill. . . . .	1	—
Mamestra dentina Esp. . . . .	1	—
Hadena rurea alopecurus Esp. . . . .	1	—
Hadena illyrica Frr. . . . .	1	—
Hadena adusta Esp. . . . .	4	1
Toxocampa viciae Hb. . . . .	1	1
Grammesia trigrammica Hufn. . . . .	2	—
Lithocampa ramosa Esp. . . . .	1	1
Cymatophora duplaris L. . . . .	2	—
Larentia caesiata . . . . .	2	—
Larentia silaceata Hb. . . . .	2	—
Larentia spadicearia Borkh. . . . .	4	1
Larentia variata-obeliscata Hb. . . . .	2	—
Larentia affinitata-turbaria Sph. . . . .	1	—
Larentia salicata Hb. . . . .	1	1
Larentia designata Rott. . . . .	1	—
Larentia fluctuata L. . . . .	1	—
Larentia kollariaria H. S. . . . .	2	—
Tephroclystia pyreneata Mab. . . . .	1	—
Tephroclystia lariciata Frr. . . . .	2	—
Bapta temerata Hb. . . . .	1	—
Acidalia incanata L. . . . .	3	—
Gnophos ambiguata Dup. . . . .	2	4
Gonodontis bidentata Cl. . . . .	2	—
Selenia lunaria Schiff. . . . .	1	—
Semiothisa signaria Hb. . . . .	1	—
Abraxas marginata L. . . . .	1	—
Euxanthia hamana L. . . . .	1	—
Pyrausta aurata Sc. . . . .	1	—
Olethreutes urticana Hb. . . . .	1	—
Scoparia ambigualis Tr. . . . .	1	—
Agrotis strigula Thnbg. . . . .	—	26 (war gemein)
Caradrina morpheus Hufn. . . . .	—	2
Opisthoptis luteolata L. . . . .	—	2
Mamestra thalassina Rott. . . . .	—	4
Plusia gamma L. . . . .	—	1
Agrotis candelarum Stgr. . . . .	—	1
Hadena basilinea F. . . . .	—	2
Dianthoecia cucubali Fuessl. . . . .	—	1
Phasiane clathrata L. . . . .	viele	viele
Boarmia angularia Thnbg.*) . . . . .	1 ♂	—
Trachea atriplicis L. . . . .	—	3
Mamestra serena F. . . . .	—	1
Cerura bifida Hb. . . . .	—	1
Diacrisia sanio L. . . . .	—	2
Mamestra dentina Esp. . . . .	—	1
Cucullia lactucae Esp. . . . .	—	1
Agrotis cinerea Hb. . . . .	—	1
Agrotis exclamationis L. . . . .	—	1
Mamestra pisi L. . . . .	—	1
Hadena sordida Bkh. . . . .	—	2
Leucania comma L. . . . .	—	1
Drepana falcataria L. . . . .	—	1
Demas coryli L. . . . .	—	1

\*) Neu für Steiermark! Von Sammlern in Graz um die gleiche Zeit heuer in großer Zahl gefangen.

Name des Falters:

Name des Falters:	Gölk 1175 m Wetterkreuz 800 m	
	Von 2/210—9/212 geleuchtet Stückzahl	Von 2/210—2/21 geleuchtet Stückzahl
Eurymene doabraria L. . . . .	—	1
Ortholita plumbaria F. . . . .	—	1
Larentia galiata Hb. . . . .	—	1
Larentia sociata Bkh. . . . .	—	3
Larentia caesiata Lang. . . . .	—	1
Abraxas adustata Schiff. . . . .	—	3
Larentia viridaria F. . . . .	—	1
Larentia truncata Hufn. . . . .	—	1
Semiothisa notata L. . . . .	—	1
Semiothisa liturata Cl. . . . .	—	1
Larentia alchemillata L. . . . .	—	1
Zanclognatha grisealis Hb. . . . .	—	1

Eine genaue Untersuchung aller Falter ergab, daß hiervon 18% ♀♀ waren.

Gut Licht!

## Ueber Parnassius apollo L.

Von Alfred Ruhmann, Guggenbach (Steiermark).

Parnassius apollo L. nov. ab. immaculata.




Fig. 1.

Al. post. sine maculis analibus.

Die Analflecke auf der Oberseite der Hinterflügel fehlen vollständig. Ich benenne diese sehr seltene Aberration: Parnassius apollo L. ab. immaculata Ruhmann.

Type: Ein ♂ aus Krems a. D. in meiner Sammlung.

Parnassius apollo L. var. silesianus Marschner.




Fig. 2.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Fritz

Artikel/Article: [Was kommt an einem Lichtfangabend zum Lichte? - Schluß 186](#)