

9. *Melipona subterranea* Frs. Durchschnitt.  
 10. " *fuliventris* Sm.  
 11. " *cupira* Sm.  
 12. " *Kohli* Fr.  
 13. " *limão* Sm.  
 14. " *dorsalis* Sm.  
 15. " *fuliginosa* Lep.  
 16. " *scutellaris* Ltr.  
 17. " *Iheringi* Fr.  
 18. " *Helleri* Fr.  
 19. " *anthidioides* Lep. im Pflanzenstengel.

## Verzeichnis der im Südosten von Oberschlesien vorkommenden Großschmetterlinge.

Von Paul Wolf und Hermann Raebel.

Nach Abschluß des Verzeichnisses im Herbst 1911 sind folgende 11 Arten und 6 Abarten neu hinzugekommen, sodaß bis jetzt in Sa. 742 Arten und 164 Abarten festgestellt worden sind.

### 50. *Thecla* F.

466. *Th. pruni* L. Im Juli, Anfang August; selten bei Larischhof Kr. Tarnowitz. Raupe bis Juni an Schlehe und Pflaume (*Prunus*).

### 106. *Drymonia* Hb.

804. *D. querula* F. Ende April, Mai; selten bei Zabrze. Raupe im Juni, Juli auf Heidelbeere (*Vaccinium uliginosum*) von Peschke gefunden. In der Literatur ist nur Eiche als Futter angegeben.

### 213. *Mamestra* Hb.

1441. *M. leucophaea* View. Die in Nr. 47, Jahrgang 1912 von Dr. Hartwieg-Wolfenbüttel beschriebene dunkle ab. *melaena* Hrtwg. in einem ♂ Exemplar von Franke in Kattowitz gefangen.

1502. *M. cavernosa* Ev. Ein ♀ Falter wurde von Wodarz am 15. Juni 1912 in Zabrze am elektrischen Licht gefangen. Es dürfte der erste Fang dieser Art in Deutschland sein, da nach Spuler und Seitz *cavernosa* nur bei Krakau (der nächsten Fundstelle von hier), in Südrussland, Ungarn, bei Wien, der Schweiz und Italien vorkommt. Die Raupe ist unbekannt.

### 239. *Hadena* Schrk.

1709. *H. scolopacina* Esp. Im Juni, Juli; selten bei Mathesdorf. Raupe bis Mai an Gräsern.

### 289. *Nonagria* O.

1895. *N. geminipuncta* Hatch. Die ab. *nigricans* Stgr. von Franke in Kattowitz gefangen.

### 296. *Tapinostola* Ld.

1923. *T. fulva* Hb. Bisher war nur die ab. *flava* Tr. bekannt; die Stammform wurde 1912 und 1913 von Franke-Kattowitz und Raebel-Zabrze in einigen Stücken gefangen, desgleichen ein Falter. Die Vorderflügel schwärzlich verdunkelt mit stark hervortretenden schwarzen Adern.

### 300. *Calamia* Hb.

1928. *C. lutosa* Hb. Anfang September 1913 bei Zabrze Abends mit der Laterne eine Anzahl Falter gefangen, darunter folgende Abarten: ab. *rufescens* Stgr. selten.

ab. *strigata* Rbl. Die Punktreihe auf Vorder- und Hinterflügel durch eine gezackte schwarze Linie miteinander verbunden; auch von Winkler in Friedrichshütte gefangen.

ab. *lechneri* Rbl. Vorderflügel schwarz verdunkelt mit hellen länglichen Wischen.

### 312. *Hydrilla* (B.) Gn.

2024. *H. palustris* Hb. Ende Mai, Anfang Juni 1913 von Peschke und Raebel 20 Falter, jedoch nur ♂, bei Zabrze Abends mit der Laterne gefangen. Die Falter saßen meist an Grasstengeln auf einer kleinen Fläche und konnten mit dem Giftglase abgenommen werden. Die ♀ waren trotz eifrigem Suchen nicht zu finden, desgl. später die Raupen, welche auf niederen Pflanzen leben sollen.

### 332. *Dyschorysta* Ld.

2109. *D. suspecta* Hb. Im Juli einen Falter im Gleiwitzer Stadtwald mit der Laterne gefangen. Raupe anfangs in den Kätzchen von Pappel (*Populus*), später an niederen Pflanzen.

### 499. *Acidalia* Tr.

3047. *A. decoloraria* H. S. Ende Juni, Juli; vereinzelt bei Mathesdorf und Zabrze. Raupe bis Mai an Ampfer (*Rumex*) und Lysimachia.

### 504. *Ephyra* Dup.

3111. *E. annulata* Schulze. Im Mai und August; selten bei Zabrze. Raupe im Juni, Juli und Herbst an Birke (*Betula*) und Ahorn (*Acer*).

### 544. *Larentia* Tr.

3374. *L. designata* Rott. Eine Abart mit einfarbig aschfarbenen Vorderflügeln und die rotbraune Mittelbinde bis auf einen kleinen Punkt am Vorderrand reduziert entsprechend der ab. *islandicaria* Stgr. in Zabrze gefangen.

### 545. *Asthena* Hb.

3507. *A. unicoloria* H. S. Im Juni, Anfang Juli; lokal aber häufig im Mathesdorfer Walde. Der Falter, welcher mit Vorliebe in Büschen von Hartringel oder in allernächster Nähe im Grase sitzt, ist bis jetzt infolge seiner Kleinheit wohl nur übersehen worden. Raupe im Juni, Juli an Hartriegel (*Cornus sanguinea*).

### 598. *Anisopteryx* Stgr.

3807. *A. aceraria* Schiff. Im Oktober, November; selten bei Kattowitz. Raupe Mai bis Juli an Ahorn (*Acer*).

### 601. *Biston* Leach.

3825. *B. hirtarius* Cl. Die ab. *hanoviensis* Heymons von Franke-Kattowitz in einigen Stücken aus Freilandraupen erzogen.

## Resultate längerer Inzucht von *Liparis monacha*.

Von H. Meyer, Saalfeld a. d. Saale.

(Zugleich Antwort auf die Anfrage in voriger Nr.)

Von *Liparis monacha* nahm ich am 7. August 1905 aus einem alten Fichtenbestand einige ♀♀ zur Eiablage mit, um Material für Biologien zu erhalten. — Am

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Raebel H., Wolf Paul

Artikel/Article: [Verzeichnis der im Südosten von Oberschlesien vorkommenden  
Großschmetterlinge 257](#)