

- Rogas limbator* Rbg. *Tortrix laevigana*, *populana*.
 „ *linearis* Ns. *Tortrix viridana*, *prasinana*. *Noctua trapezina*.
 „ *modestus* Rhd. *Eupithecia pimpinellaria*, *exiguaria*, *laricinaria*, *absynthiaria*. *Acidalia trilinearia*.
 „ *irregularis* Wsm. *Hadena inanimis*.
 „ *nigricornis* Wsm. *Colocasia solidaginis*. *Xylorhiza rurea*.
 „ *obscurator* Rbg. *Tinea abietella*.
 „ *praeatorator* L. *Bothryothorax salicis*. *Porthesia auriflua*.
 „ *pulchripes* Wsm. *Porthesia auriflua*.
 „ *rugator* Rbg. *Bostrychiden*.
 „ *rugulosus* Ns. *Acronycta euphorbiae*, *abscondita*, *myniosa*.
 „ *tenuis* Rbg. *Bombyx castrensis*. *Tortrix heparana*.
 „ *tristis* Wsm. *Eupithecia pimpinellaria*.
 „ *testaceus* Spin. *Porthesia auriflua*. *Plusia gamma*. *Leucania*. *Cilix glaucata*. *Eupithecia sobrina*. *Tortrix rosana*.
 „ *unicolor* Wsm. *Leucania salicis*.
Macrocentrus cingulum Rhd. *Eurycreon verticalis*.
Orgyia antiqua.
 „ *collaris* Ns. *Gortyna flavago*. *Calocampa vetusta*. *Anobium*.
 „ *abdominalis* Fbr. *Vanessa Atalanta*. *Hylophila prasinana*. *Demas coryli*. *Hydrania petasitis*. *Noctua ditrapezina*. *Calymnia trapezina*. *Spilades verticalis*. *Nophopteryx spissicella*. *Tortrix pedana*, *corylana*, *rosana*, *ribeana*, *viridana*. *Epichnapteryx*. *Depressaria*. *Hyponomeuta evonymella*.
 „ *infirmus* Ns. *Cloantha polyodon*. *Hydraena*. *Eupoicoila*.
 „ *interstitialis* Rbg. *Retinia resinana*, *cosmophorana*.
 „ *limbator* Rbg. *Tachyptilia populella*. *Tortrix pedana*.
 „ *linearis* Ns. *Eurycreon verticalis*.
 „ *marginator* Ns. *Sesia formicaeformis*. *Dicrostampa plumbana*. *Pedia sordidana*. *Depressaria angelicella*. *Cynegetis scatella*. *Cryptorhynchus lapathi*.
 „ *obscurator* Rbg. *Diocrya abietella*.
 „ *thoracicus* Ns. *Tachyptilia populella*. *Noctua triangulum*. *Xylina ornithopus*. *Tortrix crataegana*. *Depressaria applanata*, *chaerophylli*, *nervosa*. *Bostrychiden*.
Chelonus annularis Ns. *Oecophora lambdella*. *Xysmodoma melanella*.
 „ *annulatus* Ns. *Liopus*. *Pogonochaerus*.
 „ *armatus* Wsm. *Nematus Vallisneri*. *Fenusa*.
 „ *carbonator* Mrsh. *Eupithecia*.
 „ *corvulus* Mrsh. *Hadena*. *Asphondylia verbasci*.
 „ *decorus* Mrsh. *Hyponomeuta malinella*. *Retinia Bouoliana*.
 „ *dentatus* Ns. *Myelois advenella*.
 „ *dispar* Mrsh. *Nematus*. *Anthomyia*.
 „ *elegans* Ns. *Geometra betularia*.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

Bienenbuch für Anfänger. Von Pfarrer Johannes Aisch. Mit 61 Abbildungen. Verlag von Troitzsch & Sohn in Frankfurt a. Oder.

Wohl bei so manchem ist schon, besonders jetzt in der Kriegszeit bei der Zuckerknappheit, der Wunsch aufgestiegen, einen Bienenstand zu besitzen, der ihm nicht bloß Ersatz, sondern etwas noch Kostlicheres in ausreichender Menge liefern könnte, und ihn mag der Gedanke wieder geschreckt haben: wie fange ich das an? Nun ist ja an Literatur eingehendster Art, nach der wissenschaftlichen wie praktischen Seite hin, kein Mangel, aber gerade die Fülle des Gebotenen, die überreiche Menge des Stoffes, die in erster Linie für bereits tätige Imker berechnet ist, macht den Anfänger scheu, ihm ist ja alles noch neu, und er denkt im Stillen, wenn man das alles wissen und beobachten muß, dann ist es wohl besser, ich bleibe — vorläufig noch davon. Solchen will das Büchelchen zu Hilfe kommen, will sie das ABC lehren. Der Verfasser, ein erfahrener Imker und sorgfältiger Beobachter, weiß genau, was der Anfänger gern kennen lernen möchte und weiß nicht nur den rechten Rat zu geben, sondern auch den rechten Ton zu treffen, um die Lust und Liebe zur Imkerei anzufachen und zu beleben. Nach einer kurzen Naturgeschichte der Bienen, die natürlich jeder kennen muß, ehe er daran gehen kann, sie zu züchten, werden in geschichtlicher Aufeinanderfolge die verschiedenen Zuchtbetriebsweisen beschrieben. Es folgen dann die Kapitel über Umgang mit Bienen, wie man sich verhalten muß, um nicht zum Stechen anzureizen, über Behandlung der Völker in den verschiedenen Jahreszeiten, Verhütung von Schäden, Gewinnung und Verwertung der Produkte, Bienenweide und Bienenfeinde und Anleitung zur Anfertigung von Wohnungen und Geräten. Zum Schluß ein eigenes Kapitel: Wie fängt man's an? das darin gipfelt: fange nur an, alles andere wirst du dann schon lernen und ebenso: fange mit ganz wenigen Geräten an und lege dir erst dann weitere hinzu, wenn du sie brauchst, oder wie der Verfasser sagt: wenn die Zeit gekommen, daß man sagen kann: Die Bienen fordern sie: sie haben sie sich verdient. Das anspruchslose Werkchen wird gewiß manchen Jünger der Imkerei zuführen und auch dem bereits hierin Tätigen und Erfahrenen manchen willkommenen Wink geben; wir wünschen ihm die weiteste Verbreitung.

Auskunftstelle des Int. Entomol. Vereins.

Anfrage:

Im Juni v. Js. stöberte ich aus dem Gebüsch des Bodanrückens am Bodensee einen Spanner auf, welcher an Größe und Färbung einen fremdartigen Eindruck machte und sich später als ein Ang. prunaria-Weibchen erwies. Die Flügelspannung beträgt 56 mm. Die Grundfarbe ist auf allen Flügeln ein gleichmäßiges helles Goldgelb ohne Sprinkel. Die Mittelbinde ist 8 mm und gleichmäßig breit mit unbedeutender Einbuchtung in der Mitte und von heller weißgelblicher Farbe. Die Binde setzt sich anfangs in gleicher Breite auf die Hinterflügel fort und endet, etwas zugespitzt, kurz vor dem Saum. Der Fleck an der Spitze der Vorderflügel ist verhältnismäßig groß und von gleicher Farbe wie die Binde. Abweichend von der var. sordidata hat der Saum keine geschackten Fransen, auch ist der Leib und Thorax hellgelb. Ist diese Varietät bereits bekannt und benannt?

Dietze, Ueberlingen am See.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Dietze Karl

Artikel/Article: [Ankunftstellß des Int. Entomol. Vereins. 92](#)