

gezogenen Falter, wie *caia*, hinsichtlich derartiger bemerkenswerter Eigenschaften Unsicherheit herrschte. Insbesondere werden diejenigen Herren, die von mir Rupchen von *caia* ab. eiffingeri ♂ × *caia* ♀ bezogen haben, in dieser Richtung Versuche anstellen konnen.

Daß die Fahigkeit nur bei einigen, nicht bei allen Faltern vorhanden ist, mochte ich indessen doch schon jetzt behaupten, wenn auch wohl alle bei Beruhungen die entsprechende Abwehrstellung einnehmen, so da der rote Kragen deutlich und breit hervortritt.

Fur meine Vermutung uber den Zweck der Tropfen spricht auch der Umstand, da mein Rotkehlchen, dem ich hier und da fehlerhafte Falter zu reichen pflge und das auch hier und da gereichte *caia*-Falter im allgemeinen anstandslos annimmt, sich von einem solchen tropfenbehafteten Falter mit lebhaftem Kopfschutteln abwendet, just so, wie es sich jedem Marienkafer gegenuber verhalt.

Fruhere Beobachtungen uber die Flussigkeitsabsonderung von *Arctia caia* L.

Ein Literatur-Hinweis von Gunther Just.

Auf Seite 85 des vorigen (XXXI.) Jahrgangs dieser Zeitschrift schildert A. U. E. Aue, wie bei einem frisch geschlupften Mannchen von *Arctia caia* L. nach gelindem Druck auf den Kopf „rechts und links auf der Brust zwei etwa linsengroe kristallhelle Tropfen erschienen, die bald, wohl etwa nach 5 Sekunden, wieder verschwanden.“ Versuche, das Tier im Dunkeln zum Leuchten zu bringen, scheiterten, ebenso bei zahlreichen weiteren Exemplaren des Falters.

Bei der Flussigkeitsabsonderung handelt es sich nun um eine Beobachtung, die schon mehrfach beschrieben worden ist — so bereits vor mehr als 100 Jahren von Degeer, ohne allerdings in ihren Einzelheiten auch wirklich klargestellt zu sein. Auf diese fruhere Literatur machte bald nach der im Biologischen Centralblatt (Bd. 36) erfolgten Veroffentlichung Isaaks uber die Leuchtfahigkeit unseres Schmetterlings O. V. Hykes in der gleichen Zeitschrift (Bd. 37) aufmerksam; ebenso wies H. Soldanski in seiner Besprechung der Isaakschen Arbeit (in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift, Jahrgang 1916) auf sie hin, insbesondere auf zwei neuere Arbeiten Paul Schulzes (Zoologischer Anzeiger, Bd. 39, und Berliner Entom. Zeitschr., Bd. 58), deren erstere auch eine Literaturubersicht bringt. Von den beiden Arbeiten Schulzes mag auch hier etwas ausfuhrlicher berichtet werden, da besonders die erstere nur einem Teil der Leser dieser Zeitschrift zuganglich sein durfte.

Nach den Angaben unseres Gewahrsmannes ist eine Flussigkeitsabsonderung auer fur *Arctia caia* L. noch fur folgende Falter erwahnt worden:

von Dampf fur *Callimorpha dominula* L. und die Zygaeniden,

von Fenn fur *Stilpnotia salicis* L.,

von Reid fur *Lasiocampa quercus* L. und *Dicranura vinula* L.,

von Hollande fur *Arctia flava* Fuel.

Bei *Spilosoma luteum* Hufn. schlielich vermutet Paul Schulze solche Sekretion, da er im Halskragen dieser Art ein Drusenpaar auffand.

Ob es sich indessen hier uberall um Drusensekretion handelt, ist zweifelhaft; fur *Arctia flava* Fuel gibt Hollande jedenfalls Absonderung von Blut an.

Allerhand Widerspruche finden sich auch — nach Schulzes weiteren Ausfuhrungen — bei den einzelnen Autoren uber Beschaffenheit, Farbe und Geruch der Sekretionsflussigkeit von *Arctia caia* L. Sie wird als wasserhell, als olig, als gelb, als grunlich beschrieben; sie soll ahnlich wie Coccinellenblut, dann wieder nesselahnlich riechen.

In diese so mannigfache Unklarheit vermag eine Beobachtung Schulzes an einem *Arctia caia* L.-Weibchen etwas Licht zu bringen; sie sei daher wortlich zitiert: „Als ich das Tier beruhrte, erfolgte prompt am Prothorax die Tropfenbildung, und zwar war rechts der Tropfen glashell, links dagegen etwas trub gelb, und erst nach mehrmaligem Abwischen und Drucken wurde die Flussigkeit auf beiden Seiten gelb. Weder ich selbst, noch etwa zehn weitere Personen, denen ich den Falter zeigte, konnten auch nur den geringsten Geruch wahrnehmen. Vielleicht liegt hier die Sache so, da zunachst Drusensekret und dann erst bei starkerer Belastigung Blut ausgestoen wird. Es ist mir aber nie aufgefallen, da das Blut von *Arctia caia* L. jenen eigentumlichen Geruch des Marienkaferblutes, von dem die Autoren sprechen, aufwies.“

Von einem Leuchten des Sekrets von *Arctia caia* L. hat bisher nur Isaak berichtet. Seine Beobachtung ist auer von Aue auch von Soldanski (a. a. O.) nachgepruft worden, ebenfalls mit negativem Ergebnis. Weder er noch andere Beobachter, die ihm mundlich berichteten, vermochten ein Leuchten des Sekrets festzustellen.

So bleibt die Frage der Flussigkeitsabsonderung und der Leuchtfahigkeit von *Arctia caia* L. vorlaufig immer noch in mancherlei Hinsicht problematisch und weiterer Untersuchung wert.

Zur Biologie der Stubenfliege.

Von Otto Meissner, Potsdam.

(Schlu.)

8. Feinde: Parasiten.

Da Homo sapiens ein Feind der M. d. ist, ist ebenso sicher, wie da er ihr keinen merklichen Schaden tut (vgl. jedoch das oben bezuglich des Vorgehens der Nordamerikaner Gesagte). Gleiches durfte von den meisten ubrigen Feinden gelten: sie tun ihr wohl Schaden, aber er ist ohne groe Bedeutung. Mit der Aufzahlung der hier in Betracht kommenden Feinde brauchen wir uns also nicht aufzuhalten.

Von erheblicher Bedeutung ist dagegen das alljahrliche endemische Auftreten des parasitischen Pilzes *Empusa muscae*. In nassen Sommern tritt er besonders hufig auf. So war es in dem verregneten Sommer 1907; auch dieses Jahr 1918 trat der Pilz hufig auf, auch vielfach an den „kleinen“ Stubenfliegen, *Fannia* (*Homalomyia*) *scalaris* F. und der noch kleineren *canicularis* L.

„Kafermilben“ kann man gelegentlich bekanntlich auch an andern Insekten beobachten. So gaben sie einmal zu der abenteuerlichen Annahme einer „Brutpflege bei Libellenmannchen“ Anla, einer Annahme, die leider, wenn auch angezweifelt, in „Tumpels Geradflugler Mitteleuropas“ ubergegangen ist! Schon Latreille hatte Milben an M. d. beobachtet. Da dies immerhin ziemlich selten vorkommen durfte, will ich nicht verabsaumen, mitzuteilen, da auch ich am 28. September d. J. eine M. d. mit einer Kafermilbe in der Mitte der Unterseite des Hlb. fand.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Just Günther

Artikel/Article: [Frühere Beobachtungen über die Flüssigkeitsabsonderung von Arctia caia L. 70](#)