© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Die alten Maulbeerbäume, die letzten Reste der Küstriner Seidenindustrie, wurden durch Pappeln, Weiden und Akazien ersetzt.

Aus dem Obigen geht hervor, daß trotz des ungünstigen Ausganges in Küstrin mit dem Seidenbau Erfolge erzielt wurden, die aber lediglich auf die Tüchtigkeit und die Sorgfalt des Züchters zurückzuführen sind. Eine zwangsweise Betreibung des Seidenbaues führte zu keinem befriedigenden Ergebnis. Die Züchtung der Raupen wie der Maulbeerbäume muß mit größter Lust und Liebe betrieben werden. So wie ein guter Imker mit seinen Bienen umgeht, muß auch der Seidenzüchter mit seinen Raupen umgehen. Der Erfolg im Seidenbau hängt unsers Erachtens von der Persönlichkeit des Züchters ab. Die Wissenschaft hat heute Mittel gefunden, große Verheerungen durch Krankheiten im Raupenbestande, die seinerzeit die Ursache des Eingehens des Seidenbaus waren, zu verhindern. Wir stehen jetzt ganz andern Verhältnissen gegenüber als die Züchter des 18. und 19. Jahrhunderts. Hoffentlich wird es, nachdem die wesentlichen Schwierigkeiten heute überwunden sind, gelingen, den altehrwürdigen Seidenbau wieder zu Ehren zu bringen.

---

## Zyg. filipendulae ab. chrysanthemi Bkh.

Von *A. Heese*, Dauer (Brandenburg).

Am 11. August 1918 fing ich hier ein Männchen dieser höchst seltenen Abart. Das Tier stimmt mit der Beschreibung in der Ent. Zeitschrift XIII, S. 170, überein, nur ist die Grundfarbe der Vorderflügel schwarzblau. Ich füge diesen neuen Fundort den dort von Herrn Max Bartel aufgezählten bei.

Leider ist der Falter schon etwas abgeflogen, aber einwandfrei als solcher zu erkennen, weshalb ich auch von der zurzeit am Fundorte angetroffenen Stammform — welche schon gänzlich abgeflogen war, aber dennoch das Rot erkennen ließ — ein Pärchen mitnahm.

---

## Ichneumon.

Von Professor *Dr. Rudow*, Naumburg a. d. Saale.

(Fortsetzung).

*thoracicus* Rd. Agrotis collina.
*Trentepohli* Wsm. Toxotuspuppenlager.
*trilineatus* Gr. Zerene grossulariata.
*trimaculatus* Tbn. Sphinx pinastri. Bombyx pini.
*Troscheli* Rbg. Panolis piniperda.
*tuberculipes* Wsm. Cimbexpuppen.
*tibialis* Br. Noctuapuppen.
*tuberculatus* Wsm. Deilephila proserpina.
*umbraculosus* Br. Panolis piniperda.
*uniguttatus* Wsm. Hesperias comma.
*vaginator* L. Diloba caeruleocephala.
*vacillatorius* Wsm. Danaïs chrysippus.
*varipes* Gr. Cheimatobia brumata. Hibernia.
*versicolor* Rd. Sesia tabaniformis.
*venator* Wsm. Pieris brassicae.
*vestigator* Wsm. Lycaena rubi.
*virginalis* Wsm. Thecla spini.
*vexator* Wsm. Sphinx vespertilio.
*vivacior* Tbn. Retinia bouoliana.
*Walkeri* Wsm. Pararge Megaera.
*Wienkeri* Rbg. Geometra lituraria.
*xanthorius* Gr. Charaeas graminis. Agrotis prasinana.
*zonalis* Wsm. Endromis versicolor.

### Cryptus.

*abscissus* Tbg. Zygaena. Allantus. Hylotoma. Lophyrus.
*adustus* Gr. Lophyrus.
*aëreus* Gr. Pontia crataegi. Eupithecia. Botys vesticalis. Microgaster.
*alternator* Gr. Nematus.
*albatorius* Gr. Allantus.
*analis* Gr. Cimbex. Lophyrus. Panolis piniperda. Leucomia salicis.
*annulipes* Tbg. Cimbex betulae. Macrophyia ribis.
*alnorum* Rd. Dineura alni.
*assertorius* Gr. Nematus Vallisnieri. Osmia und Odyneruszellen im Rohr.
*atripes* Gr. Allantus.
*arrogans* Gr. Panolis piniperda.
*attentorius* Gr. Sphinx pinastri. Bombyx pini.
*annulitarsus* Thms. Ballen von Spinneneiern.
*angelicae* Rd. Zygaena angelicae.
*arcuatus* Rd. Cimbex betulae, lucorum.
*bimaculatus* Gr. Osmia bicornis, coerulea in Rohrhalmen.
*brachycerus* Gr. Cladius albipes, eradiatus.
*brachysoma* Tbg. Cheimatobia brumata.
*brunniventris* Rbg. Sphinx pinastri.
*bivinctus* Gr. Cryptorrhynchus lapathi. Hylotrypes bajulus.
*carnifex* Gr. Leucania obsoleta. Nonagria paludicola.
*cheimatobiae* Rd. Cheimatobia brumata.
*celsiae* Rd. Jaspidea celsia.
*contractus* Gr. Bupalus piniarius. Geometra. Lyda.
*coraebi* F cn. Coraebus rubi.
*cyanator* Gr. Diloba caeruleocephala. Leucoma salicis. Cerura vinula.
*carinatas* Rd. Saturnia pyri.
*cecropiae* Rd. Saturnia cecropia.
*celticola* Rd. Libythea celtis.
*claviventris* Br. Vanessa jo.
*cultriventris* Tsch. Cimbex lucorum.
*diodonti* Rd. Zellen von Diodontus tristis.
*dineurae* Rd. Dineura alni.
*Dianae* Gr. Cimbex. Lophyrus.
*digitatus* Gr. Bupalus. Cheimatobia.
*evanescens* Rbg. Psyche.
*effeminatus* Gr. Agrotis segetum, brunnea.
*eborinus* Rbg. Psyche.
*echthroides* Rbg. Magdalinus violaceus.
*erythrocerus* Br. Argynnis.
*filicornis* Rbg. Panolis piniperda. Cimbex. Chalicodoma.
*fumigatus* Rd. Dipterenpuppen, Syrphiden.
*flavilabris* Htg. Agrotispuppen.
*fugitivus* Gr. Odynerus in Rohr. Nematus. Abraxas
*fumipennis* Gr. Lophyrus. Lyda.
*flavopictus* Rd. Geometra betularia.
*gallarum* Rbg. Andricus terminalis, vesicator.
*gigas* Rd. Sphinx ligustri.
*geometrae* Rd. Geometraarten.
*hostilis* Gr. Nematus. Lophyrus. Dineura alni.
*hortulanus* Gr. Teras terminalis.
*hercyniae* Gr. Pissodes.
*hylotomorum* Rd. Hylotoma ustulata.
*humeralis* Rd. Eumenes ungniculus. Smyrna.
*hellenicus* Rd. Odyneruszellen. Smyrna.
*illustris* Rd. Odynerus. Chalicodoma.
*inquisitor* Tsch. Dineura. Nematus.
*insinuator* Gr. Pissodes.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: 32

Autor(en)/Author(s): Heese A.

Artikel/Article: Zyg. filipendulae ab. chrysanthemi Bkh. 75