

**Ichneumon.**

Von Professor Dr. Rudow, Naumburg a. d. Saale.

**Platylabus.**

(Schluß.)

*cothurnatus* Wsm. Panolis piniperda.  
*Daemon* Wsm. Bupalus piniarius. Cheimatobia  
 brumata.  
*dimidiatus* Wsm. Cidaria luctoata.  
*dolorosus* Gr. Cidaria juniperata.  
*errabundus* Br. Cidaria juniperata.  
*leucogrammus* Wsm. Acidalia strigilaria.  
*orbitalis* Gr. Lobophora sexalaria. Cidaria fluctuata.  
*pactor* Br. Eupithecia absynthiaria.  
*pedatorius* Fbr. Hibernia defoliaria. Cheimatobia  
 brumata. Eupithecia innotata, exigua,  
 nauaria, pimpinellaria.  
*rufiventris* Wsm. Panolis piniperda.  
*rufus* Wsm. Cheimatobia brumata.  
*tenuicornis* Br. Halia wauaria.  
*variegatus* Wsm. Eupithecia. Cidaria. Geometra.

**Euryproctus.**

*annulatus* Gr. Macrophysia ribis. Tenthredo scalaris.  
*chrysostomus* Gr. Tenthredo agilis.  
*fuscicornis* Hgr. Lophyrus. Lyda.  
*geniculosus* Gr. Trichiosoma sorbi.  
*mundus* Gr. Cimbex betulae.  
*memoralis* Br. Tenthredo atra, scalaris.  
*nigriceps* Gr. Clavellaria amerinae. Trichiosoma  
 lucorum.  
*regenerator* Fbr. Macrophysia rustica.  
*rufoniger* Gr. Cimbex betulae. Tenthredo bicincta.  
*sinister* Br. Tenthredo ancupariae, mesomelas.

**Megastylus.**

*agilis* Br. Tenthredo ancupariae.  
*carinatus* Hgr. Selandria ovata. Nematus.  
*cruentator* Schd. Nematus. Cladius.  
*dives* Hgr. Dolerus. Selandria.  
*formosus* Gr. Nematus. Selandria.  
*geniculatus* Hgr. Athalia.  
*gracilicornis* Hgr. Dineura. Nematus.  
*insolens* Gr. Tenthredo.  
*luctuosus* Hgr. Nematus. Dolenus niger.  
*leptogaster* Hgr. Nematus latipes, hypogastricus.  
*latipes* Br. Nematus.  
*napaeus* Hgr. Nematus.  
*nobilis* Hgr. Dineura.  
*niger* Gr. Tenthredo cingulata. Strongylogaster.  
*pictus* Br. Dineura. Hemichroa.  
*pulverulentus* Hgr. Nematus.  
*pumilio* Fst. Selandria ovata, ephippium.  
*segmentator* Hgr. Nematus perspicillaris.  
*semicaligatus* Gr. Nematus. Dolerus gonager.  
*simulans* Hgr. Perineura. Tenthredo.  
*sanguineus* Hgr. Selandria ovata.  
*transfuga* Hgr. Nematus hypogastricus, salicis.  
*viduus* Hgr. Cladius uncinatus.  
*xanthostoma* Gr. Dineura. Nematus.

**Exochus.**

*alpinus* Zett. Anobium. Bostrychiden.  
*aphidivorus* Rd. Gallen auf Ulmusblättern.  
*betulae* Rd. Aphidenknäuel an Betula. Fenusa.  
*brevicornis* Rd. Gracilia. Pogonochaerus.  
*concinuus* Hgr. Aegidea in Brombeerstengeln.  
*coronatus* Gr. Bostrychiden.  
*consimilis* Hgr. Hyponomeuta padella, evonymella.

*crassicornis* Gr. Apate. Anobium. Sphegiden in Zweigen.  
*curvator* Gr. Xiphidria camelus.  
*erythronotus* Gr. Sphegiden atratus. Odynerus in Brom-  
 beerzweigen.

*femoralis* Gr. Rohrstengel mit Osmia, Odyneruszellen.  
*frontellus* Hgr. Hylesinus fraxini.  
*gratiosatae* Rd. Eupithecia gratiosata.  
*gravipes* Gr. Tinea consociella. Tortrix. Gracilia  
 pygmaea.  
*morionellus* Hgr. Pagonochaerus.  
*podagricus* Hgr. Kleine Sphegiden in Brombeerzweigen.  
*prominulus* Rd. Bohrlöcher in Weidenstämmen.  
*prosopius* Gr. Sphegiden in Kirschbäumen.  
*squalidus* Hgr. Sphegiden in Kirschbäumen.  
*ventralis* Hgr. Sphegiden in Brombeerzweigen.

**Polyblastus.**

*aberrans* Br. Fenusa rubi.  
*consobrinus* Hgr. Haematobia.  
*cothurnatus* Gr. Fenusa betulae. Geometra.  
*melanostigmus* Gr. Lophyrus. Selandria ovata.  
*mutabilis* Hgr. Nematus myosotadis.  
*nematorum* Rd. Nematusarten.  
*palaemon* Schdl. Nematus Dineura.  
*pratensis* Gr. Allantus. Nematus. Selandria.  
*pinguis* Gr. Lophyrus.  
*pictipes* Br. Lophyrus.  
*pumilus* Hgr. Nematus Vallisnieri.  
*ribesii* Rd. Abraxas grossulariata. Macrophysia ribis.  
*sanguinatorius* Rbg. Cladius eucera, viminalis. Nematus.  
*selandriae* Br. Selandria ovata, pubescens.  
*senilis* Hgr. Nematus.  
*Stenhameri* Hgr. Geometra betularia.  
*varitarsus* Gr. Nematus. Selandria.  
*Wahlbergi* Hgr. Fenusa betulae.

**Bassus.**

*albosignatus* Ns. Syrphus pyrastris. Melithreptus.  
*auctumnalis* Hgr. Cheilosia variabilis.  
*bimaculatus* Hgr. Volucella pellucens.  
*cimbicis* Rd. Cimbex betulae.  
*cognatus* Hgr. Syrphus pipiens.  
*cultratus* Jun. Xanthogramma.  
*ephippium* Rd. Volucella pellucens.  
*exsultans* Gr. Cheilosia.  
*festivas* Fbr. Syrphus grossulariae. Leucogona.  
*flavozonatus* Gr. Ascia podagrica.  
*fissorius* Gr. Cheilosia.  
*gracilentus* Hgr. Trypeta Meigeni in Berberisbeeren.  
*interruptus* Hgr. Syrphus umbellatarum.  
*laetatorius* Fbr. Syrphus auricollis u. a.  
*ornatus* Ns. Syrphus glaucus.  
*pulchellus* Hgr. Syrphus diaphanus.  
*ruficornis* Hgr. Syrphus topiarius.  
*rufipes* Gr. Pipiza.  
*rufonotatus* Hgr. Nematus. Syrphus.  
*signatus* Gr. Syrphus bifasciatus und ornatus.  
*strigatar* Fbr. Syrphus decorus u. a.  
*sulcator* Gr. Cheilosia.  
*thoracicus* Desv. Syrphus vitripennis.

**Auskunftsstelle des Int. Entomol. Vereins.**

Anfrage:

Wie stellt man ein Schmetterlingsskelett her?

H. S., B.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Rudow Ferdinand

Artikel/Article: [Ichneumon. 88](#)