© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Frankfurt a. M., 4. November 1922 Nr. 14/15 XXXVI. Jahrgang.

Entomologische Zeitschrift

Central-Organ des Internationalen Entomologischen Vereins E. V.

mit Fauna exotica.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Abonnements: Im Abonnement bei direkter Zustellung für Deutschland und den seither zu Oesterreich gehörenden Staaten M. 320.—, für Postabonnenten vierteljährlich M. 90.—. Mitglieder des Intern. Entom. Vereins in Deutschland u. Oesterreich zahlen jährlich M. 300.— auf Postscheckkonto Nr. 20153 Amt Frankfurt a. M. Für Tschechoslowakei 12 tsch. Kr., für Mitglieder des tschechoslowakischen Bundes 8 tsch. Kr.; Schweiz, Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Türkei frs. 12.—; Italien, Portugal, Rumänien, Rußland, Belgien, Frankreich und deren Kolonien frs. 14.—; Niederlande fl. 5½; Großbritannien und Kolonien 10 Schillinge; Dänemark, Schweden und Norwegen 9 Kronen; Vereinigte Staaten von Nordamerika, Süd- und Mittelamerikanische Staaten, China und Japan 2 Dollar.

Anzeigen: Insertionspreis für Inland die viergespaltene Petitzeile Mk. 8.—, Ausland alter Friedenskurs entsprechend, Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Viertoljahr 25 Zeilen oder deren Raum frei, die Ueberzeile kostet M. 4.—.

Inhalt: Cossus ligniperda der Weidenbohrer in Gefangenschaft. Von H. Rosenbeck, Hofheim (Unterfr.). — Ueber eine ältere Eberswalder Lepidopterensammlung. Von Dr. Anton Krauße, Eberswalde. — Literatur. — Auskunftstelle. — Kleine Mitteilungen.

Cossus ligniperda der Weidenbohrer in Gefangenschaft.

Von *H. Rosenbeck*, Hofheim, (Unterfr.)

Im August vorigen Jahres brachte mir unser Bezirks-Obstbaumwart eine Cossus Raupe, die er aus einem Obstbaum herausgemeißelt hatte, ein kräftiges Tier, äußerst lebhaft. Dieselbe hatte 14 Tage gehungert, denn der Obstbaumwart hatte ihr nur Blätter als Futter gereicht, welche sie verschmähte.

Ich brachte die Raupe in ein großes Einmachglas mit Glasdeckel, dann sägte ich von einem Weidenbaume ein etwa 15 cm langes, schwach armdickes Stück aus (von einem zweijährigen neuen Trieb) und legte es in das geräumige Glas zur Raupe.

Die Raupe machte sich bald an dem Holze zu schaffen, indem sie darauf herumlief, dann aber begann sie an der untersten Stelle (das Stück Holz stand aufrecht im Glase) sich einzubohren; nach einer Stunde war sie schon unsichtbar, dagegen lag unten ein Häuflein Sägmehl, am nächsten Tage war die Raupe völlig verschwunden. Seit dieser Zeit lebt sie nun in dem Holzstück, das ausgeworfene Sägmehl vermehrt sich ständig. Ich habe nun vor, die Raupe solange in ihrem Holsstück zu lassen, bis sie etwa selber solches verläßt, und dann solches durch ein anderes zu ersetzen. Die Raupe hat eine Länge von etwa 4 cm, ist oben bräunlich, unten weißgelb.

Um die gleiche Zeit meißelte unser Obstbaumwart auch eine Raupe des Blausiebs aus, die er aber leider dabei beschädigte, so das sie einging.

Ueber eine ältere Eberswalder Lepidopterensammlung.

Von *Dr. Anton Krauße*, Eberswalde.

(Fortsetzung.)

*Ocneria dispar ♀; Ebw. 14. 7. 89 im Garten des Hauses Ratzeburgstraße 14.
*Ocneria monacha ♀; Ebw. 8. 07.
*Ocneria monacha ♀; Ebw. 13. 8. 07. Im Wald südlich vom Gesundbrunnen.
*Ocneria monacha ♀; Ebw., Mundtshof 25. 8. 07.
*Ocneria monacha ♀; Ebw., Kiefernbestand am Drachenkopf 11. 7. 89.
*Ocneria monacha ♂ var. eremita; Ebw. 15. 7. 89. An der Brunnenstraße gegenüber dem Eichelgarten.
*Ocneria monacha ♂ var. eremita; Ebw. 1. 8. 08. In der Wohnung.
*Ocneria monacha ♂ var. eremita; Ebw. 15. 8. 07. Mundtshof.
*Ocneria monacha ♀ var. eremita; Ebw. 5. 8. 08. Am Mundtshof.
Ocneria monacha ♂ var. eremita; Choriner Revier, Sch.-B. Kahlenberg, Jagen 65/67.
*Ocneria monacha, Uebergang zu eremita; Ebw. 14. 7. 89. Ki[efern] jenseits der met. Waldstation.
Orgyia antiqua ♂; Ebw. ex l. 7. 90.
*Porthesia auriflua ♂; Ebw. 86.
*Porthesia auriflua ♀; Ebw. 87.
*Porthesia chrysorrhoea ♂; Ebw. 27. 7. 88. An der Wiese neben der Schwärze zwischen den beiden neueren Forstgärten.
*Gnophria (Oeonistis) quadra L. ♂; Ebw. 23. 7. 88. [Zwei weitere Stücke (Ebw.) stellen die var. impunctata Spul. dar, ein anderes Exemplar die var. dives Btlr. (genau der Abbildung im Seitzwerk entsprechend).]
Emydia cribrum; von Pauli erhalten.
Spilosoma lubricipeda ♀; Ebw. ex l. 6. 93.
Spilosoma lubricipeda ♂; Andres ded. Ebw. 87.
*Emydia grammica ♀; Ebw. 5. 7. 87.
*Spilosoma menthastri ♀; Ebw. 21. 7. 88.
*Spilosoma mendica L. ♀; Ebw. Frühjahr 92.
*Spilosoma fuliginosa ♀; Ebw. 27. 3. 90.
*Spilosoma fuliginosa; Pauli.
*Nemeoph. russula ♂; Ebw. 12. 6. 97. Hinter der großen Leuenberger Wiese.
*A. (Nemeoph.) russula ♀; Ebw., Schlangenpfuhl 8. 6. 89. Ein ♂ von Diacrisia sannio stellt die var. pallida Stdgr. dar.
Arctia caja ♀; Pauli.
*Arctia hebe ♂; Ebw. 86.
Arctia hebe ♂; Ebw., Andres ded. 11. 9. 87.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1922/23

Band/Volume: 36

Autor(en)/Author(s): Rosenbeck Hans

Artikel/Article: Cossus ligniperda der Weidenbohrer in Gefangenschaft. 49