ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Central-Organ des
internationalen Entomologischen
Vereins E. V.

mit
Fauna exotica.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Abonnements: Im Abonnement bei direkter Zustellung für Deutschland und den selbster zu Oesterreich gehörenden Staaten vierteljährlich 6 Goldmark. Mitglieder des Internationalen Entomologischen Vereins in Deutschland und Deutsch-Oesterreich zahlen vierteljährlich 8.75 Goldmark auf Postcheckkonto Nr. 48269 Amt Frankfurt a. M. Für das gesamte Ausland der gleiche Betrag und 65 Pfg. Auslandsporto = Mk. 4.40 oder entsprechende Währung.
Anzeigen: Insertionspreis für Inland (für Nichtmitglieder) die fünfgespaltene Petitzeile 40 Goldpfennig, Ausland entsprechend. Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vierteljahr 25 Zeilen oder deren Raum frei, die Ueberzeile kostet für Insekten-Material 10 Goldpfennig, für Geräte 20 Goldpfennig, für nicht entomologische Anzeigen 30 Goldpfennig.

Inhalt: Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main. Von Albert Hepp, Frankfurt a. M. — Ueber die näheren Umstände beim Heimtschaffen der Beute durch die Waldameisen. Von Dr. Rob. Stäger, Bern. — Sammeltage in Ostpreußen. Von Kurt Waschke, Berlin.

Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main.

Von Albert Hepp, Frankfurt a. M.

In Nummer 9 der E. Z. Jahrg. 35 konnte ich *C. althaeae* Hbn. als neuen Fund in der Schmetterlingsfauna von Frankfurt melden. In demselben Jahr 1920 stellte ich für das engere Faunengebiet eine weitere neue Art fest. Weiterhin fand ich in diesem Sommer (1924) eine dritte neue Art. Dies mag Anlaß dazu sein, die beiden von G. Koch¹⁾ für die nähere Umgebung von Frankfurt nicht aufgeführten Schmetterlinge bekannt zu geben.

Es sind *Zygaena meliloti* Esp. und *Zygaena carnio-lica* Sc.

1. *Zygaena meliloti* Esp.

Am 25. 4. 1920 fand ich auf einer kleinen, ziemlich feuchten Waldwiese bei dem Dorf Dietzenbach beim Suchen nach Raupen von *Melitaea parthenie* Bkh. eine Anzahl Zygänenraupen. Ich hielt sie zunächst für noch nicht ausgewachsene Stücke von *lonicerae* Scheven und zwar für die, welche den weiblichen Falter ergeben sollen. Zu dieser Ansicht war ich durch Ochsenheimers²⁾ Angabe Band II S. 53 gekommen, wonach die Raupen von *lonicerae* in zwei verschieden gefärbten Formen vorkommen, von denen die einen Männer, die anderen Weiber ergeben sollen. Diese Angaben machen auch neuere entomologische Schriftsteller. Hierüber wird u. a. noch berichtet werden. Als sich die immer noch verkannten Raupen im Mai verpuppten, war es mir klar, daß es keine Raupen von *Z. lonicerae* Sch. sein konnten. Sie erreichten nämlich nicht die, dieser Raupe zukommende Größe und hatten auch, wie ich inzwischen feststellte, eine andere Zeichnung. Erst als die Falter anfangs Juni schlüpften, erkannte ich *Z. meliloti* Esp. Neben einer Anzahl typischer Stücke erhielt ich auch die Form *Stenzii* Frr. mit rotem Leibring, die in unseren Breiten unter der Stammform ziemlich selten ist. Die *meliloti*-Raupen etwa nach den Abbildungen bei Spuler³⁾ oder Lampert⁴⁾ zu bestimmen, wäre auf Schwierigkeiten gestoßen, weil sowohl die Bilder bei Spuler, Nachtragstafel 9 Fig. 22, als auch bei Lampert, Tafel 83 Fig. 7, nicht einwandfrei sind. Farbe und Zeichnung

sind zwar richtig wiedergegeben, aber die Gestalt ist irreführend. Die Raupe von *Z. meliloti* Esp. ist keine sogenannte „Schildraupe“, wie sie in den genannten Werken abgebildet ist, sondern ihr Körper ist gestreckt walzenförmig. Die unrichtigen Abbildungen sind vermutlich nach der Beschreibung Ochsenheimers, der sie entstellt von Esper⁵⁾ übernommen hat, angefertigt worden. Was schreibt nun Esper und was bildet er ab? In der mir vorliegenden Ausgabe seiner Schmetterlinge von Europa Fortsetzung zweiter Abschnitt p. 11 heißt es: „Dem ersten Anblick nach würde man diese Raupe -- nämlich der *Sp. meliloti* -- für eine Schildraupe und sonach für eine von ganz anderer Art erklären. Die Ringe sind sehr eng zusammengezogen und die untere Seite ganz flach, doch ist der Rücken gerundet.“ Ochsenheimer p. 46 macht daraus: „Sie hat das Aussehen einer Schildraupe, die untere Seite ist flach, der Rücken gerundet usw.“ Und was zeigt die Abbildung bei Esper Tom. II Tab. XXXIX Cont. XIV? Hier ist, keine „Schildraupe“ abgebildet, sondern die walzenförmig gestaltete Raupe von *Sphinx meliloti* (Fig. 4). Fig. 5 stellt die Raupe in zusammengerolltem Zustand dar. Dieses Bild ist sowohl in der Zeichnung als auch in der Gestalt sehr gut angefertigt. Esper behauptet nicht, daß die Raupe von *meliloti* eine „Schildraupe“ ist, sondern daß man sie dafür halten könne. Dieser Meinung hat er vermutlich deshalb Ausdruck gegeben, weil sich die Raupe zusammengezogen hat, als er sie bei der Beschreibung anfing. Hierbei wird sie den Eindruck einer sogenannten „Schildraupe“ gemacht haben. Borkhausen⁶⁾ sagt z. B. auch von der Raupe von *Z. achilleae* Esp. p. 644: Im Ruhezustand zieht sie sich wie eine Schildraupe zusammen, daß man weder Kopf noch Füße sieht.“ Man kann dies bei den meisten Zygänenraupen beobachten. Hiernach ist es ohne Zweifel, daß die Abbildungen bei Spuler und Lampert nach der Beschreibung Ochsenheimers angefertigt worden sind. Leidliche Abbildungen der Raupen von *Z. meliloti* Esp. sind bei Assmann⁷⁾ Tafel 22 Fig. 7 c und auch bei Pezold⁸⁾ in Scribas Beiträgen Tafel XVI Fig 4. und 4 A zu finden. Pezold hat allerdings die von ihm abgebildeten *meliloti*-Raupen noch für *lonicerae*-Raupen gehalten und zwar für die, welche den weiblichen Falter ergeben sollen, was Ochsenheimer und andere von ihm abgeschrieben haben. (Schluß folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1924/25

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Hepp Albert

Artikel/Article: [Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main. 83](#)