© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vereinsnachrichten.

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen.

(Ausschneiden und in die Handbücher einkleben!)

Euchloë belia, var. romana Calb.

ab. **alboapicata** Stauder. Apex rein weiß. (H. Stauder-Wels, Mitt. d. Münch. Ent. Ges. 1922, S. 24.)

ab. **damoneides** Stauder. Die weißen Stellen der Hinterflügelunterseite sind gelblich ausgefüllt. (Wie vor.)

ab. **caudatula** Stauder. Ausgeschwänzte Stücke. (Wie vor.)

ab. **centripeta** Stauder. Mittelfleck ist von der Costa weit entfernt, fast nur punktförmig. (wie vor.)

ab. **immaculata** Stauder. Mittelfleck fehlt. (Wie vor.)

ab. **brunneoapicata** Stauder. Das Schwarz im Apex ist durch Braun ersetzt. (Wie vor.)

Anthocharis cardamines L.

ab. **flavoradiata** Jul. Steph. Eine Aberration, „die mir in zwei Exemplaren vorliegt, von denen eines von mir selbst hier am 20. Juni 1916 in etwa 750 m Höhe gefangen, das andere Ende Mai 1914 mir von einem Schüler gebracht wurde. Diese eigentümlich anmutende Aberration kennzeichnet sich durch oberseits deutlich gelb bestäubte Adern der Hinterflügel." (Julius Stephan-Friedrichsberg, Ent. Rundschau, 1916, S. 12.)

ab. **umbratilis** Jul. Stnph. „Zwei im V 1915 erbeutete ♀♀ haben am Vorderrand der Vorderflügel einen stark schwarz bestäubten Streif, der von der Wurzel bis zum Mittelmond zieht.„ (Wie vor, Iris, 1923, S. 29.)

ab. **marginemaculata** Jul. Steph. „Ein Pärchen von Friedrichsberg (V 1920), sonst normal, besitzt sehr stark ausgebildete schwarze Randflecke der Hinterflügel." (Wie vor)

ab. **luteola** Jul. Steph. „Zwei ♂♂ (V 1916 u. 17 in 750 m Höhe an der Heuscheuerstraße gefangen) zeigen oberseits den ganzen Flügelraum zwischen Wurzel und Orangefleck gelb überlaufen." (Wie vor S. 30.)

ab. **saxonia** Hrg. „Die sonst weißen Schuppen der Flügeloberseiten sind durch hellgelbe ersetzt, und die dunkle Spitzenzeichnung der Oberseite der Vorderfl. besteht aus tief schwarzen Schuppen. Die Unterseite ist normal." Umgegend von Dresden, Regenbachtal. (Fritz Hering-Magdeburg, Zeitschr. f. wissenschaftl. Ins. Biol., 1912, S. 234.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Verlag der Entomologischen Zeitschrift: Internationaler Entomologischer Verein e. V., Frankfurt a. M. / Wissenschaftliche Bearbeitung: Prof. Dr. **Embrik Strand,** Riga (Lettland) Systematisch-Zoologisches Institut der Universität (Pasta Kastite 802.)

Verantwortlicher Redakteur: Dr. med. Georg Pfaff, Frankfurt a. M.-Oberrad, Balduinstr. 43
Druck: Gebr. Vogel, Neu-Isenburg, Waldstraße 24

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1926/27

Band/Volume: 40

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: Vereinsnachrichten. Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen. 439-440