Bestimmungstabelle der Brenthidae.

Von R. Kleine, Stettin.

Bestimmungstabelle der Tribus.

1.	Prot. vorn ± zsmgedrückt, bisweilen zur Aufnahme der Vdf. ausgehöhlt, fehlt die Aushöhlung, so endigen die El. am Ab. spit,
2.	digend
	R. größer, immer deutlich, seru'l dimorph, B. immer sehr kurz, El. am $Ab. \pm gerade$, zuw. mit zahnartigen Anhängen an den Außenecken
3.	Innens. der Vdschn. st. bedornt Stereodermini
	Innens. der Vdschn. unbe 'ornt 4
4.	Kleine Arten, selten über 10 mm lang, Schk. mit geringen Ausnahmen wehrlos
	Größere bis sehr gr. Arten, Schk. mit wenigen Ausnahmen bewehrt
5.	K. u. R. niemals deformiert, von norm. Gestalt, F. nach der Sp. zu meist keulig verdickt
	K. u. R. <u>+,</u> meist sehr stark deformiert, Spgl. nicht verdickt Amorphocephalini
6.	F. etwa auf der Mitte des R. eingefügt, Pro $_{\text{\tiny 2}}$ und Metar. ungefähr gleich lang
7.	F. weit nach vorn gerückt, Pror. viel kürzer als das Metar 12 Schmckz. der El. stets an den Rippenverlauf gebunden, hell auf dunklem Grunde

8. I	Schmckz. nicht an den Rippenverlauf gebunden, meist dunkel auf hellem Grunde oder ohne Schmckz
9. I	R. kurz, gedrungen, niemals walzig, Prot. eiförmig=elliptisch, niemals gefurcht
]	F. kurz, M. meist gr. u. vorragend, El. seitlich parallel nach dem Ab. nicht verschmälert, B. kurz, Habitus mehr gedrungen
]	K. sehr lang, schmal, walzig, so lang wie der ebenfalls verlängerte R
12.	El. mit starker Schmckz., die an den Rippenverlauf gebunden ist
	F. lang, dünn, fadenförmig, Körper nicht kleiig beschuppt, höchstens mit einzelnen Schuppen bedecktluhysteníní F. kurz, stärker, Körper vollständig kleiig beschuppt Uloceríní
	
	Bestimmungstabelle der Gattungen.
	L. Tríbus: Calodr, omíní.
	T. hypermorph, Metat. sehr gr., die folgenden, T. norm. oder alle T. mit Ausnahme des Klngl. von übernorm. Gr. und abweichender Form

	Metat. etwa so lang wie der Schk., in seiner ganzen Länge gleich breit, ohne dünne Verlängerung Allaeodromus Senna Metat. niemals so lang wie der Schk., zuw. sogar das kleinste Gl. von allen, 1.—3. Tgl. niemals in der Form einander gleich. Die T. in ihrer Gesamtheit sehr gr. u. robust Cormopus Kolbe
3.	Hschn. hypermorph oder von auffallender Gestalt, niemals norm
	K. u. R. lang, Prot. am Halse \pm verengt, hinter dem Halse meist mit einer konusartigen Aufwölbung, B. weit über den Körper hinausragend
5. 5a.	Alle Ri. gleichmäßig entwickelt Cyphagogus Parry Ri. zum Teil verkürzt
	gehend, R. am Vdr. flach nach innen gebuchtet Paragogus Kln. Nur die 2. Ri. verkürzt, R. am Vdr. tief halbkreisförmig, eingebuchtet, die Ränder über die Einbuchtung übergreifend
6.	Epigogus Kln. Vdschn. in einem langen fingerartigen Dorn endigend, Hschk. innen grubig ausgehöhlt
7.	Hschn. oberhalb mit einem langen, nach hinten gerichteten Dorn bewehrt
8.	Sutura nur im vorderen Drittel vorhanden, sonst als grobzgekerbte Querleiste ausgebildet, 2. Ri. an der Basis breit, sonst convex, durchgehend, 4. dsgl., 3 u. 5. nur in Rudizmenten vorhanden, seitliche flach Genogogus Kln. Alle Ri. norm
9.	Vdr. des Pror. in der Mitte nicht tief ausgeschnitten, Prot. vorn st. verengt, am Hntr. ohne dornartigen Fortsatz und die El. an der Basis ohne Dornen oberseits
10.	Vdschn. mit einem antemedianen Zähnchen, Schn. des Hb. kurz, keulenförmig verdickt

Vdschn. ohne Zähnchen, höchstens mit l Schn. der Hb. st. walzig verdickt	
11. Schn. der Hb. mit einem abstehenden förmigen Fortsat, hinterer Metat. kurz Schn. der Hb. einfach, ohne Fortsat, 1	Zahn oder lappens . Adidactus Senna hinterer Metat. vers
langert	
längert	Metusambius Kolbe en, an der Basis zu
2., 4. u. 6. Ri. schmäler als die übrige einer runzeligen Partie verschmolzen	. Parusambius Kln.
12. Hschn. st. lappenförmig erweitert	Schizoadidactus K ln. ber das norm. Ma ß
15. Prot. ungefurcht, Ri. auf den El. alle die Sutura fein kreneliert	von gleicher Gestalt, Protusambius Kolbe
Prot. birnenförmig, tiefgefurcht, vor de Ri. oberseits tief u. flach oder schmal 3. Ri. an der Basis knotig verdickt	u. convex erhaben,
14. Vdr. des Pror. in der Mitte tief eingebu oder El. nicht gedornt	t. und El. oder nur
15. K. nicht breiter als der Vdr. des Prot. M. kl K. breiter als der Prot. am Vdr., M. g	. Xestocoryphus Kln. gr 16
16. Schwarzbraune Art, El. mit roten M	Makeln (Formosaner) Chelorhinus Kln.
Einfarbige oder schwarze Arten (Afrika	nner) 17
17. M. nach unten gebogen, Hnt. zart	Usambius Kolbe
M. gerade, nach vorn stehend, Hnt. kl	lobig, walzig
	pachydactylus Hed.
18. Hntr. des Prot. ohne Dorn, nur die El	. an der Basis neben
der Surura mit stumpfen Sp	Incodemerus Senna
Prot. mít 🛨 langem Dorn am Hntr., I	a. ungedornt Allagogus Gahan
Prot. u. El. gedornt	Allayoyus Callali
19. El. mit 2 Zähnchen auf der 3. Ri., Do	
17. di. iiit 2 Zumidich dat del 5. iii., 50	Diplohoplizes Kln.
El. mit je einem Zahn, Dorn kurz	20
20. Spgl. der F. nicht keulig verdickt, die geformt, sehr platt gedrückt	einzelnen Gl. ungleich
· , ·	

	F. an der Sp. eine Keule bildend, 3.—8. Gl. von gleicher Gestalt, seitlich nicht platt gedrückt Phobetromimus Kln.
21.	F. nach vorn in gr. Gruben stehend, die durch eine \pm schmale Wand getrennt sind
	Fgruben nicht leistenartig schmal, sondern breiter getrennt 25 Fgruben durch eine sehr schmale Wand getrennt $\dots 27$
	Augen gr., Hnt. klobig
	9.—11. Fgl. so lang wie das 1.—8. zsm., K. u. R. unterseits nicht gezahnt, alle Ri. schmäler als die Furchen Pittodes Kln. 9.—11. Fgl. kürzer als das 1.—8., mit Ausnahme des 2. sind alle Ri. breiter als die Furchen
25.	Unters. des Metar. halbkreisförmig eingebuchtet
	Sparganophasma Kin.
٠.	Nicht eingebuchtet
26.	Sparganophasma Kln. Nicht eingebuchtet
	3., 5. u. 7. Ki. verkürzt Asaphepterum Kln.
27.	Hntr. des K. eingezogen, 9.—11. Fgl. eine flachgedrückte Keule bildend, 9.—10. viereckig, Hnt. mit gleichen Gl. Sebastius Lacord.
	Hntr. des K. nicht eingezogen, 9.—11. Fgl. st. verlängert, Metat. der Hntb. so lang wie das 2. u. 3. Gl. zsm. Stilbonotus Kln.
28.	Prot. platt, dachförmig, nachinnen abfallend, mit Mittelfurche 29 Prot. \pm gewölbt, mit oder ohne Mittelfurche 33
29.	Körper kaum beborstet, Ri. der El. breit und flach
	Körper st. beborstet, Ri. schmal
30:	R. schmäler als der K
	Humerus der El, dornartig vorstehend. den Prot. umfassend, Vdschn. schmal

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1926/27

Band/Volume: 40

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: Bestimmungstabelle der Brenthidae. 478-483