

# Verzeichnis der im 40. Jahrgang beschriebenen Neubenennungen.

Zusammengestellt von Otto Meißner-Potsdam.

## 1. Lepidoptera.

(D. = Dannehl).

1. *Erástria úncula* Cl. *linéola* Dannehl. S. 14.
2. *E. obliteráta* Rbr. *matutína* D. S. 14.
3. *E. obl. noctúrna* D. S. 14.
4. *Emmélia trabeális* Sc. *unculáta* D. S. 15.
5. *Telesílla amethystína* Hb. *subálpica* D. S. 16. (364).
6. *Plúsia variábílis* Pill. *satiáta* D. S. 16. (365).
7. *Grammódes algíra* L. *leucotaénia* D. S. 18. (369).
8. *Gr. a. leptotaénia* D. S. 18. (369).
9. *Gr. a. selenitaénia* D. S. 18. (369).
10. *Pseudóphia lunária* Schiff. *priováta* D. S. 370.
11. *Ps. l. bitíncta* D. S. 371.
12. *Catocála puérpera* Giorn. *roseolímbáta* D. S. 372.
13. *C. fulmínea* Scop. *vílpíana* D. S. 374.
14. *Zanclógnatha tarsiplumális* Hb. *fumosális* D. S. 395.
15. *Z. tarsícristális* H.-Sch. *négligens* D. S. 396.
16. *Hermínia crinális* Tr. *autumnális* D. S. 397.
17. *H. gryphális* H.-Sch. *squalidális* D. S. 398.
18. *H. derivális* Hb. *mísera* D. S. 398.
19. *H. d. alternális* D. S. 398.
20. *H. rostrális* L. *spectans* D. S. 399.
21. *Hypenódes costaestrígális* Steph. *lugubrális* D. S. 400.
22. *Polyploca dílíta* F. *aséma* D. S. 401.
23. *Aplásta onorária* Fuessl. subsp. geogr. *spinosária* D. S. 403.
24. *Acídália pygmaeária* Hb. *teriolénsis* D. S. 405.
25. *A. trilíneáta* Sc. subsp. geogr. *transsylvánica* D. S. 405, Anm.
26. *A. laevigáta* Scop. *fuscovittáta* D. S. 408.
27. *A. filicáta* Hb. *purifícáta* D. S. 453.
28. *A. f. gen. aest. somnámbula* D. S. 453.
29. *A. degenerária* Hb. *affumicáta* D. S. 454.
30. *A. rubígináta* Hufn. *purpureofasciáta* D. S. 455.
31. *A. marginepunctáta* Goetze *marginevirgáta* D. S. 456.
32. *A. carícária* Reutli *nigrocínguláta* D. S. 457.
33. *A. violáta* Thunbg. *ablutáta* D. S. 458.

34. *Épyra annuláta* Schulze sertária D. S. 459.  
 35. *Rhodostróphia calabrária* Z. lánguida D. S. 460.  
 36. *Tímándra amáta* L. serenáta D. S. 461.  
 37. *Orthólít(h)a plumbária* F. disconudáta D. S. 461.  
 38. *O. pl. nigrolíneáta* D. S. 461.  
 39. *O. pl. gen. aest. genistária* D. S. 462.  
 40. *Odósia atráta* L. perfúsa D. S. 463.  
 41. *Anaítis plagiáta* L. dissolúta D. S. 464.  
 42. *Laréntia kollariária* H.-Sch. feústeli D. S. 468.  
 43. *Agrias claúdia biedermanni* Fassl. ab. reévesi Michael S. 420.  
 44. *A. hevísoniánus stuárti* Godm. f. bicolóra Michael S. 420.  
 45. *A. hev. ab. ornáta* Michael S. 421.  
 46. *Papílio macháon* L. ab. *estrígáta* Maxis S. 425 (325 bis).  
 47. *Zygaéna* hybr. *angelico-jurássica* Przegendza S. 296.  
 48. *Z. hybr. Burgéffii* Prz. S. 296.  
 49. *Z. jurássica* Burgeff var. *rubrobrunneáta* Prz. S. 345.  
 50. *Z. jur.* var. *brunneáta* Prz. S. 345.  
 51. *Z. jur.* var. *albo-brunneáta* Prz. S. 345. Schluß folgt.

## Kleine Mitteilungen.

### **Semiothisa alternaria Hb.**

Dannehl führt in seiner Lepidopteren-Fauna Südtirols (vergl. S. 348 dieser Zeitschrift) den Namen *immacularia* Dhl. für eine Form von *Sem. alternaria* Hb. ein, bei der die dunklen Diskalpunkte fehlen oder nur ganz verloren erscheinen, so daß sie eine Parallelform zu *notata-innotata* Fuchs bildet.

Dieser Benennung hätte es nicht bedurft, da ich die gleiche Form bereits früher — zu vergl. Heinrich, Beitrag zur Macrolepidopterenfauna von Digne, Beiheft zum Jahrgang 1923 der Deutschen Entomologischen Zeitschrift, Berlin, S. 108 *demaculata* benannt habe. Der Name *demaculata* Hch. hat also die Priorität, und *immacularia* Dhl. stellt ein Synonym zu dieser Form dar.

R. Heinrich, Charlottenburg.

## **Pyrameis cardui L. 1927 (Macrolep.)**

1926 war, wie auch in Baden festgestellt worden ist, (Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder Band II Heft 2), ein Wanderjahr von *Pyrameis cardui* L. Um Frankfurt (Main) war der Falter 1926 häufig. Eine regelmäßige Zugrichtung habe ich nicht festgestellt. Für Nachkommenschaft hatten die ♀♀ gut gesorgt. Ich sammelte ab 1. VIII. 1926 an Disteln, die auf einem Brachfeld häufig wuchsen, die Raupen zahlreich in allen Größen. Auch auf Klette waren die *cardui*-Raupen zu finden. 1927 dagegen habe ich nur 1 abgeflogenen Falter am 3. VIII. gegen Abend in hastigem Flug an mir vorüberziehen sehen. Raupen waren trotz eifriger Nachsuche nicht festzustellen. Welche Beobachtungen sind 1927 bezüglich *Pyrameis cardui* L. an anderen Stellen gemacht worden? Äußerungen hierzu in der E. Z. erwünscht. Ich nehme auch Mitteilungen zur Veröffentlichung entgegen.

A. Hepp, Frankfurt (Main)-West, Rödelheimer Landstraße 150.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1927/28

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Meißner Otto

Artikel/Article: [Verzeichnis der im 40. Jahrgang beschriebenen Neubenennungen. 388-389](#)