© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Entomologische Zeitschrift
Centralorgan des Intern. Entomologischen Vereins / E.V. / Gegründet 1884
Nr. 20 Frankfurt a. M., 22. Januar 1929 Jahrg. XXXXII

Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Mährens und Schlesiens.

Von **Hugo Skala**, Altenfelden, Ober-Östr.

In den folgenden Zeilen gebe ich ausschließlich Falterformen an, die in den bisherigen lokalfaunistischen Abhandlungen überhaupt nicht bezogen wurden, von Arten nur neue oder sehr wenig beobachtete. Wo kein Gewährsmann zitiert wird, liegen eigene Beobachtungen vor, mit Ausnahme von Taikowitz. Die dortigen Daten stammen durchwegs von H. Nikolaus Goldschmidt. Allen Mithelfern besten Dank.

Pap. machaon L. ab. *convexifasciatus* Luno, *concavifasciatus* Luno. *rubromaculata* Schultz, alle bei Nikolsburg gefangen.
Col. hyale L. ab. *pallida* Tutt und *minor* Vorbr., beide von Nikolsburg, ab. *opposita* Zusanek von Nikolsburg und Sulnek.
C. edusa F. = *croceus* Fourc. ab. *niedieckí* Strand, Brünn (Zeleznie 1 St.)
Pyr. cardui L. ab. *carnea* Fritsch, Nikolsburg 1 St.
Mel. didyma L. ab. *ocellata* Skala, *interrupta* Skala, beide bei Nikolsburg.
Arg. selene Schiff. ab. *rinaldus* Hbst. 1 St. von Würbental (Klos).
A. niobe L. ab. *obscura* Spul. Bielitz (Bohatschek)
Sat. briseis L. Strand stellt bei v. *ferghana* eine ab. *uniocellata* auf. Entsprechende Stücke finden sich auch bei der Stammform (z. B. Nikolsburg) und wären ebenso zu bezeichnen.
Par. egerides Stgr. ab. *pallida* Tutt von Nikolsburg. Die Sommerform Mährens entspricht der *aestivalis* Fruhst.
P. maera L. ab. *herdonia* Fruhst. von Nikolsburg.
Aph. hyperanthus L. ab. *vidua* Müller. Nikolsburg und Sulnek.
Coen. arcania L. ab. ♂ *punctata* Hoffm. 1 St. von Nikolsburg.
Call. rubri L. ab. *bipuncta* Tutt von Sulnek und Neutitschein.
Zeph. betulae L. ab. *unicolor* Tutt und *subunicolor* Tutt, beide bei Nikolsburg.
Chrys. virgaureae L. ab. *impuncta* Courv. Hohenstadt (Nowak), *parvipuncta* Courv. Buchelsdorf (Postulka).
Ch. phlaeas L. ab. *caeruleopunctata* Stgr. Brünn (Satory), Troppau und Bielitz (Bohatschek).
Lyc. argus L. ab. *inornata* Grund von Nikolsburg.
L. orion Pall. ab. *nigra* Gerh. Brünn (Satory).
L. argiolus L. ab. *parvipuncta* Fuchs und *thersamon* Bygstr., beide bei Nikolsburg.
Aug. sylvanus Esp. ab. *opposita* Tutt, 1 ♀ von Nikolsburg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hesp. malvae L. ab. *taras* Bgstr. Taikowitz, Bilowitz (Satory), Troppau (Klos).
Deil. livórnica Esp. Taikowitz (1 St. 11. 9. 1923 am Licht), Bielitz (Dilles, Schellenberg).
Dd. sievérsi Mén. Schellenberg sandte mir ein Marientaler-♀, das undeutlich und verschwommen gezeichnet ist und nach ihm ab. **schellenbérgi** nom. nov. bezeichnet sei. Coll. mähr. Landesmuseum Brünn.
Ptil. plumígera Esp. ab. *obscúra* Schwing. Bielitz (Bohatschek am Dlimezok).
Eup. chrysorrhoéa L. ab. *abdomináta* Strand von Nikolsburg.
Mac. rubi L. ab. *virgáta* Tutt von Nikolsburg.
Sat. pyri Schiff. ab. *brúnnea* Gschwand. Taikowitz.
S. pavónia L. ab. *decoráta* Schultz, *identáta* Schultz, *defasciáta* Schultz, alle e. l. Nikolsburg.
Acr. tridens Schiff. ab. *juncta* Tutt, bei Sulnek.
A. psi L. ab. *juncta* Tutt, desgleichen.
A. abscóndita Tr. 1 St. von Sulnek.
Agr. baya F. ab. *grísea* Tutt, von Sulnek.
A. candelárum Stgr. Taikowitz (Je ein St. 24. 6. und 3. 7. 1924; det. Rebel).
A. multángula Hb. Taikowitz (det. Rebel).
A. cúprea Hb. Taikowitz (1 St. 11. 8. 1923). Es dürfte wohl zur v. *palustris* Orth. gehören.
A. flammátra F. Taikowitz (det. Rebel).
A. lucérnea L. Wagner nimmt vielleicht mit Recht an, daß die Würbentaler *nyctimera* hierher gehören.
A. birívia Hb. var. **sudeticola** nom. nov. Die bei Würbental und wohl auch sonst in den Vorbergen der Sudeten gefangenen Falter zeigen eine ins Gelbliche ziehende Färbung der Vorderflügel. Ihre Abtrennung ist schon mit Rücksicht auf das isolierte Vorkommen gerechtfertigt.
A. exclamatiónis L. ab. *unícolor* Hb. mehrfach bei Nikolsburg.
A. obelísca Hb. ab. *fictílis* Hb. Nikolsburg am Köder.
A. ségetum Schiff. ab. *spínulus* Haw., *subatrus* Haw. Beide mehrfach bei Nikolsburg.
Ep. céspitis F. ab. *ferrugínea* Höfn. von Pohrlitz (Brunner).
Mam. nebulósa Hfn. ab. *bimaculósa* Esp. 1 ♂ von Fulnek.
M. pisi L. *aestíva* Rothke. Fulnek (1 St. 15. 9. 1913 am Köder).
M. leíneri Frr. Taikowitz (1 St. 13. 6. 1925, det. Rebel).
M. seréna F. ab. *leucostígma* Haw. Unterm Kotrutsch 20. 6. 1915.
Dianth. luteágo Hb. Taikowitz im Juli.
D. cucubali Fuessl. = *rivularis* F. ab. *conjuncta* Klem. 1 St. von Fulnek.
Br. receptrícula Hb., *rávula* Hb. und *ereptrícula* Hb. alle 3 von Taikowitz (det. Rebel).
Had. sórdida Bkh. ab. *anceps* Hb. 1 St. von Nikolsburg.
H. monoglypha Hfn. ab. *intácta* White und *aéthiops* T., beide bei Würbental (Klos).

Schluß folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1928/29

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: Beitrag zur Großschmetterlingsfauna Mährens und Schlesiens. 261-262